



CÓMO MANEJAR LA ANSIEDAD EN TIEMPOS DE CRISIS SOCIAL Y ECONÓMICA

Guía práctica

Psic. Edwin Ticlla



Documento
digital

Villarreal Consultoría
Lima - Perú

Fecha de Edición:
Agosto de 2025.

Dirección.
Lic. Edwin Ticlla Colunche

Índice

1. Presentación y a quién está dirigida
2. Cómo usar esta guía
3. Contexto y por qué aumenta la ansiedad en crisis
4. Fundamentos: qué es la ansiedad
5. Señales de alerta y niveles de intensidad
6. Técnicas y herramientas (paso a paso)
7. Plan de 21 días (modelo de implementación)
8. Casos modelo (aplicación práctica)
9. Referencias
10. Anexos

Presentación

Esta guía reúne explicaciones sencillas y herramientas practicables para manejar la ansiedad en tiempos de incertidumbre, con ejemplos pensados para el contexto actual. Está dirigida a personas adultas que viven preocupación persistente por temas de seguridad, empleo o economía, y también a familiares que acompañan. El enfoque combina psicoeducación y técnicas que puedes aplicar con lo que tienes a mano, sin equipamiento especial.

Es una primera herramienta que te hace consciente sobre la importancia de valorar la Salud Mental en contextos difíciles.

Psic. Edwin Ticlla Colunche

Cómo usar esta guía

Lee primero las **secciones 3 y 4** para entender qué te ocurre y por qué. Luego explora el apartado 6, donde encontrarás técnicas descritas paso a paso. Finalmente, utiliza el plan de 21 días (sección 7) como hoja de ruta flexible. Si en algún momento aparecen ideas de hacerte daño, contacta ayuda inmediata al Ministerio de Salud.

3. Contexto y por qué aumenta la ansiedad en crisis




En periodos de crisis social y económica, la sensación de estabilidad se ve alterada. Factores como la **inseguridad ciudadana**, la incertidumbre política y el aumento del costo de vida generan un clima de alerta constante. En el Perú, los reportes recientes señalan que la exposición diaria a noticias sobre delincuencia, corrupción y problemas económicos incrementa la percepción de amenaza, lo que activa respuestas de ansiedad y estrés sostenido. Esta reacción no es solo emocional: el cuerpo también se involucra, con síntomas como tensión muscular, insomnio y fatiga.

La ansiedad se intensifica porque el cerebro interpreta la situación como impredecible y fuera de control. Cuando las personas sienten que no pueden planificar el futuro —por temor a perder el empleo, no cubrir gastos básicos o ser víctimas de violencia—, *se activa un mecanismo de hipervigilancia*. Esto significa estar en alerta permanente, revisando el entorno, evitando lugares o consumiendo información de manera compulsiva para “anticipar” riesgos. Aunque esta conducta busca seguridad, en realidad alimenta el ciclo ansioso.

Además, la sobreexposición a redes sociales y medios digitales amplifica el problema. El flujo constante de noticias alarmantes y comparaciones sociales refuerza la idea de que

“*todo está mal*” y que no hay salida. A esto se suma la falta de espacios seguros para hablar del malestar y la dificultad para acceder a servicios de salud mental, lo que prolonga la sensación de vulnerabilidad.



4. ¿Qué es la ansiedad



La ansiedad es una emoción normal que forma parte del sistema de supervivencia. Su función es prepararnos para actuar ante una posible amenaza. Por ejemplo, si vas a cruzar una calle y ves un auto acercarse, sentir ansiedad te hace estar alerta y moverte rápido. En este sentido, la ansiedad no es “mala” en sí misma: se vuelve problemática cuando aparece con demasiada frecuencia, en situaciones que no son realmente peligrosas, o cuando se mantiene durante mucho tiempo.

Desde la psicología, se entiende que la ansiedad surge cuando interpretamos que algo pone en riesgo nuestro bienestar y sentimos que no tenemos recursos suficientes para manejarlo. Este proceso se llama evaluación cognitiva. Primero, hacemos una evaluación primaria: ¿esto me afecta?, ¿es una amenaza? Luego, una evaluación secundaria: ¿tengo herramientas para afrontarlo? Si la respuesta es “no puedo con esto”, la ansiedad aumenta. Por ejemplo, si escuchas rumores de despidos en tu trabajo y piensas “no conseguiré

otro empleo”, tu cuerpo y mente reaccionarán como si el peligro fuera inminente.

- ❖ La ansiedad se manifiesta en tres niveles, según la teoría del triple sistema de respuesta:
- ❖ Pensamientos: ideas repetitivas como “algo malo va a pasar”.
- ❖ Sensaciones físicas: palpitaciones, sudoración, tensión muscular.
- ❖ Conductas: evitar lugares, revisar noticias de forma compulsiva, posponer decisiones.

En contextos de crisis social y económica, estos tres niveles se activan con facilidad. La inseguridad en las calles, la inflación o la incertidumbre política alimentan pensamientos de amenaza (“puede pasarme algo”, “no alcanzaré para pagar”), lo que dispara síntomas físicos y conductas de evitación. Así se forma un círculo difícil de romper: cuanto más evitamos o nos sobreinformamos, más crece la sensación de falta de control.

Otra pieza clave es el modelo cognitivo. Este explica que las personas con ansiedad tienden a interpretar la realidad de manera sesgada, enfocándose en lo negativo y anticipando catástrofes. Por ejemplo, ante una noticia económica, alguien puede pensar: “Esto significa que todo va a empeorar”, aunque existan señales de estabilidad. Estos pensamientos no son simples ideas: influyen en cómo nos sentimos y actuamos.

Finalmente, hay factores que aumentan la vulnerabilidad, como experiencias tempranas de inseguridad, rasgos biológicos y aprendizajes previos. Si creciste en un entorno impredecible, es más probable que tu sistema de alerta se active con facilidad en la adultez. Esto no significa que no puedas manejarlo, sino que necesitas estrategias específicas para recuperar la sensación de control.

La infoxicación es un término que combina “información” e “intoxicación” y se refiere a la sobrecarga de información que

una persona recibe, especialmente a través de medios digitales y redes sociales, hasta el punto de sentirse saturada y confundida. Este exceso no solo implica cantidad, sino también la dificultad para filtrar lo relevante, lo verdadero y lo útil.

Cuando estamos expuestos a noticias, alertas, publicaciones y mensajes de manera continua, el cerebro entra en un estado de alerta permanente. Esto genera fatiga mental, ansiedad y sensación de pérdida de control, porque la persona siente que nunca está al día o que siempre falta algo por revisar. Además, la infoxicación puede llevar a la parálisis por análisis: tener tanta información que resulta difícil tomar decisiones.

5. Señales de alerta y niveles de intensidad



La ansiedad no se presenta siempre con la misma intensidad. Puede variar desde una sensación ligera de nerviosismo hasta episodios que paralizan la vida diaria. Reconocer estas señales es importante para saber cuándo aplicar estrategias de autocuidado y cuándo buscar ayuda profesional.

En un nivel leve, la ansiedad aparece como una respuesta normal ante situaciones que generan tensión, pero no interfiere de manera significativa con las actividades cotidianas. Es común sentir preocupación ocasional por temas concretos, notar cierta tensión muscular o experimentar dificultades leves para conciliar el sueño. Por ejemplo, antes de una reunión importante, es normal sentir mariposas en el estómago y pensar en cómo saldrá la presentación.


Cuando la ansiedad alcanza un nivel moderado, se vuelve más persistente y empieza a afectar la rutina diaria. Las preocupaciones se repiten con frecuencia y son difíciles de controlar. En esta etapa, pueden aparecer conductas de evitación, como dejar de salir por miedo a la inseguridad,

junto con síntomas físicos más notorios, como palpitaciones, sudoración o molestias digestivas. También es común la irritabilidad y la dificultad para dormir varias noches seguidas. Un ejemplo sería revisar noticias sobre delincuencia varias veces al día y sentir miedo intenso al salir, incluso para tareas simples.

En el nivel alto, la ansiedad interfiere de manera significativa con la vida personal, laboral o social. Pueden presentarse ataques de pánico, caracterizados por sensación súbita de falta de aire, palpitaciones y miedo a perder el control o morir. También se observa incapacidad para concentrarse, evitación extrema de actividades y pensamientos recurrentes de desesperanza o de que la vida no tiene sentido. En estos casos, la persona puede dejar de trabajar, estudiar o relacionarse, lo que agrava el malestar.

6. Técnicas y herramientas (paso a paso)

1) Ancla corporal 3-3-3



Esta herramienta sirve para cortar picos de ansiedad en el momento. Cuando notes aceleración, **dirige la mirada y atención a tres elementos visibles en tu entorno y descríbelos en voz baja**; luego, **pasa la mano por tres superficies diferentes y detalla su textura (suabe, rugoso, frío, áspero, etc.)**; finalmente, **respira de forma rítmica: inhala tres segundos, retén tres, exhala tres, durante seis ciclos**. El objetivo es devolver a tu sistema nervioso una referencia concreta del “aquí y ahora”. Si al terminar tu escala de ansiedad baja un par de puntos repite una vez más y continúa con lo que estabas haciendo.

Recuerda la secuencia:

- ❖ Mira 3 cosas de tu alrededor
- ❖ Pasa tu mano lentamente por 3 superficies
- ❖ Respira en 3 pasos

2) Respiración en cuadro 4×4

Úsala para bajar hipervigilancia e iniciar el descanso. Siéntate con **espalda apoyada** y **hombros sueltos**. Inhala cuatro segundos, mantén cuatro, exhala cuatro y pausa cuatro con pulmones vacíos; realiza entre ocho y diez repeticiones. Mantén la atención en el aire que entra por la nariz y sale por la boca, sin forzar. Dos sesiones al día, una por la mañana y otra antes de dormir, ayudan a estabilizar el ritmo interno y a mejorar el sueño.



3) Exploración 5-4-3-2-1 con “giro local seguro”



Antes de entrar a un lugar nuevo o si aparece miedo en la calle, realiza una exploración sensorial:

- ❖ identifica cinco cosas que ves,
- ❖ cuatro sonidos,
- ❖ tres sensaciones táctiles,
- ❖ dos olores y un sabor.

Acto seguido, realiza un **“giro local seguro”**: **localiza salidas, zonas iluminadas y puntos con tránsito de gente.** Cierra con un mini plan (“ruta A, tiempo estimado, contacto avisado”). Al combinar atención plena con medidas prácticas, el cuerpo registra que hay orientación y reduce la alerta.

4) Dieta informativa en tres ventanas

Cuando la información te satura, define tres momentos breves al día para informarte (por ejemplo, mañana y tarde diez minutos, noche cinco). Entre esas ventanas, silencia notificaciones, evita contenidos alarmistas y guarda para el final del día una actividad calmante, como lectura ligera o música suave. Si algo es realmente relevante, aparecerá en la siguiente ventana; así, el consumo deja de ser continuo y la mente recupera foco.

5) Exposición en rutas escalonadas

La evitación mantiene el miedo. Para revertirla, elabora una lista de cinco rutas o situaciones ordenadas de menor a mayor dificultad. Empieza por la más sencilla con una meta pequeña y realista (por ejemplo, llegar a la esquina y volver). Practica la respiración 4×4 antes y después; registra tu ansiedad al inicio y al final. Repite hasta que se estabilice en 3/10 durante dos días seguidos y avanza al siguiente peldaño. El progreso se mide por la reducción de tensión y la recuperación de autonomía.

6) Agenda de preocupaciones

Si la cabeza vuelve una y otra vez a los mismos temas, anótalos cuando aparezcan en una libreta o en el móvil y pospón su revisión a una franja fija de veinte minutos diarios. En ese espacio, genera tres opciones por tema y elige una acción breve de diez minutos para probar hoy. Fuera de la franja, dile a tu mente “lo veré a las 7:30” y regresa al presente con el Ancla 3-3-3. Con el tiempo, notarás menos rumiación y más acciones concretas.

7) Círculo de lo controlable

Distinguir lo que puedes manejar reduce la sensación de indefensión. En una hoja, divide en dos columnas: “lo que depende de mí” y “lo que no”. Coloca cada idea en su lado y selecciona una conducta del grupo controlable para realizar hoy, ojalá antes del mediodía: una llamada, un ajuste de gasto, una ruta más segura. Esa pequeña palanca genera tracción emocional para el resto del día.

8) Mini-presupuesto “4 sobres”

La ansiedad financiera mejora con estructura simple. Define cuatro categorías: básicos, trabajo/estudio, ahorro micro y pequeños respiros. Asigna montos y registra movimientos en cada “sobre” físico o digital. Paga primero básicos y compromisos de trabajo o estudio; destina unas monedas o un pequeño monto diario a ahorro micro; reserva algo mínimo

para un respiro que recargue. Revisa cada semana y ajusta. Tener claridad reduce discusiones y rumiación nocturna.

9) Resolución de problemas “PASOS”

Cuando un problema parece gigantesco, comprímelo con PASOS: formula el problema en una sola frase; lista cinco alternativas sin juzgar; elige la más útil para esta semana; organiza un plan con tres actos pequeños y fechas; al final, revisa qué resultó y qué moverás mañana. Al convertir un tema difuso en tareas medibles, la mente se aquieta y sube la sensación de control.

10) Exposición interoceptiva suave

Si temes sensaciones corporales como palpitaciones o mareo, practícalas en entorno controlado para que tu cerebro compruebe que bajan por sí mismas. Elige una sensación objetivo y simúlala de forma segura: subir escaleras dos pisos, girar veinte segundos, soplar por pajita treinta segundos. Observa la intensidad en una escala del 0 al 10 y acompáñala con respiración 4×4 hasta que descienda. Repite tres veces por sesión. Con varias prácticas, el cuerpo deja de interpretar esas señales como amenaza.

11) Contrato de micro-hábitos 15-15-15

Cuando el ánimo está bajo, la acción mínima sostenida ayuda. Firma contigo una rutina diaria: quince minutos de movimiento (caminar, estirar, subir escaleras), quince de tarea útil (ordenar un cajón, enviar una postulación, pagar una cuenta) y quince de vínculo (llamada o mensaje a alguien de confianza). Marca cada bloque cumplido. El progreso se acumula y, en pocos días, la energía cambia.

12) Diálogo pensamiento–evidencia–alternativa

Ante pensamientos catastróficos, **escribe la frase que más te inquieta tal como aparece**. Reúne evidencias a favor y en contra con datos reales (fechas, números, experiencias previas). Formula una alternativa más útil y realista, acompañada de una acción corta que la respalde, por

ejemplo, enviar un correo o ajustar un gasto. El objetivo es pasar de suposiciones a información concreta y conducta orientada.

13) RAIN de autocompasión

Para despegarte de la autoexigencia, aplica RAIN en cuatro pasos enlazados. Reconoce lo que sientes y ponle nombre; acepta que está presente y que tu sistema intenta protegerte; investiga con curiosidad dónde lo sientes en el cuerpo y qué pide esa emoción; nutre la experiencia con una frase de apoyo que le dirías a un amigo. Dedica cuatro minutos. Esta práctica entrena una voz interna útil, menos dura y más funcional.

14) Semáforo STOP para impulsos

Ante un impulso de responder de forma brusca, gastar o abrir noticias alarmantes, detente diez segundos. Toma una respiración lenta, observa la emoción y la necesidad detrás (seguridad, reconocimiento, descanso) y elige la acción más alineada con tus metas del día, como esperar veinticuatro horas antes de comprar, salir a caminar cinco minutos o hablar en tono bajo. Repetido varias veces, este circuito crea un nuevo hábito.

15) Diario “3 anclajes del día”

Al cerrar la jornada, escribe tres apuntes breves: una situación difícil que manejaste mejor de lo pensado, un gesto de apoyo dado o recibido y una acción simple para mañana antes de las diez de la mañana. Esta práctica entrena atención a los avances y prepara una pequeña victoria al iniciar el día siguiente.

16) Comunicación asertiva “DEAR”

Para conversaciones sensibles, prepara un guion. Describe los hechos de forma concreta y sin adjetivos; expresa lo que sientes y lo que necesitas; solicita una acción clara y medible; recuerda tus límites y la alternativa si no hay acuerdo. Ensaya el guion en voz alta y elige un momento adecuado. La

claridad reduce malentendidos y evita escaladas innecesarias.

17) Plan de sueño “SEÑAL”

El descanso mejora cuando hay señales repetidas de que el día se cierra. Separa pantallas sesenta minutos antes, establece una rutina breve y agradable (ducha tibia, té sin cafeína, lectura), evita café desde el mediodía, cuida el ambiente (oscuridad y frescura) y deja una libreta a la mano para descargar tres pendientes. Si despiertas en la madrugada, repite respiración 4×4 y vuelve a la libreta antes de encender pantallas.

18) Ensayo de entrevista en espejo

Si buscas empleo o mejora laboral, prepara tu narrativa. Elige dos logros concretos y cinco respuestas a preguntas típicas. Practica frente al espejo en voz alta, ajusta muletillas y velocidad; si puedes, graba audio para escucharte al día siguiente. Repite tres veces por semana durante diez minutos. Esa familiaridad reduce ansiedad y aumenta sensación de competencia.

19) Plan 90/10 para noticias difíciles en familia

Cuando se aborden temas tensos, distribuye el tiempo: noventa por ciento para hechos verificables y acuerdos prácticos (horarios, rutas, gastos) y diez por ciento para emociones y cuidado mutuo. Si alguien se activa, aplica STOP y retoma cuando el pulso baje. Anotar los acuerdos al final evita volver a discutir lo mismo.

20) Línea de vida de apoyo cercano

Diseña una red clara para momentos de bajón. Escribe cinco contactos ordenados por disponibilidad y anota cómo cada uno puede ayudar (escucha, logística, compañía). Acordar una palabra clave por chat facilita pedir apoyo sin largas explicaciones. Ten visibles también números de ayuda profesional. Compartir este plan con tu entorno reduce la sensación de estar a solas con el problema.



7. Plan de 21 días

El objetivo de este plan es ayudarte a incorporar, de manera gradual y realista, **las técnicas que has aprendido para manejar la ansiedad**. Está diseñado para tres semanas, con actividades que se complementan entre sí. No se trata de cumplir todo a la perfección, sino de avanzar paso a paso, adaptando las estrategias a tu ritmo y contexto.

Semana 1: Estabilización y conciencia

Durante los primeros siete días, la meta es reducir la activación fisiológica y **recuperar sensación de control**. Para ello, se recomienda practicar la respiración en cuadro 4×4 al menos dos veces al día, preferiblemente en la mañana y antes de dormir. Además, dedica unos minutos al ejercicio “Círculo de lo controlable”, que te ayudará a diferenciar entre lo que puedes manejar y lo que no. Cada noche, completa el “Diario 3 anclajes del día” para cerrar el día con una mirada más equilibrada. Esta semana también es ideal para iniciar la “Dieta informativa en tres ventanas”, limitando la exposición a noticias que alimentan la ansiedad.

Semana 2: Retomar actividad y reducir evitación

En la segunda semana, el objetivo es recuperar espacios que la ansiedad te ha hecho evitar. Para ello, aplica la técnica de “Exposición en rutas escalonadas” tres o cuatro veces, comenzando por situaciones más fáciles. Mantén la práctica diaria del contrato “15-15-15”, que consiste en dedicar 15 minutos a movimiento físico, 15 a una tarea útil y 15 a un vínculo social. Además, utiliza la técnica PASOS para resolver un problema concreto cada día, lo que te permitirá sentir avances tangibles y disminuir la rumiación.

Semana 3: Consolidación y fortalecimiento

En la última semana, el foco está en consolidar hábitos y afrontar sensaciones internas que generan miedo. Ajusta tu dieta informativa para mantener un consumo equilibrado de noticias y añade la “Exposición interoceptiva suave” tres veces por semana, practicando ejercicios que simulen sensaciones físicas de ansiedad para aprender que son temporales y manejables. También es momento de aplicar la técnica DEAR en una conversación real, para mejorar la comunicación y reducir tensiones en casa o en el trabajo. Si lo deseas, incorpora el “Plan 90/10” para abordar temas sensibles con familiares, priorizando acuerdos prácticos y cuidado emocional.

Al final de cada semana, dedica unos minutos a evaluar tu progreso. Pregúntate: ¿qué técnicas me resultaron más útiles?, ¿qué ajustes necesito hacer? Recuerda que este plan no sustituye la atención profesional.

8. Ejemplos de aplicación práctica

Para comprender cómo aplicar las técnicas descritas en esta guía, revisemos tres ejemplos basados en situaciones comunes durante una crisis social y económica. Estos casos muestran cómo combinar herramientas para recuperar sensación de control y bienestar.

Caso A: Miedo a la inseguridad

Ana, de 35 años, dejó de salir sola por temor a ser víctima de un robo. Cada vez que pensaba en ir al mercado, sentía palpitaciones y evitaba hacerlo, lo que aumentaba su dependencia de otros y su sensación de encierro. Empezó aplicando la técnica de Exploración 5-4-3-2-1 con giro local seguro antes de salir, lo que le permitió sentirse más orientada y reducir la hipervigilancia. Luego incorporó la Exposición en rutas escalonadas, comenzando con recorridos cortos y acompañada. Después de diez días, logró hacer compras breves por su cuenta. Además, ajustó su consumo de noticias con la Dieta informativa en tres ventanas, ya que las alertas constantes en redes sociales intensificaban su ansiedad.

Caso B: Ansiedad financiera

Luis, de 42 años, pasaba horas pensando en sus deudas y revisando su cuenta bancaria varias veces al día. Esto le generaba insomnio y discusiones familiares. Empezó con el Círculo de lo controlable, diferenciando lo que podía manejar (reducir gastos, buscar ingresos extra) de lo que no dependía de él (inflación, decisiones políticas). Luego aplicó la técnica PASOS para resolver problemas, estableciendo un plan simple: renegociar una deuda y vender objetos que no usaba. Finalmente, implementó el Mini-presupuesto 4 sobres, lo que le dio una estructura clara para organizar sus finanzas y disminuir la rumiación nocturna.

Caso C: Acompañar a un familiar ansioso

Maribel vive con su hermano, quien experimenta ansiedad intensa. Ella se sentía frustrada porque las conversaciones sobre dinero terminaban en discusiones. Decidió preparar una conversación usando la técnica Comunicación DEAR, que le permitió expresar sus necesidades sin generar conflicto: describió los hechos, explicó cómo se sentía y propuso acuerdos concretos. Además, elaboró una Línea de vida de apoyo, identificando contactos y recursos para momentos críticos. Esto no solo redujo la tensión en casa, sino que fortaleció la red de soporte familiar.

Estos casos muestran que la combinación de técnicas es más efectiva que aplicar una sola herramienta. Cada persona puede adaptar las estrategias a su realidad, avanzando paso a paso y evaluando qué le funciona mejor.

9. Referencias

- Icaro Psicología. (2025). Teorías relevantes sobre la ansiedad. <https://www.icaropsicologia.com/teorias-relevantes-sobre-la-ansiedad>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. Springer.
- Orientación Psicológica. (2025). ¿Qué teorías explican la ansiedad? <https://orientacionpsicologica.es/que-teorias-explican-la-ansiedad/>
- Psicología y Mente. (2025). Las 3 principales teorías de la ansiedad. <https://psicologiaymente.com/clinica/teorias-de-ansiedad>
- Infobae Perú. (2025, 20 de agosto). Hipervigilancia: uno de los efectos de la inseguridad ciudadana en la salud mental. <https://www.infobae.com/peru/2025/08/20/hipervigilancia-uno-de-los-efectos-de-la-inseguridad-ciudadana-en-la-salud-mental-de-los-peruanos/>
- El Comercio. (2024, 26 de octubre). Ansiedad y estrés constante: así afecta a la salud mental vivir en medio de crisis e inseguridad. <https://elcomercio.pe/bienestar/mente-sana/ansiedad-estres-salud-mental-de-los-peruanos-vivir-en-medio-de-crisis-e-inseguridad-miedo-noticia/>
- RPP Data. (2025, 8 de mayo). Salud mental universitaria en alerta: testimonios que exponen una realidad preocupante. <https://rpp.pe/peru/actualidad/salud-mental-universitaria-en-alerta-testimonios-noticia-1633151>
- Gob.pe – Hospital Loayza. (s. f.). Impacto de la ansiedad en la salud mental. <https://www.gob.pe/institucion/hospitalloayza/noticias/1172509-hospital-loayza-advierte-sobre-el-impacto-de-la-ansiedad-en-la-salud-mental>

ANEXOS

1. Autoevaluación inicial (GAD-7 adaptada)

Objetivo: Identificar el nivel de ansiedad actual.

Instrucciones:

1. Lee cada afirmación y escribe la frecuencia con la que la has experimentado en los últimos 14 días.
Escribe un número entre el 0 (Nunca) al 4 (Todos los días).
2. Suma los puntos para obtener tu puntuación total.
3. Consulta la interpretación al final de la guía si lo deseas.

Fecha: _____

Ítem	Puntaje
1. Sentirse nervioso, ansioso, notar que se le ponen los nervios de punta.	
2. No ser capaz de parar o controlar sus preocupaciones.	
3. Preocuparse demasiado sobre diferentes cosas.	
4. Dificultad para relajarse.	
5. Estar tan desasosegado que le resulta difícil parar quieto.	
6. Sentirse fácilmente disgustado o irritable.	
7. Sentirse asustado como si algo horrible pudiese pasar.	

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0-10): _____

Rango	Descripción
0-4	No se aprecia ansiedad
5-9	Se aprecian síntomas de ansiedad leves
10-14	Se aprecian síntomas de ansiedad moderados
15-21	Se aprecian síntomas de ansiedad severos

2.Registro diario de síntomas

Objetivo: Monitorear los síntomas de ansiedad día a día.

Instrucciones:

1. Anota los síntomas que experimentas cada día.
2. Evalúa la intensidad en una escala del 0 al 10.
3. Observa patrones o cambios a lo largo del tiempo.

Fecha: _____

Fecha	Síntomas	Intensidad (0–10)	Observaciones

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

3. Plan SOS para picos de ansiedad

Objetivo: Aplicar técnicas rápidas para reducir la ansiedad intensa.

Instrucciones:

1. Identifica señales de ansiedad intensa.
2. Aplica respiración, anclaje y contacto de emergencia.
3. Evalúa el cambio en tu estado emocional.

Fecha: _____

Situación	Técnica aplicada	Resultado	Nivel de ansiedad (0–10)

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

4. Agenda de preocupaciones

Objetivo: Organizar pensamientos y decidir acciones concretas.

Instrucciones:

1. Anota cada preocupación cuando aparezca.
2. Dedicar una franja diaria para revisarlas.
3. Escribe opciones y una acción concreta.

Fecha: _____

Fecha	Preocupación	Hora asignada	Opciones	Acción elegida

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0-10): _____

5. Círculo de lo controlable

Objetivo: Diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no.

Instrucciones:

1. Dibuja dos círculos: uno para lo controlable y otro para lo no controlable.
2. Escribe ideas en cada uno.
3. Elige una acción del círculo controlable para hoy.

Fecha: _____

Idea	¿Controlable?	Acción concreta

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

6. Plan de exposición gradual

Objetivo: Enfrentar situaciones temidas de forma progresiva.

Instrucciones:

1. Lista situaciones de menor a mayor dificultad.
2. Define tiempo y compañía para cada nivel.
3. Registra ansiedad antes y después.

Fecha: _____

Nivel	Situación	Tiempo	Compañía	Ansiedad inicial	Ansiedad final

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

7. Mini-presupuesto anti-ansiedad

Objetivo: Organizar gastos para reducir tensión financiera.

Instrucciones:

1. Define 4 categorías de gasto.
2. Asigna montos simples.
3. Revisa y ajusta semanalmente.

Fecha: _____

Categoría	Monto asignado	Monto usado	Observaciones

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

8. Checklist de higiene del sueño

Objetivo: Mejorar hábitos para dormir mejor.

Instrucciones:

1. Marca los hábitos que realizas cada día.
2. Observa cómo influyen en tu descanso.
3. Ajusta tu rutina según lo que funcione mejor.

Fecha: _____

Fecha	Separar pantallas	Rutina relajante	Sin cafeína	Ambiente adecuado	Descarga de pendientes

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0-10): _____

9. Diario 3 anclajes del día

Objetivo: Reconocer logros y planificar el siguiente día.

Instrucciones:

1. Escribe una situación difícil que manejaste.
2. Anota un gesto de apoyo.
3. Define una acción para mañana.

Fecha: _____

Fecha	Situación difícil	Gesto de apoyo	Acción para mañana

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0-10): _____

10. Contrato de micro-hábitos 15-15-15

Objetivo: Establecer rutinas diarias para mejorar el ánimo.

Instrucciones:

1. Realiza 15 minutos de movimiento.
2. Realiza 15 minutos de tarea útil.
3. Realiza 15 minutos de vínculo social.

Fecha: _____

Fecha	Movimiento	Tarea útil	Vínculo	Cumplido (Sí/No)

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0-10): _____

11. Directorio de ayuda

Objetivo: Tener a mano contactos útiles en momentos difíciles.

Instrucciones:

1. Escribe los contactos disponibles.
2. Define cómo te pueden ayudar.
3. Acorda una palabra clave para pedir apoyo.

Fecha: _____

Nombre	Teléfono	Tipo de ayuda	Disponibilidad

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

12. Dieta informativa tres ventanas

Objetivo: Regular el consumo de noticias para reducir ansiedad.

Instrucciones:

1. Define tres momentos del día para informarte.
2. Evita contenidos alarmistas en la noche.
3. Incluye una actividad calmante al final del día.

Fecha: _____

Fecha	Ventana 1	Ventana 2	Ventana 3	Actividad calmante

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

13.Semáforo STOP para impulsos

Objetivo: Controlar reacciones impulsivas.

Instrucciones:

1. Detente 10 segundos.
2. Toma una respiración profunda.
3. Observa la emoción y necesidad.
4. Elige una acción alineada con tus metas.

Fecha: _____

Situación	Emoción	Necesidad	Acción elegida

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

14.RAIN de autocompasión

Objetivo: Practicar la autocompasión en momentos difíciles.

Instrucciones:

1. Reconoce lo que sientes.
2. Acepta que está presente.
3. Investiga con curiosidad.
4. Nutre con una frase de apoyo.

Fecha: _____

Fecha	Emoción	Sensación corporal	Frase de apoyo

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

15. Comunicación asertiva DEAR

Objetivo: Expresar necesidades de forma clara y respetuosa.

Instrucciones:

1. Describe los hechos.
2. Expresa tu sentir y necesidad.
3. Solicita una acción.
4. Recuerda tus límites.

Fecha: _____

Situación	Descripción	Sentir	Solicitud	Límite

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

16. Plan 90/10 para noticias difíciles

Objetivo: Abordar temas sensibles en familia.

Instrucciones:

1. Dedicar 90% del tiempo a hechos y acuerdos.
2. Dedicar 10% a emociones y cuidado mutuo.
3. Aplicar STOP si alguien se activa.

Fecha: _____

Fecha	Tema	Hechos/acuerdos	Emociones	Acción tomada

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

17. Ensayo de entrevista en espejo

Objetivo: Prepararse para entrevistas laborales.

Instrucciones:

1. Elige logros y respuestas típicas.
2. Practica en voz alta.
3. Ajusta muletillas y velocidad.

Fecha: _____

Fecha	Logros	Respuestas	Observaciones

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

18. Línea de vida de apoyo cercano

Objetivo: Tener una red de apoyo clara y accesible.

Instrucciones:

1. Escribe 5 contactos ordenados por disponibilidad.
2. Define cómo te ayudan.
3. Acorda una palabra clave para pedir ayuda.

Fecha: _____

Nombre	Teléfono	Tipo de ayuda	Palabra clave

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

19.Exposición interoceptiva suave

Objetivo: Reducir miedo a sensaciones corporales.

Instrucciones:

1. Elige una sensación objetivo.
2. Simúlala de forma controlada.
3. Observa cómo disminuye.

Fecha: _____

Fecha	Sensación	Actividad	Ansiedad inicial	Ansiedad final

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____

20. Resolución de problemas PASOS

Objetivo: Tomar decisiones prácticas ante problemas.

Instrucciones:

1. Plantea el problema.
2. Genera alternativas.
3. Selecciona la más útil.
4. Organiza un plan.
5. Evalúa resultados.

Fecha: _____

Fecha	Problema	Alternativas	Acción	Resultado

Reflexión final: ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? (0–10): _____