



Psicoterapia para adultos com TDAH

Psychotherapy for adults with ADHD

Psicoterapia para adultos con TDAH

DOI: 10.54022/shsv6n2-042

Originals received: 5/12/2025
Acceptance for publication: 6/5/2025

Pablo Almeida Rocha

Especialista em Psiquiatria

Instituição: Centro Universitário de Brasília (CEUB)

Endereço: Brasília, Distrito Federal, Brasil

E-mail: pablo.rocha@ceub.edu.br

Rafaelly de Castro Alencar

Especialista em Neuropsicologia

Instituição: ADAPT Psicologia

Endereço: Brasília, Distrito Federal, Brasil

E-mail: adaptpsicologia@gmail.com

André Luiz de Almeida Martins

Mestre em Psicologia

Instituição: Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF)

Endereço: Brasília, Distrito Federal, Brasil

E-mail: andreluiz.am@gmail.com

Elyse Dellane Machado de Oliveira

Graduanda em Medicina

Instituição: Centro Universitário de Brasília (CEUB)

Endereço: Brasília, Distrito Federal, Brasil

E-mail: elysedellane@sempreceub.com

Iasmim e Silva Penha

Graduanda em Medicina

Instituição: Centro Universitário de Brasília (CEUB)

Endereço: Brasília, Distrito Federal, Brasil

E-mail: iasmim.penha@sempreceub.com

RESUMO

Este estudo tem como objetivo investigar a eficácia da psicoterapia no tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) em adultos, considerando os prejuízos associados à condição, como dificuldades na regulação emocional, autoestima e funcionamento executivo. Através de uma revisão narrativa da literatura, o trabalho analisa abordagens psicoterapêuticas



que vêm sendo empregadas no manejo do TDAH adulto, com destaque para a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC), reconhecida por sua efetividade na redução dos sintomas centrais e no aprimoramento do funcionamento global. Os resultados indicam que intervenções estruturadas, como a TCC individual ou em grupo, associadas ou não ao uso de medicação, promovem melhorias significativas na organização, no gerenciamento do tempo e na autorregulação emocional. Estratégias complementares, como mindfulness, psicoeducação, treinamento de habilidades e a Terapia Comportamental Dialética, também demonstram potencial terapêutico, especialmente na redução de comorbidades como ansiedade e depressão. Adicionalmente, terapias digitais e recursos tecnológicos, como a TCC online e o neurofeedback, mostram-se promissores na ampliação do acesso e na personalização do cuidado. A análise conclui que a combinação entre psicoterapia e farmacoterapia, aliada a intervenções adaptadas às necessidades individuais, constitui uma abordagem eficaz, capaz de favorecer não apenas o alívio dos sintomas, mas também o desenvolvimento de estratégias práticas para uma vida mais equilibrada.

Palavras-chave: TDAH. Adultos. Psicoterapia. Tratamento. Saúde Mental.

ABSTRACT

This study aims to investigate the effectiveness of psychotherapy in treating Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) in adults, considering the impairments associated with the condition, such as difficulties in emotional regulation, self-esteem, and executive functioning. Through a narrative literature review, the study analyzes psychotherapeutic approaches used in managing adult ADHD, highlighting Cognitive Behavioral Therapy (CBT), recognized for its effectiveness in reducing core symptoms and improving overall functioning. The results indicate that structured interventions, such as individual or group CBT, with or without medication, promote significant improvements in organization, time management, and emotional self-regulation. Complementary strategies, such as mindfulness, psychoeducation, skills training, and Dialectical Behavior Therapy, also show therapeutic potential, especially in reducing comorbidities like anxiety and depression. Additionally, digital therapies and technological resources, such as online CBT and neurofeedback, appear promising in expanding access and personalizing care. The analysis concludes that combining psychotherapy and pharmacotherapy, along with interventions tailored to individual needs, constitutes an effective approach capable of fostering not only symptom relief but also the development of practical strategies for a more balanced life.

Keywords: ADHD. Adults. Psychotherapy. Treatment. Mental Health.

RESUMEN

Este estudio tiene como objetivo investigar la eficacia de la psicoterapia en el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en adultos, considerando los perjuicios asociados a la condición, como dificultades en la regulación emocional, autoestima y funcionamiento ejecutivo. A través de una revisión narrativa de la literatura, el trabajo analiza enfoques psicoterapéuticos que se han empleado en el manejo del TDAH en adultos, con énfasis en la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), reconocida por su efectividad en la reducción de los síntomas centrales y en la mejora del funcionamiento global.



Los resultados indican que intervenciones estructuradas, como la TCC individual o grupal, con o sin uso de medicación, promueven mejoras significativas en la organización, la gestión del tiempo y la autorregulación emocional. Estrategias complementarias, como mindfulness, psicoeducación, entrenamiento en habilidades y la Terapia Dialéctica Conductual, también demuestran potencial terapéutico, especialmente en la reducción de comorbilidades como la ansiedad y la depresión. Además, las terapias digitales y los recursos tecnológicos, como la TCC en línea y el neurofeedback, se muestran prometedores en la ampliación del acceso y la personalización del cuidado. El análisis concluye que la combinación entre psicoterapia y farmacoterapia, junto con intervenciones adaptadas a las necesidades individuales, constituye un enfoque eficaz, capaz de favorecer no solo el alivio de los síntomas, sino también el desarrollo de estrategias prácticas para una vida más equilibrada.

Palabras clave: TDAH. Adultos. Psicoterapia. Tratamiento. Salud Mental.

1 INTRODUÇÃO

O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) é um transtorno do neurodesenvolvimento que persiste na vida adulta em aproximadamente metade dos casos diagnosticados. O TDAH em adultos provoca diversos prejuízos na regulação emocional, na autoestima e no funcionamento executivo, impactando de forma significativa a qualidade de vida desses indivíduos (Huang *et al.*, 2015).

Adultos que buscam auxílio psiquiátrico para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) apresentam desafios singulares. Esses desafios incluem dificuldades de concentração, hiperatividade e comportamentos impulsivos, podendo também se manifestar como questões comportamentais, emocionais e cognitivas (Harper & Gentile, 2022).

Revisões de literatura evidenciam que adultos com TDAH apresentam uma prevalência maior de transtornos de ansiedade (Rocha *et al.*, 2025a), depressão (Rocha *et al.*, 2025b), transtornos alimentares (Rocha *et al.*, 2024a) e transtorno por uso de substâncias (Rocha *et al.*, 2024b). Além do maior risco de comorbidades, também apresentam com maior frequência sintomas como fadiga (Soares & Rocha, 2024) e comportamento agressivo (Rocha *et al.*, 2024c), trazendo importante impacto para o indivíduo e sociedade. Um tratamento adequado dos sintomas de TDAH é de extrema importância para melhor manejo



das comorbidades e dos quadros associados.

A psicoterapia oferece um caminho valioso para o manejo da apresentação diversa do TDAH em adultos. Ela disponibiliza estratégias e técnicas específicas para melhorar o foco, reduzir a impulsividade e gerenciar a hiperatividade (Harper & Gentile, 2022), promovendo a regulação emocional, melhorando o funcionamento executivo e reduzindo o impacto das comorbidades (Zhang *et al.*, 2025). Ao oferecer abordagens personalizadas, a psicoterapia permite que os indivíduos desenvolvam mecanismos de enfrentamento e habilidades práticas para lidar com os desafios diários. Além disso, contribui para o aumento da autoconsciência e o fortalecimento da resiliência emocional — elementos fundamentais para o bem-estar psicológico a longo prazo (Sapkale & Sawal, 2023).

No contexto da vida adulta, onde as exigências profissionais, sociais e familiares podem amplificar os efeitos do TDAH, a psicoterapia assume um papel ainda mais crucial. Ela não apenas auxilia na redução dos sintomas, mas também favorece o autoconhecimento e a reconstrução da autoestima, frequentemente afetada por anos de frustração, críticas e insucessos relacionados ao transtorno não diagnosticado (Sapkale & Sawal, 2023). As pessoas que se beneficiam da psicoterapia frequentemente relatam relações interpessoais mais satisfatórias, desempenho acadêmico e profissional mais consistente e uma sensação geral de maior realização pessoal e bem-estar (Zhang *et al.*, 2025).

As funções executivas, que englobam habilidades como planejamento, organização e gerenciamento do tempo, frequentemente se encontram prejudicadas em adultos com TDAH (Ramos-Galarza *et al.*, 2024). A psicoterapia pode promover avanços importantes nessas áreas ao ensinar estratégias específicas para estruturar o ambiente, estabelecer prioridades e utilizar o tempo de forma mais eficaz (Zhang *et al.*, 2025).

Atualmente, recomenda-se uma combinação entre medicação e psicoterapia como abordagem padrão para o tratamento do TDAH em adultos, sendo a terapia cognitivo-comportamental (TCC) a intervenção psicoterapêutica com maior embasamento empírico (Huang *et al.*, 2015) — no entanto, existem outras abordagens já com evidências consolidadas, e outras perspectivas sendo estudadas, como veremos neste texto.



Esta revisão de literatura tem como objetivo examinar a eficácia da psicoterapia no tratamento dos sintomas de TDAH em adultos e discutir as abordagens mais utilizadas.

2 METODOLOGIA

Foi utilizada como metodologia a revisão bibliográfica narrativa, caracterizada por avaliar e sintetizar as informações e atualizações mais relevantes e específicas do assunto em questão. Para identificar os estudos relevantes foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, LILACS e Scielo, utilizando como termos de busca "TDAH", "adultos" e "psicoterapia", assim como a versão em inglês desses termos. Após a busca inicial, os títulos e resumos dos artigos foram triados pelos autores e os artigos selecionados foram então lidos na íntegra para determinar sua relevância para a revisão.

3 DISCUSSÃO

3.1 ABORDAGENS CONSOLIDADAS

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) consolidou-se como a principal abordagem psicoterapêutica no tratamento do TDAH em adultos. A TCC é reconhecida como um tratamento baseado em evidências para adultos com TDAH, com foco tanto nos sintomas centrais do transtorno quanto nos prejuízos funcionais associados (Pan *et al.*, 2020).

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é uma terapia estruturada e orientada por objetivos, centrada na identificação e modificação de padrões de pensamento e comportamentos negativos. É amplamente considerada a intervenção psicológica mais eficaz para o TDAH. Por meio da TCC, os indivíduos aprendem estratégias para enfrentar os sintomas do transtorno, aprimorar habilidades organizacionais e fortalecer o autocontrole. Um dos pilares da TCC consiste em ensinar os pacientes a reconhecer e questionar pensamentos disfuncionais que alimentam suas dificuldades. Ao transformar esses padrões cognitivos, é possível modificar as respostas comportamentais, promovendo uma



melhora no funcionamento global do indivíduo (Corrales *et al.*, 2024; Ostinelli *et al.*, 2025).

A reestruturação cognitiva é uma técnica central da TCC, que consiste em identificar e desafiar padrões de pensamento negativos ou distorcidos. Adultos com TDAH frequentemente desenvolvem pensamentos negativos sobre suas capacidades, desempenho e perspectivas futuras, muitas vezes como resultado de experiências acumuladas de fracasso ou frustração. Através da reestruturação cognitiva, os indivíduos aprendem a reconhecer esses pensamentos automáticos, avaliar sua veracidade e substituí-los por ideias mais realistas, construtivas e positivas (William *et al.*, 2024; Ostinelli *et al.*, 2025).

Existem evidências já bem consolidadas de que a TCC combinada com medicação atinge uma melhora maior e mais rápida nos sintomas de TDAH, habilidades organizacionais e autoestima do que a TCC sozinha. Contudo, há uma semelhante melhora funcional e de sintomas que podem ser alcançados apenas com a TCC, mas de forma mais gradual. Dessa forma, o tratamento com TCC sem o uso de medicação, pode ser uma opção viável para aqueles que não desejam tomar medicamentos ou apresentar efeitos colaterais proibitivos, especialmente aqueles com melhor funcionamento cognitivo (Cherkasova *et al.*, 2020).

Embora a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) individual tenha sido, tradicionalmente, o formato predominante no tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em adultos, abordagens baseadas em grupos vêm ganhando atenção devido ao seu potencial de custo-efetividade e aos benefícios associados ao apoio entre pares. Pan *et al.* concentraram-se especificamente na investigação da eficácia da TCC em grupos para adultos medicados com TDAH, comparando os resultados a curto e longo prazo entre os grupos que receberam TCC associada à medicação e aqueles que foram tratados apenas com medicação, com resultados de equivalência aproximada (Pan *et al.*, 2020).

Outra abordagem bastante estudada atualmente são as intervenções baseadas em mindfulness, que consistem em treinar os indivíduos a focarem sua atenção no momento presente, de maneira intencional e sem julgamentos (Dentz *et al.*, 2024). Essas intervenções têm se mostrado eficazes na melhoria da



atenção, na redução da impulsividade e no aprimoramento da regulação emocional. Práticas como a meditação e a respiração consciente ajudam os indivíduos a se tornarem mais atentos aos seus próprios pensamentos e emoções, permitindo respostas mais adaptativas diante de situações desafiadoras (Dentz *et al.*, 2024; Yang *et al.*, 2025). E além de seus benefícios diretos sobre os sintomas do TDAH, essas intervenções têm se revelado particularmente úteis na diminuição de sintomas de transtornos emocionais frequentemente comórbidos, como a depressão e a ansiedade (Yang *et al.*, 2025).

Além da TCC e das intervenções baseadas em mindfulness, outras terapias de apoio podem ser valiosas no tratamento do TDAH em adultos. Dentre elas, destacam-se a psicoeducação, o treinamento de habilidades e o aconselhamento psicológico (Sapkale & Sawal, 2023). A psicoeducação proporciona aos indivíduos informações fundamentais sobre o TDAH, seus sintomas e seu impacto na vida cotidiana (Ostinelli *et al.*, 2025).

O treinamento de habilidades envolve o ensino de estratégias específicas voltadas para a melhoria da organização, da gestão do tempo e das habilidades sociais. Essas áreas são comumente prejudicadas em adultos com TDAH, o que pode gerar dificuldades significativas em contextos profissionais, acadêmicos e relacionais. O treinamento pode incluir o uso de listas de tarefas, a utilização de calendários e lembretes, a divisão de tarefas complexas em etapas menores, bem como a prática de habilidades sociais em contextos estruturados. Ao promover o desenvolvimento dessas competências, o treinamento de habilidades contribui para o aumento da autonomia, da eficácia pessoal e da qualidade de vida (Sapkale & Sawal, 2023).

O treinamento em regulação emocional tem como foco ensinar os indivíduos a identificar, compreender e gerenciar suas emoções de forma mais eficaz. Esse processo pode envolver técnicas como a prática da atenção plena (mindfulness), respiração profunda e relaxamento muscular progressivo. O objetivo é promover uma maior consciência emocional e desenvolver estratégias adaptativas para lidar com estados emocionais intensos ou desregulados. Para adultos com TDAH esse tipo de treinamento pode ser particularmente benéfico, pois auxilia na redução da reatividade emocional, na melhora da estabilidade do humor e no fortalecimento da capacidade de lidar com o estresse do cotidiano.



Dado que muitos adultos com TDAH enfrentam dificuldades em regular emoções como frustração, ansiedade e irritabilidade, o treinamento em regulação emocional contribui significativamente para a melhora do bem-estar psicológico e da qualidade das interações sociais (Nordby *et al.*, 2024).

A Terapia Comportamental Dialética (TCD) têm se mostrado eficaz ao oferecer suporte para o manejo dos sintomas, a melhora na qualidade de vida e o fortalecimento das funções executivas dos adultos com TDAH. A TCD demonstrou benefícios significativos na redução de comportamentos desadaptativos e no desenvolvimento de habilidades sociais, sendo particularmente útil para pacientes que apresentam desregulação emocional e dificuldades interpessoais (Fullen *et al.*, 2020).

Essas abordagens psicoterapêuticas não apenas visam atenuar os sintomas clínicos, mas também ajudam os indivíduos a desenvolverem uma consciência mais profunda de seus próprios padrões de comportamento, o que favorece uma autogestão mais eficaz dos desafios associados ao TDAH. Ao fomentar a autorreflexão e a prática deliberada de novas estratégias, a psicoterapia permite que os pacientes não apenas enfrentem os sintomas de forma mais eficaz, mas também reconstruam a relação consigo mesmos e com o seu modo de funcionar no mundo (Ostinelli *et al.*, 2025; Yang *et al.*, 2025).

3.2 ABORDAGENS EMERGENTES

O campo da psicoterapia voltada ao tratamento do TDAH em adultos encontra-se em constante evolução, impulsionado por novas pesquisas e tendências emergentes que apontam para avanços significativos nas estratégias de intervenção.

As terapias digitais, incluindo a terapia cognitivo-comportamental baseada na internet (iCBT) e intervenções psicoterapêuticas mediadas por inteligência artificial, vêm se mostrando promissoras no sentido de ampliar o acesso e a eficácia do tratamento. Essas tecnologias representam alternativas convenientes e acessíveis, especialmente para indivíduos que residem em áreas remotas ou que enfrentam dificuldades para participar de sessões terapêuticas presenciais. A psicoterapia baseada em IA tem o potencial de personalizar o tratamento,



adaptando-se às necessidades e preferências específicas do indivíduo, o que pode aumentar a adesão e a efetividade das intervenções. Além disso, as plataformas digitais oferecem a possibilidade de acompanhamento contínuo, monitoramento de sintomas em tempo real e suporte entre sessões, favorecendo a continuidade e a eficácia do tratamento. Embora ainda haja desafios éticos e técnicos a serem enfrentados, os avanços nessa área sugerem um futuro promissor para a integração de tecnologias digitais na prática clínica (Beg & Verma, 2024).

O neurofeedback é uma modalidade de biofeedback que visa treinar os indivíduos a regular sua própria atividade cerebral por meio de sinais visuais ou auditivos fornecidos em tempo real. Essa técnica pode promover melhorias na atenção e na redução da impulsividade em adultos com TDAH. Durante o treinamento de neurofeedback, o indivíduo aprende, gradualmente, a modificar padrões disfuncionais de atividade cerebral, o que pode levar a mudanças comportamentais e cognitivas positivas. Embora ainda sejam necessários mais estudos para comprovar sua eficácia de maneira robusta, os resultados iniciais são promissores a parecem indicar que o neurofeedback pode ser uma abordagem complementar no tratamento do TDAH, especialmente para aqueles que não obtêm resultados satisfatórios apenas com intervenções tradicionais ou farmacológicas (Dentz *et al.*, 2024).

3.3 DESAFIOS

Apesar dos benefícios potenciais da psicoterapia no tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em adultos, existem diversos desafios e considerações importantes que devem ser levados em conta, como o acesso ao tratamento, a variabilidade individual, a expertise do terapeuta, a adesão e o tratamento combinado (Zhang *et al.*, 2025).

O acesso à psicoterapia pode representar uma barreira significativa para muitos adultos com TDAH. Fatores como os custos envolvidos, a disponibilidade de terapeutas qualificados e as limitações geográficas podem restringir substancialmente o acesso ao tratamento. Nessas circunstâncias, a Terapia Cognitivo-Comportamental baseada na internet (iCBT, do inglês internet-based



Cognitive Behavioral Therapy) pode ajudar a superar esses obstáculos, oferecendo opções terapêuticas mais acessíveis e convenientes (Zhang *et al.*, 2025).

A eficácia da psicoterapia pode variar consideravelmente em função de fatores individuais, como a gravidade dos sintomas do TDAH, a presença de comorbidades (como depressão ou transtornos de ansiedade), bem como o nível de motivação e o grau de engajamento da pessoa no processo terapêutico. É importante reconhecer que o TDAH, especialmente na vida adulta, se manifesta de maneira diversa entre os indivíduos, o que torna essencial a adoção de uma abordagem terapêutica personalizada (William *et al.*, 2024).

A expertise e a formação do terapeuta constituem fatores cruciais para o sucesso da psicoterapia em adultos com TDAH. Terapeutas que possuem conhecimento aprofundado sobre o transtorno e experiência na aplicação de abordagens psicoterapêuticas baseadas em evidências têm maior probabilidade de oferecer um tratamento eficaz. É altamente recomendável que os adultos com TDAH busquem profissionais que tenham formação específica e especialização nesse campo (William *et al.*, 2024).

A adesão e o engajamento na psicoterapia podem representar desafios importantes para alguns adultos com TDAH, especialmente devido às dificuldades com atenção, organização e motivação. Estes obstáculos, muitas vezes intrínsecos à própria manifestação do transtorno, podem interferir na continuidade e na eficácia do tratamento. Nesse sentido, os terapeutas podem adotar estratégias específicas para promover maior adesão, como a realização de sessões claras e estruturadas, o uso de recursos visuais que facilitem a compreensão e o acompanhamento das atividades terapêuticas, além do oferecimento constante de encorajamento e suporte (William *et al.*, 2024).

Embora a psicoterapia seja notadamente eficaz no tratamento do TDAH em adultos, frequentemente ela apresenta melhores resultados quando combinada com o uso de medicação. A medicação atua na redução dos sintomas centrais do transtorno, como desatenção e hiperatividade, proporcionando uma base mais estável sobre a qual a psicoterapia pode intervir de maneira mais aprofundada. Ao mesmo tempo, a psicoterapia oferece ferramentas para lidar com os desafios emocionais, comportamentais e cognitivos que frequentemente acompanham o



TDAH, como a baixa autoestima, a impulsividade e as dificuldades interpessoais. Essa abordagem combinada possibilita um plano terapêutico mais abrangente e individualizado, promovendo não apenas a redução de sintomas, mas também o desenvolvimento de habilidades e estratégias para uma vida mais equilibrada e satisfatória (Harper & Gentile, 2022).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura revisada indica que a psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, é eficaz no tratamento dos sintomas do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) em adultos, tanto como intervenção isolada quanto em combinação com o uso de medicação. A combinação entre farmacoterapia e psicoterapia é recomendada como abordagem terapêutica para o TDAH em adultos, sendo que a terapia cognitivo-comportamental (TCC) é a modalidade mais amplamente validada por meio de pesquisas baseadas em evidências.

A psicoterapia representa uma abordagem valiosa no tratamento dos sintomas do TDAH em adultos. Diversas terapias baseadas em evidências, incluindo a terapia cognitivo-comportamental e as intervenções baseadas em mindfulness, têm demonstrado eficácia na melhora dos sintomas nucleares do transtorno, no fortalecimento da regulação emocional, no aprimoramento do funcionamento executivo, na redução de comorbidades e na elevação da qualidade de vida de forma geral. Apesar da existência de desafios, como o acesso ao tratamento, a variabilidade individual e a qualificação dos profissionais, esses obstáculos podem ser superados por meio de estratégias inovadoras e do compromisso com um cuidado individualizado e abrangente. A integração entre a psicoterapia, a farmacoterapia e modificações no estilo de vida oferece um modelo de tratamento mais completo, que capacita os adultos com TDAH a manejar seus sintomas de forma eficaz e a levar uma vida mais plena e satisfatória.

Além dos benefícios amplamente comprovados da terapia cognitivo-comportamental e das intervenções baseadas em mindfulness, é fundamental reconhecer o valor de uma abordagem multidisciplinar e individualizada, que considere as particularidades clínicas e contextuais de cada paciente. As terapias



digitais e o neurofeedback surgem como alternativas inovadoras que podem ampliar o alcance e a personalização do tratamento, especialmente em cenários com restrições de acesso. Não menos importante, a psicoterapia desempenha um papel crucial no fortalecimento da autonomia e da resiliência emocional dos adultos com TDAH, promovendo não só a redução dos sintomas, mas também o desenvolvimento de estratégias duradouras para o enfrentamento dos desafios cotidianos. Por fim, para que esses avanços sejam efetivamente traduzidos em melhorias na saúde mental da população, é necessária a ampliação de políticas públicas que garantam acesso qualificado e a formação contínua de profissionais especializados no tratamento do TDAH na vida adulta.



REFERÊNCIAS

- BEG, M.J.; VERMA, M.K. Exploring the Potential and Challenges of Digital and AI-Driven Psychotherapy for ADHD, OCD, Schizophrenia, and Substance Use Disorders: A Comprehensive Narrative Review. **Indian Journal of Psychological Medicine**, 2024. <https://doi.org/10.1177/02537176241300569>
- CHERKASOVA, M.V. *et al.* Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy With and Without Medication for Adults With ADHD: A Randomized Clinical Trial. **J Atten Disord**, v. 24, n. 6, p. 889-903, 2020. <https://doi.org/10.1177/1087054716671197>
- CORRALES, M. *et al.* Long-term efficacy of a new 6-session cognitive behavioral therapy for adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: A randomized, controlled clinical trial. **Psychiatry Research**, v. 331, e115642, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2023.115642>
- DENTZ, A. *et al.* Non-pharmacological treatment of Attention Deficit Disorder with or without Hyperactivity (ADHD): Overview and report of the first international symposium on the non-pharmacological management of ADHD. **L'Encéphale**, v. 50, n. 3, p. 309-328, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.encep.2023.04.010>
- FULLEN, T. *et al.* Psychological Treatments in Adult ADHD: A Systematic Review. **Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment**, v. 42, p. 500-518, 2020. <https://doi.org/10.1007/s10862-020-09794-8>
- HARPER, K.; GENTILE, J.P. Psychotherapy for Adult ADHD. **Innov Clin Neurosci**, v. 19, n. 10-12, p. 35-39, 2022.
- HUANG, F. *et al.* Cognitive behavioral therapy for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: study protocol for a randomized controlled trial. **Trials**, v. 16, n. 161, 2015. <https://doi.org/10.1186/s13063-015-0686-1>
- NORDBY, E.S. *et al.* A Blended Intervention Targeting Emotion Dysregulation in Adults With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: Development and Feasibility Study. **JMIR Form Res**, v. 8, e53931, 2024. <https://doi.org/10.2196/53931>
- OSTINELLI, E.G. *et al.* Comparative efficacy and acceptability of pharmacological, psychological, and neurostimulatory interventions for ADHD in adults: a systematic review and component network meta-analysis. **The Lancet Psychiatry**, v. 12, n. 1, p. 32-43, 2025. [https://doi.org/10.1016/s2215-0366\(24\)00360-2](https://doi.org/10.1016/s2215-0366(24)00360-2)
- PAN, M. *et al.* Cognitive behavioural therapy in groups for medicated adults with attention deficit hyperactivity disorder: protocol for a randomised controlled trial. **BMJ Open**, v. 10, n. 10, e037514, 2020. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-037514>
- RAMOS-GALARZA, C. *et al.* Systematic Review of Executive Function Stimulation Methods in the ADHD Population. **J. Clin. Med.**, v. 13, n. 14, e4208, 2024. <https://doi.org/10.3390/jcm13144208>



ROCHA, P.A. *et al.* Aggression and criminality in adults with ADHD. **LUMEN ET VIRTUS**, v. 15, n. 40, p. 4810–4817, 2024c. <https://doi.org/10.56238/levv15n40-062>

ROCHA, P.A. *et al.* Depression in adults with ADHD. **LUMEN ET VIRTUS**, v. 16, n. 46, p. 1973–1986, 2025b. <https://doi.org/10.56238/levv16n46-028>

ROCHA, P.A. *et al.* Obesidade e TDAH em adultos. **REVISTA FOCO**, v. 17, n. 5, p. e5027, 2024a. <https://doi.org/10.54751/revistafoco.v17n5-013>

ROCHA, P.A. *et al.* The Relationship Between ADHD and Substance Use Disorder in Adults. **LUMEN ET VIRTUS**, v. 15, n. 39, p. 2252–2259, 2024b. <https://doi.org/10.56238/levv15n39-052>

ROCHA, P.A. *et al.* Transtornos de ansiedade em adultos com TDAH. **Revista Sistemática**, v. 15, n. 3, p. 165–178, 2025a. <https://doi.org/10.56238/rcsv15n3-002>

SAPKALE, B.; SAWAL, A. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Causes and Diagnosis in Adults: A Review. **Cureus**, v. 15, n. 11, e49144, 2023. <https://doi.org/10.7759/cureus.49144>

SOARES, M.F.N.; ROCHA, P.A. Fadiga em adultos com TDAH. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 7, n. 5, p. e72867, 2024. <https://doi.org/10.34119/bjhrv7n5-179>

WILLIAM, S. *et al.* Experience of CBT in adults with ADHD: a mixed methods study. **Front. Psychiatry**, v. 15, 2024. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2024.1341624>

YANG, X. *et al.* Short-term and long-term effect of non-pharmacotherapy for adults with ADHD: a systematic review and network meta-analysis. **Front. Psychiatry**, v. 16, 2025. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2025.1516878>

ZHANG, S.Y. *et al.* Efficacy of internet-based cognitive behavioral therapy for medicated adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): A randomized controlled trial. **Psychiatry Research**, v. 344, e116352, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2025.116352>