

Алгоритмы и модели вычислений.

Задание 11: DFT

Сергей Володин, 272 гр.

задано 2014.04.17


Теория

(сюда будут ссылки)

1. Многочлен $P_n(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} \longleftrightarrow (a_0, \dots, a_n) = P_n$ (порядок коэффициентов как на семинаре, а не как в задании). Считаем $\exists l \in \mathbb{N} \cup \{0\} : n = 2^l$.
2. $\omega_n^k \stackrel{\text{def}}{=} e^{\frac{2\pi k}{n}i}$
3. $\varphi(P) \stackrel{\text{def}}{=} (P_n(\omega_n^0), \dots, P_n(\omega_n^{n-1}))$ — дискретное преобразование Фурье
4. $P_n^0 \stackrel{\text{def}}{=} (a_0, a_2, a_4, \dots)$, $P_n^1 \stackrel{\text{def}}{=} (a_1, a_3, a_5, \dots) \Rightarrow$ свойство: $P_n(x) = P_n^0(x^2) + x \cdot P_n^1(x^2)$. Следствия :
 - (a) $P_n(\omega_n^j) = P_n^0(\omega_{n/2}^j) + \omega_n^j P_n^1(\omega_{n/2}^j)$, $0 \leq j < \frac{n}{2}$
 - (b) $P_n(\omega_n^{\frac{n}{2}+j}) = P_n^0(\omega_{n/2}^j) - \omega_n^j P_n^1(\omega_{n/2}^j)$, $0 \leq j < \frac{n}{2}$
5. $n = 1 \Rightarrow \varphi(P_n) = \varphi((a_0)) = (a_0)$
6. Обозначаем $\varphi(A) = \alpha$, элементы кортежей как $(a_0, \dots, a_{n-1})[i] = a_i$.
7. Тогда $4 \Rightarrow \begin{cases} \alpha[j] &= \alpha^0[j] + \omega_n^j \alpha^1[j] \\ \alpha[n/2 + j] &= \alpha^0[j] - \omega_n^j \alpha^1[j] \end{cases}$
8. Пусть $A, B \in \mathbb{R}^{2n}$ — многочлены степени $n-1$ (остальные коэффициенты — нули). Пусть $C \in \mathbb{R}^{2n}$ — их произведение. Тогда $\varphi(C) = \varphi(A) \times \varphi(B)$, где \times — покомпонентное умножение кортежей. Действительно, $\varphi(A)[i] = A(\omega_{2n}^i)$, $\varphi(B)[i] = B(\omega_{2n}^i)$, откуда $\varphi(C)[i] = C(\omega_{2n}^i) = A(\omega_{2n}^i) \cdot B(\omega_{2n}^i) = \varphi(A)[i] \cdot \varphi(B)[i]$
9. Пусть φ^{-1} — обратное преобразование. Тогда, если $\varphi^{-1}(A) = (\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1})$, $\varphi(A) = n \cdot (\alpha_0, \alpha_{n-1}, \alpha_{n-2}, \dots, \alpha_1) = (\theta_0, \dots, \theta_{n-1})$, то есть, $\varphi^{-1}(A) = \frac{1}{n}(\theta_0, \theta_{n-1}, \theta_{n-2}, \dots, \theta_1)$

(каноническое) Задача 46

1. $A = (1, 3, 0, 2, 0, 0, 0, 0)$. Дерево вызовов:



- (a) Для $A^{000}, A^{001}, \dots, A^{111}$ результат преобразования $\alpha^{ijk} = A^{ijk}$ (см. 5)

- (b) $\omega \stackrel{\text{def}}{=} e^{\frac{2\pi}{8}i} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$

- (c) $\alpha^{00} = (\alpha^{000}[0] + \omega_2^0 \cdot \alpha^{001}[0], \alpha^{000}[0] - \omega_2^0 \alpha^{001}[0]) = |\omega_2^0 = 1 = \omega^0| = (1, 1)$

- (d) $\alpha^{01} = (\alpha^{010}[0] + \omega_2^0 \cdot \alpha^{011}[0], \alpha^{010}[0] - \omega_2^0 \alpha^{011}[0]) = |\omega_2^0 = 1| = (0, 0)$

- (e) $\alpha^{10} = (\alpha^{100}[0] + \omega_2^0 \cdot \alpha^{101}[0], \alpha^{100}[0] - \omega_2^0 \alpha^{101}[0]) = |\omega_2^0 = 1| = (3, 3)$

- (f) $\alpha^{11} = (\alpha^{110}[0] + \omega_2^0 \cdot \alpha^{111}[0], \alpha^{110}[0] - \omega_2^0 \alpha^{111}[0]) = |\omega_2^0 = 1| = (2, 2)$

- (g) $\alpha^0[0] = \alpha^{00}[0] + \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \alpha^{01}[0] = 1$

$$(h) \alpha^0[1] = \alpha^{00}[1] + \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \alpha^{01}[1] = 1$$

$$(i) \alpha^0[2+0] = \alpha^{00}[0] - \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \alpha^{01}[0] = 1$$

$$(j) \alpha^0[2+1] = \alpha^{00}[1] - \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \alpha^{01}[1] = 1$$

$$(k) \alpha^1[0] = \alpha^{10}[0] + \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \alpha^{11}[0] = 5$$

$$(l) \alpha^1[1] = \alpha^{10}[1] + \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \alpha^{11}[1] = 3 + 2i = 3 + 2\omega^2$$

$$(m) \alpha^1[2+0] = \alpha^{10}[0] - \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \alpha^{11}[0] = 1$$

$$(n) \alpha^1[2+1] = \alpha^{10}[1] - \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \alpha^{11}[1] = 3 - 2i = 3 - 2\omega^2$$

$$(o) \text{ Получаем } \alpha^0 = (1, 1, 1, 1), \alpha^1 = (5, 3 + 2i, 1, 3 - 2i) = (5, 3 + 2\omega^2, 1, 3 - 2\omega^2)$$

$$(p) \alpha[0] = \alpha^0[0] + \underbrace{\omega_8^0}_{=1} \alpha^1[0] = 6$$

$$(q) \alpha[1] = \alpha^0[1] + \underbrace{\omega_8^1}_{=\frac{1+i}{\sqrt{2}}} \alpha^1[1] = 1 + \frac{1+i}{\sqrt{2}}(3 + 2i) = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{5}{\sqrt{2}}i = 1 + \omega \cdot (3 + 2\omega^2) = 2\omega^3 + 3\omega + 1$$

$$(r) \alpha[2] = \alpha^0[2] + \underbrace{\omega_8^2}_{=i} \alpha^1[2] = 1 + i = 1 + \omega^2$$

$$(s) \alpha[3] = \alpha^0[3] + \underbrace{\omega_8^3}_{=\frac{-1+i}{\sqrt{2}}} \alpha^1[3] = 1 + \frac{-1+i}{\sqrt{2}}(3 - 2i) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{5}{\sqrt{2}}i = 1 + \omega^3 \cdot (3 - 2\omega^2) = -2\omega^5 + 3\omega^3 + 1$$

$$(t) \alpha[4+0] = \alpha^0[0] - \underbrace{\omega_8^0}_{=1} \alpha^1[0] = -4$$

$$(u) \alpha[4+1] = \alpha^0[1] - \underbrace{\omega_8^1}_{=\frac{1+i}{\sqrt{2}}} \alpha^1[1] = 1 - \frac{1+i}{\sqrt{2}}(3 + 2i) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{5}{\sqrt{2}}i = 1 - \omega \cdot (3 + 2\omega^2) = -2\omega^3 - 3\omega + 1$$


$$(v) \alpha[4+2] = \alpha^0[2] - \underbrace{\omega_8^2}_{=i} \alpha^1[2] = 1 - i = 1 - \omega^2$$

$$(w) \alpha[4+3] = \alpha^0[3] - \underbrace{\omega_8^3}_{=\frac{-1+i}{\sqrt{2}}} \alpha^1[3] = 1 - \frac{-1+i}{\sqrt{2}}(3 - 2i) = 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{5}{\sqrt{2}}i = 1 - \omega^3 \cdot (3 - 2\omega^2) = 2\omega^5 - 3\omega^3 + 1$$

$$(x) \text{ Получаем } \alpha = (6, 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{5}{\sqrt{2}}i, 1 + i, 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{5}{\sqrt{2}}i, -4, 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{5}{\sqrt{2}}i, 1 - i, 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{5}{\sqrt{2}}i)$$

$$(y) \text{ Как многочлен от } \omega: \alpha = (6, 2\omega^3 + 3\omega + 1, 1 + \omega^2, -2\omega^5 + 3\omega^3 + 1, -4, -2\omega^3 - 3\omega + 1, 1 - \omega^2, 2\omega^5 - 3\omega^3 + 1)$$

2. $B = (1, 0, 1, 3, 0, 0, 0, 0)$. Дерево вызовов:



$$(a) \text{ Для } B^{000}, B^{001}, \dots, B^{111} \text{ результат преобразования } \beta^{ijk} = B^{ijk} \text{ (см. 5)}$$

$$(b) \beta^{00} = (\beta^{000}[0] + \omega_2^0 \cdot \beta^{001}[0], \beta^{000}[0] - \omega_2^0 \beta^{001}[0]) = |\omega_2^0 = 1 = \omega^0| = (1, 1)$$

$$(c) \beta^{01} = (\beta^{010}[0] + \omega_2^0 \cdot \beta^{011}[0], \beta^{010}[0] - \omega_2^0 \beta^{011}[0]) = |\omega_2^0 = 1| = (1, 1)$$

$$(d) \beta^{10} = (\beta^{100}[0] + \omega_2^0 \cdot \beta^{101}[0], \beta^{100}[0] - \omega_2^0 \beta^{101}[0]) = |\omega_2^0 = 1| = (0, 0)$$

$$(e) \beta^{11} = (\beta^{110}[0] + \omega_2^0 \cdot \beta^{111}[0], \beta^{110}[0] - \omega_2^0 \beta^{111}[0]) = |\omega_2^0 = 1| = (3, 3)$$

$$(f) \beta^0[0] = \beta^{00}[0] + \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \beta^{01}[0] = 2$$

$$(g) \beta^0[1] = \beta^{00}[1] + \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \beta^{01}[1] = 1 + i = 1 + \omega^2$$

$$(h) \beta^0[2 + 0] = \beta^{00}[0] - \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \beta^{01}[0] = 0$$

$$(i) \beta^0[2 + 1] = \beta^{00}[1] - \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \beta^{01}[1] = 1 - i = 1 - \omega^2$$

$$(j) \beta^1[0] = \beta^{10}[0] + \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \beta^{11}[0] = 3$$

$$(k) \beta^1[1] = \beta^{10}[1] + \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \beta^{11}[1] = 3i = 3\omega^2$$

$$(l) \beta^1[2 + 0] = \beta^{10}[0] - \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \beta^{11}[0] = -3$$

$$(m) \beta^1[2 + 1] = \beta^{10}[1] - \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \beta^{11}[1] = -3i = -3\omega^2$$

$$(n) \text{ Получаем } \beta^0 = (2, 1 + i, 0, 1 - i) = (2, 1 + \omega^2, 0, 1 - \omega^2), \beta^1 = (3, 3i, -3, -3i) = (3, 3\omega^2, -3, -3\omega^2)$$

$$(o) \beta[0] = \beta^0[0] + \underbrace{\omega_8^0}_{=1} \beta^1[0] = 5$$

$$(p) \beta[1] = \beta^0[1] + \underbrace{\omega_8^1}_{=\frac{1+i}{\sqrt{2}}} \beta^1[1] = 1 + i + 3i\frac{1+i}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{3}{\sqrt{2}} + (1 + \frac{3}{\sqrt{2}})i = 1 + \omega^2 + \omega \cdot 3\omega^2 = 3\omega^3 + \omega^2 + 1$$

$$(q) \beta[2] = \beta^0[2] + \underbrace{\omega_8^2}_{=i} \beta^1[2] = -3i = -3\omega^2$$

$$(r) \beta[3] = \beta^0[3] + \underbrace{\omega_8^3}_{=\frac{-1+i}{\sqrt{2}}} \beta^1[3] = 1 - i - 3i\frac{-1+i}{\sqrt{2}} = 1 + \frac{3}{\sqrt{2}} - (1 - \frac{3}{\sqrt{2}})i = 1 - \omega^2 - \omega^3 \cdot 3\omega^2 = -3\omega^5 - \omega^2 + 1$$

$$(s) \beta[4] = \beta^0[0] - \underbrace{\omega_8^0}_{=1} \beta^1[0] = -1$$

$$(t) \beta[5] = \beta^0[1] - \underbrace{\omega_8^1}_{=\frac{1+i}{\sqrt{2}}} \beta^1[1] = 1 + i - 3i\frac{1+i}{\sqrt{2}} = 1 + \frac{3}{\sqrt{2}} + (1 - \frac{3}{\sqrt{2}})i = 1 + \omega^2 - \omega \cdot 3\omega^2 = -3\omega^3 + \omega^2 + 1$$

$$(u) \beta[6] = \beta^0[2] - \underbrace{\omega_8^2}_{=i} \beta^1[2] = 3i = 3\omega^2$$

$$(v) \beta[7] = \beta^0[3] - \underbrace{\omega_8^3}_{=\frac{-1+i}{\sqrt{2}}} \beta^1[3] = 1 - i + 3i\frac{-1+i}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{3}{\sqrt{2}} - (1 + \frac{3}{\sqrt{2}})i = 1 - \omega^2 + \omega^3 \cdot 3\omega^2 = 3\omega^5 - \omega^2 + 1$$

$$(w) \text{ Получаем } \beta = (5, 1 - \frac{3}{\sqrt{2}} + (1 + \frac{3}{\sqrt{2}})i, -3i, 1 + \frac{3}{\sqrt{2}} - (1 - \frac{3}{\sqrt{2}})i, -1, 1 + \frac{3}{\sqrt{2}} + (1 - \frac{3}{\sqrt{2}})i, 3i, 1 - \frac{3}{\sqrt{2}} - (1 + \frac{3}{\sqrt{2}})i)$$

$$(x) \text{ Как многочлен от } \omega: \beta = (5, 3\omega^3 + \omega^2 + 1, -3\omega^2, -3\omega^5 - \omega^2 + 1, -1, -3\omega^3 + \omega^2 + 1, 3\omega^2, 3\omega^5 - \omega^2 + 1)$$


3. Получаем

$$\begin{aligned} \alpha &= (6, 2\omega^3 + 3\omega + 1, 1 + \omega^2, -2\omega^5 + 3\omega^3 + 1, -4, -2\omega^3 - 3\omega + 1, 1 - \omega^2, 2\omega^5 - 3\omega^3 + 1), \\ \beta &= (5, 3\omega^3 + \omega^2 + 1, -3\omega^2, -3\omega^5 - \omega^2 + 1, -1, -3\omega^3 + \omega^2 + 1, 3\omega^2, 3\omega^5 - \omega^2 + 1), \end{aligned}$$

и по 8 получаем, что $\varphi(C) \equiv \gamma = \alpha \times \beta = (30, 6\omega^6 + 2\omega^5 + 9\omega^4 + 8\omega^3 + \omega^2 + 3\omega + 1, -3\omega^4 - 3\omega^2, 6\omega^{10} - 9\omega^8 + 2\omega^7 - 8\omega^5 + 3\omega^3 - \omega^2 + 1, 4, 6\omega^6 - 2\omega^5 + 9\omega^4 - 8\omega^3 + \omega^2 - 3\omega + 1, -3\omega^4 + 3\omega^2, 6\omega^{10} - 9\omega^8 - 2\omega^7 + 8\omega^5 - 3\omega^3 - \omega^2 + 1)$. Но $\omega^8 = 1$, поэтому

$$\gamma = \left\| \begin{array}{c} 30 \\ 6\omega^6 + 2\omega^5 + 9\omega^4 + 8\omega^3 + \omega^2 + 3\omega + 1 \\ -3\omega^4 - 3\omega^2 \\ 2\omega^7 - 8\omega^5 + 3\omega^3 + 5\omega^2 - 8 \\ 4 \\ 6\omega^6 - 2\omega^5 + 9\omega^4 - 8\omega^3 + \omega^2 - 3\omega + 1 \\ -3\omega^4 + 3\omega^2 \\ -2\omega^7 + 8\omega^5 - 3\omega^3 + 5\omega^2 - 8 \end{array} \right\|$$

4. Выполним БПФ для $\gamma = (\gamma_0, \gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4, \gamma_5, \gamma_6, \gamma_7)$ (за $\gamma_0, \dots, \gamma_7$ обозначены коэффициенты выше) Дерево вызовов:



(a) $\Gamma \stackrel{\text{def}}{=} \varphi(\gamma)$

(b) Для $\gamma^{000}, \gamma^{001}, \dots, \gamma^{111}$ результат преобразования $\Gamma^{ijk} = \gamma^{ijk}$ (см. 5)

(c) $\Gamma^{00} = (\Gamma^{000}[0] + \omega_2^0 \cdot \Gamma^{001}[0], \Gamma^{000}[0] - \omega_2^0 \Gamma^{001}[0]) = (\gamma_0 + \gamma_4, \gamma_0 - \gamma_4) = (34, 26)$

(d) $\Gamma^{01} = (\Gamma^{010}[0] + \omega_2^0 \cdot \Gamma^{011}[0], \Gamma^{010}[0] - \omega_2^0 \Gamma^{011}[0]) = (\gamma_2 + \gamma_6, \gamma_2 - \gamma_6) = (-6\omega^4, -6\omega^2)$

(e) $\Gamma^{10} = (\Gamma^{100}[0] + \omega_2^0 \cdot \Gamma^{101}[0], \Gamma^{100}[0] - \omega_2^0 \Gamma^{101}[0]) = (\gamma_1 + \gamma_5, \gamma_1 - \gamma_5) = (12\omega^6 + 18\omega^4 + 2\omega^2 + 2, 4\omega^5 + 16\omega^3 + 6\omega)$

(f) $\Gamma^{11} = (\Gamma^{110}[0] + \omega_2^0 \cdot \Gamma^{111}[0], \Gamma^{110}[0] - \omega_2^0 \Gamma^{111}[0]) = (\gamma_3 + \gamma_7, \gamma_3 - \gamma_7) = (10\omega^2 - 16, 4\omega^7 - 16\omega^5 + 6\omega^3)$

(g) $\Gamma^0[0] = \Gamma^{00}[0] + \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \Gamma^{01}[0] = 34 - 6\omega^4$

(h) $\Gamma^0[1] = \Gamma^{00}[1] + \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \Gamma^{01}[1] = 26 - 6\omega^4 \quad (i = \omega^2)$

(i) $\Gamma^0[2+0] = \Gamma^{00}[0] - \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \Gamma^{01}[0] = 34 + 6\omega^4$

(j) $\Gamma^0[2+1] = \Gamma^{00}[1] - \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \Gamma^{01}[1] = 26 + 6\omega^4$

(k) $\Gamma^1[0] = \Gamma^{10}[0] + \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \Gamma^{11}[0] = 12\omega^6 + 18\omega^4 + 12\omega^2 - 14$

(l) $\Gamma^1[1] = \Gamma^{10}[1] + \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \Gamma^{11}[1] = 4\omega^9 - 16\omega^7 + 10\omega^5 + 16\omega^3 + 6\omega = |\omega^8 = 1| = -16\omega^7 + 10\omega^5 + 16\omega^3 + 10\omega$

(m) $\Gamma^1[2+0] = \Gamma^{10}[0] - \underbrace{\omega_4^0}_{=1} \Gamma^{11}[0] = 12\omega^6 + 18\omega^4 - 8\omega^2 + 18$

(n) $\Gamma^1[2+1] = \Gamma^{10}[1] - \underbrace{\omega_4^1}_{=i} \Gamma^{11}[1] = -4\omega^9 + 16\omega^7 - 2\omega^5 + 16\omega^3 + 6\omega = |\omega^8 = 1| = 16\omega^7 - 2\omega^5 + 16\omega^3 + 2\omega$

(o) $\Gamma[0] = \Gamma^0[0] + \underbrace{\omega_8^0}_{=1} \Gamma^1[0] = 12\omega^6 + 12\omega^4 + 12\omega^2 + 20 = 8$

(p) $\Gamma[1] = \Gamma^0[1] + \underbrace{\omega_8^1}_{=\omega} \Gamma^1[1] = -16\omega^8 + 10\omega^6 + 10\omega^4 + 10\omega^2 + 26 = |\omega^8 = 1| = 10\omega^6 + 10\omega^4 + 10\omega^2 + 10 = 0$

(q) $\Gamma[2] = \Gamma^0[2] + \underbrace{\omega_8^2}_{=\omega^2} \Gamma^1[2] = 12\omega^8 + 18\omega^6 - 2\omega^4 + 18\omega^2 + 34 = |\omega^8 = 1| = 18\omega^6 - 2\omega^4 + 18\omega^2 + 46 = 48$

(r) $\Gamma[3] = \Gamma^0[3] + \underbrace{\omega_8^3}_{=\omega^3} \Gamma^1[3] = 16\omega^{10} - 2\omega^8 + 16\omega^6 + 8\omega^4 + 26 = |\omega^8 = 1| = 16\omega^6 + 8\omega^4 + 16\omega^2 + 24 = 16$

(s) $\Gamma[4] = \Gamma^0[0] - \underbrace{\omega_8^0}_{=1} \Gamma^1[0] = -12\omega^6 - 24\omega^4 - 12\omega^2 + 48 = 72$

(t) $\Gamma[5] = \Gamma^0[1] - \underbrace{\omega_8^1}_{=\omega} \Gamma^1[1] = 16\omega^8 - 10\omega^6 - 22\omega^4 - 10\omega^2 + 26 = -10\omega^6 - 22\omega^4 - 10\omega^2 + 42 = 64$

(u) $\Gamma[6] = \Gamma^0[2] - \underbrace{\omega_8^2}_{=\omega^2} \Gamma^1[2] = -12\omega^8 - 18\omega^6 + 14\omega^4 - 18\omega^2 + 34 = -18\omega^6 + 14\omega^4 - 18\omega^2 + 22 = 8$

(v) $\Gamma[7] = \Gamma^0[3] - \underbrace{\omega_8^3}_{=\omega^3} \Gamma^1[3] = -16\omega^{10} + 2\omega^8 - 16\omega^6 + 4\omega^4 + 26 = -16\omega^6 + 4\omega^4 - 16\omega^2 + 28 = 24$

(w) Получаем $\Gamma = (8, 0, 48, 16, 72, 64, 8, 24)$

(x) $C = AB = \varphi^{-1}(\varphi(AB)) = \varphi^{-1}(\gamma) \stackrel{9}{=} \frac{1}{8}(\Gamma_0, \Gamma_7, \dots, \Gamma_1) = (1, 3, 1, 8, 9, 2, 6, 0)$

(y) Посчитаем произведение напрямую: $A(x)B(x) = (2x^3 + 3x + 1) \cdot (3x^3 + x^2 + 1) = 1 + 3x + x^2 + 8x^3 + 9x^4 + 2x^5 + 6x^6 \longleftrightarrow (1, 3, 1, 8, 9, 2, 6)$ ■

(каноническое) Задача 47

1. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$, $\{t_i\}_{i=0}^{n-1}$, $\{p_i\}_{i=0}^{m-1} \subset \mathbb{N}$ — текст и образец (закодированы положительными целыми числами).

2. Рассмотрим $A_i \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=0}^{m-1} (p_j - t_{i+j})^2 \equiv \sum_{j=0}^{m-1} p_j^2 + t_{i+j}^2 - 2p_j t_{i+j}$

3. p входит в t с позиции $i \stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow} \forall j \in \overline{0, m-1} \hookrightarrow p_j = t_{i+j}$

4. p входит в t с позиции $i \stackrel{\text{Th}}{\Leftrightarrow} A_i = 0$

\Rightarrow : Пусть p входит в t с позиции $i \stackrel{3}{\Rightarrow} \forall j \in \overline{0, m-1} \hookrightarrow p_j = t_{i+j} \Rightarrow A_i = \sum_{j=0}^{m-1} (p_j - t_{i+j})^2 = \sum_{j=0}^{m-1} (0)^2 = 0$ ■

\Leftarrow : Пусть $A_i = 0 \Rightarrow \sum_{j=0}^{m-1} (p_j - t_{i+j})^2 = 0$. Но это сумма квадратов, поэтому каждое слагаемое нулевое: $\forall j \in \overline{0, m-1} \hookrightarrow p_j - t_{i+j} = 0 \stackrel{3}{\Rightarrow} p$ входит в t с позиции i ■

5. Покажем, как вычислить A_i за время $O(n \log n)$ в модели RAM:

$$(a) \quad A_i = \sum_{j=0}^{m-1} p_j^2 + t_{i+j}^2 - 2p_j t_{i+j} = \underbrace{\sum_{j=0}^{m-1} p_j^2}_{A_i^1} + \underbrace{\sum_{j=0}^{m-1} t_{i+j}^2}_{A_i^2} - \underbrace{\sum_{j=0}^{m-1} 2p_j t_{i+j}}_{A_i^3}$$

(b) A_i^1 считается за $O(m)$ один раз (сумма квадратов p_j^2).

```

1  number A1 = 0;
2  for (number i = 0; i < m; i++)
3  {
4      A1 += p[i] * p[i];
5  }
```

(c) A_i^2 . Один раз посчитаем частичные суммы $S_i = \sum_{j=0}^i t_j^2$ за $O(n)$ (прибавляем по одному), сумму квадратов на отрезке индексов $\overline{i, i+m-1}$ вычисляем как разность $S_{i+m-1} - S_{i-1}$ за $O(1)$

```

1  number A2temp[n];
2  A2temp[0] = t[0] * t[0];
3  for (number i = 1; i < n; i++)
4  {
5      A2temp[i] = A2temp[i-1] + t[i] * t[i];
6  }
7
8  number A2[n];
9  A2[0] = A2temp[0];
10 for (number i = 1; i + m - 1 < n; i++)
11 {
12     A2[i] = A2temp[i + m - 1] - A2[i - 1];
13 }
```

(d) A_i^3 . Рассмотрим строки $u \stackrel{\text{def}}{=} t$ и $v \stackrel{\text{def}}{=} p^R 0^{n-m}$ (при $n < m$ задача не имеет решения: образец длиннее текста). Рассмотрим их как коэффициенты многочленов (порядок: начиная от свободного члена). Рассмотрим $u * v$ — коэффициенты произведения этих многочленов. $(u * v)_k = \sum_{j=0}^k v_j u_{k-j} = \sum_{j=0}^k \begin{cases} p_{m-1-j}, & j \leq m-1 \\ 0, & j > m-1 \end{cases} t_{k-j}$. Пусть $k \geq m-1$.

Слагаемые при $j > m-1$ равны нулю (первый множитель равен нулю), поэтому $(u * v)_k = \sum_{j=0}^{m-1} p_{m-1-j} t_{k-j} =$

$$\begin{vmatrix} j' &= m-1-j \\ j &= m-1-j' \end{vmatrix} = \sum_{j'=m-1}^0 p_{j'} t_{k-m+1+j'} = \sum_{j'=0}^{m-1} p_{j'} t_{k-m+1+j'}. \text{ Поэтому } (u * v)_{k+m-1} = \sum_{j'=0}^{m-1} p_{j'} t_{k+j'}.$$

Итак, $A_i^3 = -2(t * p^R 0^{n-m})_{i+m-1}$.

Алгоритм (upperDeg2 — ближайшая степень двойки сверху, fillZeros заполняет нулями справа до указанного размера, fourier — FFT, fourierInverse — обратное FFT):

```

1  number A[n];
2  for(number i = 0; i < n; i++)
3  {
4      A[i] = t[i];
5  }
6
7  number B[n];
8  for(number i = 0; i < m; i++)
9  {
10     B[i] = p[i + m - 1];
11 }
12
13 for(number i = m; i < n; i++)
14 {
15     B[i] = 0;
16 }
17
18 number N = upperDeg2(n);
19
20 number A1[n] = fillZeros(A, 2 * N);
21 number A2[n] = fillZeros(B, 2 * N);
22
23 complexNumber fA1[2 * N] = fourier(A1);
24 complexNumber fA2[2 * N] = fourier(A2);
25
26 complexNumber fC[2 * N];
27 for(number i = 0; i < 2 * N; i++)
28 {
29     fC[i] = fA1[i] * fA2[i];
30 }
31
32 number C[2 * N] = fourierInverse(fC);
33
34 number S3[n];
35 for(number i = 0; i < n - 1; i++)
36 {
37     S3[i] = C[i + m - 1];
38 }

```

Время: $O(n) + O(2n \log 2n) = O(n \log n)$

1. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$, $\{t_i\}_{i=0}^{n-1}$, $\{p_i\}_{i=0}^{m-1} \subset \mathbb{N} \cup \{0\}$ — текст и образец (закодированы положительными целыми числами), 0 обозначает любой символ. Рассмотрим $B_i \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=0}^{m-1} p_j t_{i+j} (p_j - t_{i+j})^2$.

2. p входит в t с позиции $i \Leftrightarrow \forall j \in \overline{0, m-1} \hookrightarrow \begin{cases} p_j = 0 \\ t_{i+j} = 0 \\ p_j = t_{i+j} \end{cases}$. Очевидно, это условие эквивалентно $B_i = 0$.

3. $B_i = \underbrace{\sum_{j=0}^{m-1} p_j^3 t_{i+j}}_{S_1} + \underbrace{\sum_{j=0}^{m-1} p_j t_{i+j}^3}_{S_2} - 2 \underbrace{\sum_{j=0}^{m-1} p_j^2 t_{i+j}^2}_{S_3}$. В пункте 5d было показано, как за $O(n \log n)$ вычислить все суммы $\sum_{j=0}^{m-1} p_j t_{i+j}$.

Поэтому суммы S_1, S_2, S_3 можно вычислить за те же времена, заменив вход. Для S_3 вход $p[i]$ и $t[i]$ заменить на $p[i] * p[i]$ и $t[i] * t[i]$ (возвести в квадрат поэлементно). Суммарное время $3O(n \log n) = O(n \log n)$

1. Уменьшим время до $O(n \log m)$. Пусть $w_i = t[im, im + 2m]$ — подстроки t длины $2m$. Их количество равно $\lceil \frac{n}{m} \rceil$.
2. Докажем утверждение: p входит в t с позиции $i \Leftrightarrow p$ входит в $w_{\lfloor \frac{i}{m} \rfloor}$ с позиции $i - \lfloor \frac{i}{m} \rfloor \cdot m$
 - (a) p входит в t с позиции $i \Leftrightarrow \sum_{j=0}^{m-1} f(p[j], t[i+j]) = 0$, где $f(a, b) = a \cdot b \cdot (a - b)^2$.
 - (b) p входит в $w_{\lfloor \frac{i}{m} \rfloor}$ с позиции $i - \lfloor \frac{i}{m} \rfloor \cdot m \Leftrightarrow \sum_{j=0}^{m-1} f(p[j], w_{\lfloor \frac{i}{m} \rfloor}[i - \lfloor \frac{i}{m} \rfloor \cdot m + j])$
 - (c) Поэтому докажем, что $w_{\lfloor \frac{i}{m} \rfloor}[i - \lfloor \frac{i}{m} \rfloor \cdot m + j] = t[i+j]$, $j \in \overline{0, m-1}$. Действительно, обозначим $k = \lfloor \frac{i}{m} \rfloor$. $w_k = t[mk]t[mk+1]...t[mk+2m]$, поэтому $w_k[l] = t[mk+l]$, $l \in \overline{0, 2m}$. Значит, $w_k[i - mk + j] = t[mk + i - mk + j] = t[i+j]$ при $0 \leq i - mk + j \leq 2m$. Но последнее условие выполняется:
 - i. $k = \lfloor \frac{i}{m} \rfloor \leq \frac{i}{m}$, поэтому $km \leq i$, значит, $i - mk + j \geq 0$, т.к. $j \geq 0$
 - ii. $i - mk = i - \lfloor \frac{i}{m} \rfloor m \leq i - (\frac{i}{m} - 1)m = m$, $j \leq m - 1$, поэтому $i - mk + j \leq 2m - 1 \leq 2m$
3. Алгоритм: выполним предыдущую версию алгоритма на всех $\lceil \frac{n}{m} \rceil$ парах текстов и образцов (w_i, p) . Ответ вычисляется по предыдущему утверждению. По предыдущему утверждению, этот алгоритм корректен. Время работы: $\lceil \frac{n}{m} \rceil O(m \log m) = O(n \log m)$