

Теория и реализация языков программирования.

Задание 5: Регулярные грамматики

Сергей Володин, 272 гр.

задано 2013.10.02


Упражнение 1

1. Докажем, что $\forall G_1 - \text{ПРГ} \exists G_2 - \text{ПГ}: L(G_1) = L(G_2)$: каждая ПРГ является ПГ, так как $T \subset T^*$, $\varepsilon \in T^*$. Поэтому можно взять $G_2 \stackrel{\text{def}}{=} G_1$.
2. Докажем, что $\forall G_2 - \text{ПГ} \exists G_1 - \text{ПРГ}: L(G_1) = L(G_2)$:
 1. Построим по G_2 НКА \mathcal{A} : $L(\mathcal{A}) = L(G_2)$ (алгоритм и доказательство в задаче 2).
 2. По НКА \mathcal{A} построим грамматику G_1 : $L(G_1) = L(\mathcal{A})$ (алгоритм и доказательство в задаче 1).

Упражнение 2

Задача 1

Нет, предложенный алгоритм может построить грамматику, которая не будет праволинейной регулярной. Например, для автомата \mathcal{A}_0 из условия переход $q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1$ по алгоритму должен соответствовать правилу $q_0 \rightarrow \varepsilon q_1$, но это правило не имеет вид $A \rightarrow xB$ ($\varepsilon = x \notin \Sigma$) или $A \rightarrow x$ или $A \rightarrow \varepsilon$.



Далее \mathcal{A} — абстрактный входной автомат


Заметим, что проблему можно решить, преобразовав НКА \mathcal{A} в ДКА \mathcal{B} . Тогда ε -переходов не будет. Остается один случай, в котором $q_0 \in F$, и в q_0 есть переходы из других состояний: $\exists q_1: \delta(q_1, \sigma) = q_0$. Соответствующими правилами были бы $q_0 \rightarrow \varepsilon$, $q_1 \rightarrow \sigma q_0$, которые не подходят для праволинейной регулярной грамматики (аксиома q_0 встречается в правой части при том, что есть переход $q_0 \rightarrow \varepsilon$)

Алгоритм:

1. Преобразуем данный НКА \mathcal{A} в ДКА \mathcal{B} . $L(\mathcal{A}) = L(\mathcal{B})$.
2. По ДКА $\mathcal{B} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ построим другой ДКА $\mathcal{C} = (Q', \Sigma, \delta', q_s, F')$:

- (a) $Q' \stackrel{\text{def}}{=} Q \cup \{q_s\}$ (добавим состояние q_s)
- (b) $\delta'(q, \sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \delta(q_0, \sigma), & q = q_s \\ \delta(q, \sigma), & \text{иначе} \end{cases}$ (добавим такие же переходы из q_s как из q_0)
- (c) $F' \stackrel{\text{def}}{=} F \cup (q_0 \in F ? \{q_s\} : \emptyset)$ (если $q_0 \in F$, то сделаем q_s принимающим)

Пример построения:



Докажем, что $L(\mathcal{B}) = L(\mathcal{C})$:

- a. $L(\mathcal{B}) \subset L(\mathcal{C})$. Пусть $w \in L(\mathcal{B})$.
 - a. $|w| = 0 \Rightarrow w = \varepsilon \Rightarrow q_0 \in F \Rightarrow q_s \in F' \Rightarrow w \in L(\mathcal{C})$ ■
 - b. $|w| > 0 \Rightarrow w = \sigma x, \sigma \in \Sigma, x \in \Sigma^*$. Тогда $\delta'(q_s, w) \equiv \delta'(q_s, \sigma x) = \delta'(\delta'(q_s, \sigma), x)$. Обозначим $q_i \stackrel{\text{def}}{=} \delta'(q_s, \sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \delta(q_0, \sigma)$. Очевидно, что $q_i \neq q_s$ (иначе получим переход $q_0 \xrightarrow{\sigma} q_s$ в \mathcal{B} , но $q_s \notin F$). Значит, $\delta'(q_i, x) = \delta(q_i, x) \Rightarrow \delta'(q_s, w) \equiv \delta'(q_i, x) \equiv \delta(q_i, x) \equiv \delta(q_0, \sigma x) \equiv \delta(q_0, w) \in F$, т.к. $w \in L(\mathcal{B}) \Rightarrow w \in L(\mathcal{C})$ ■
- b. $L(\mathcal{C}) \subset L(\mathcal{B})$. Пусть $w \in L(\mathcal{C})$.
 - a. $|w| = 0 \Rightarrow w = \varepsilon \Rightarrow q_s \in F' \Rightarrow q_0 \in F \Rightarrow \delta(q_0, w) \equiv \delta(q_0, \varepsilon) = q_0 \in F \Rightarrow w \in L(\mathcal{B})$ ■
 - b. $|w| > 0 \Rightarrow w = \sigma x, \sigma \in \Sigma, x \in \Sigma^*$. $F' \ni \delta'(q_s, w) \equiv \delta'(q_s, \sigma x) \equiv \delta'(\delta'(q_s, \sigma), x)$. Аналогично $q_i \stackrel{\text{def}}{=} \delta'(q_s, \sigma) \equiv \delta(q_0, \sigma) \in Q \Rightarrow \delta'(q_i, x) = \delta(q_i, x)$. Получаем $F' \ni \delta(q_s, w) = \delta(q_i, x) = \delta(q_0, w) \Rightarrow \delta(q_0, w) \in F \Rightarrow w \in L(\mathcal{B})$ ■

3. По \mathcal{C} построим ПРГ $G = (Q', \Sigma, P, q_s)$:

$$1. P = \underbrace{\{q_a \longrightarrow \sigma q_b \mid \delta'(q_a, \sigma) = q_b\}}_{(1)} \cup \underbrace{\{q_a \longrightarrow \sigma \mid \delta'(q_a, \sigma) = q_b \in F'\}}_{(2)} \cup \underbrace{\{q_s \in F ? \{q_s \longrightarrow \varepsilon\} : \emptyset\}}_{(3)}.$$

То есть, каждому переходу $q_a \xrightarrow{\sigma} q_b$ в \mathcal{C} соответствует правило $q_a \longrightarrow \sigma q_b$, причем вторая часть тогда и только тогда, когда $q_b \in F'$. Если q_s — принимающее, то добавляется правило $q_s \longrightarrow \varepsilon$.

2. G — ПРГ. Действительно, правила имеют один из видов $(\sigma \in \Sigma) A \longrightarrow \sigma B, A \longrightarrow \sigma$. Поскольку переходов в q_s в \mathcal{C} нет, то аксиома q_s не будет встречаться в правых частях.

Также отметим некоторые свойства правил:

- a. По построению $\forall P \ni p \equiv (\alpha, \beta) \hookrightarrow |\beta|_{\Sigma} - |\alpha|_{\Sigma} \in \overline{0, 1}$, то есть, количество нетерминальных символов справа либо такое же, как слева, либо на 1 больше. Действительно, для групп правил (1) и (2) эта разница равна 1, а для (3) (если там есть правила) разница равна 0.
- b. Также по построению \mathcal{C} для всех правил справа нет q_s , так как в противном случае в \mathcal{C} были бы переходы в q_s , что невозможно.
- c. Правила из (1) и (2) сохраняют количество нетерминальных символов, а (3) уменьшает его на 1.
- d. В правилах слева всегда один нетерминал.
- e. Если $w_1 \dots w_n \equiv w \in L(G), n > 0, \forall i \in \overline{1, n} \hookrightarrow w_i \in \Sigma$, то есть, $q_s \Longrightarrow^* w_1 \dots w_n$, то оно было получено применением $n - 1$ правил из (1), а затем одного правила из (2), то есть, $q_s \Longrightarrow w_1 q_1 \Longrightarrow w_1 w_2 q_2 \Longrightarrow \dots \Longrightarrow w_1 w_2 \dots w_{n-1} q_{n-1} \Longrightarrow w_1 \dots w_n$.

Действительно,

- a. Количество нетерминальных символов в конце равно n , значит, было применено n правил из (1) и (2)
- b. Если первым было применено правило из (3), то количество нетерминалов стало равно 0, и далее ни одно правило не могло быть применено (см. 3(2)d). При этом количество нетерминалов осталось бы равно $0 \neq n$ — противоречие.
- c. Правило из (3) не могло быть применено и далее, так как тогда бы получили q_s в правой части некоторого (предыдущего по выводу) правила.


- d. Из 3(2)eб и 3(2)ес получаем, что применялись только правила из (1) и (2), а из 3(2)еа — что всего таких применений было n .
- e. Применение правила из (2) ранее, чем на последнем шаге привело бы к тому, что количество нетерминальных символов стало бы равно 0, после чего (см. 3(2)d) правила бы применяться не могли. Однако, количество нетерминальных символов было бы меньше n — противоречие.
3. Докажем, что $L(G) = L(\mathcal{C})$, т.е. $\forall w \in \Sigma^* \hookrightarrow w \in L(G) \Leftrightarrow w \in L(\mathcal{C})$:
- a. $|w| = 0 \Rightarrow w = \varepsilon$
- a. $w \in L(\mathcal{C}) \Rightarrow q_s \in F \Rightarrow$ правило $q_s \rightarrow \varepsilon \in P$. Значит, $\varepsilon \equiv w \in L(G)$ ■
- b. $w \in L(G) \Rightarrow$ правило $q_s \rightarrow \varepsilon \in P$. Тогда $q_s \in F' \Rightarrow w \in L(\mathcal{C})$ ■
- b. $n \stackrel{\text{def}}{=} |w| > 0 \Rightarrow w = w_1 \dots w_n, \forall i \in \overline{1, n} \hookrightarrow w_i \in \Sigma$.
- a. $w \in L(\mathcal{C}) \Rightarrow (q_s, w) \equiv (q_s, w_1 \dots w_n) \vdash (q_1, w_2 \dots w_n) \vdash (q_2, w_3 \dots w_n) \vdash \dots \vdash (q_{n-1}, w_n) \vdash (q_n, \varepsilon), q_n \in F'$. Тогда, по построению G имеем $P \ni q_s \rightarrow w_1 q_1, q_1 \rightarrow w_2 q_2, \dots, q_{n-1} \rightarrow w_n$. Значит,
 $q_s \rightarrow w_1 q_1 \rightarrow w_1 w_2 q_2 \rightarrow \dots \rightarrow w_1 w_2 \dots w_{n-1} q_{n-1} \rightarrow w_1 \dots w_n \in \Sigma^* \Rightarrow w \in L(G)$ ■
- b. $w \in L(G) \stackrel{3(2)e}{\Rightarrow} q_s \rightarrow w_1 q_1 \rightarrow w_1 w_2 q_2 \rightarrow \dots \rightarrow w_1 w_2 \dots w_{n-1} q_{n-1} \rightarrow w_1 \dots w_n$, и были применены правила $q_s \Rightarrow w_1 q_1, \dots, q_{n-1} \Rightarrow w_n$ (также см. 3(2)e).
Отсюда $\delta'(q_s, w_1) = q_1, \delta'(q_1, w_2) = q_2, \dots, \delta'(q_{n-1}, w_n) \in F \Rightarrow \delta'(q_s, w) \in F \Rightarrow w \in L(\mathcal{C})$ ■

Применим описанный алгоритм для автомата \mathcal{A}_0 из условия:

1. Построим по \mathcal{A}_0 ДКА \mathcal{B}_0 :



2. Построим \mathcal{C}_0 по \mathcal{B}_0 , как описано в алгоритме:



3. Определим грамматику $G = (\Sigma, Q, P, Q_s)$. Выпишем правила $p \in P$:

Q	ε	a	b
Q_s	$Q_s \rightarrow \varepsilon$	$Q_s \rightarrow aQ_1 a$	$Q_s \rightarrow bQ_2$
Q_0		$Q_0 \rightarrow aQ_1 a$	$Q_0 \rightarrow bQ_2$
Q_1		$Q_1 \rightarrow aQ_1 a$	$Q_1 \rightarrow bQ_3 b$
Q_2			$Q_2 \rightarrow bQ_4 b$
Q_3		$Q_3 \rightarrow aQ_0 a$	$Q_3 \rightarrow bQ_4 b$
Q_4		$Q_4 \rightarrow aQ_0 a$	

Задача 2

Задача 3

Задача 4

Задача 5

Задача 6

Задача 7