

LERNHILFE FÜR DIE PRAXISPHASEN

Zimmerhygiene & Handschuh- wechsel



PLAN

Infektionsprävention in der Pflege – Standards für sichere
Patientenversorgung. Schnelle Orientierung für den
Schichtalltag.

Bestehen ist planbar.

Wann und wie Handschuhe wechseln?

Korrekte Indikationen senken das Infektionsrisiko um bis zu 80%

1 HANDSCHUHWECHSEL - DIE 4 INDIKATOREN

Bei sichtbarer Kontamination

Blut, Körperflüssigkeiten, Ausscheidungen

Zwischen Patienten

Immer, auch zwischen Tätigkeiten an einem Patienten

Nach Entfernung der Handschuhe

Hände waschen vor dem Anziehen neuer Handschuhe

Wenn Handschuhe beschädigt sind

Risse, Löcher oder Nadeleinstiche sofort erkennen

2 HANDSCHUHE RICHTIG ANZIEHEN (PSA ANLEGEFOLGE)

Schritt	Handlung
1. Hände waschen	Immer vor dem Anziehen von Handschuhen
2. Sortencheck	Korrekte Größe, Material (Latex/Nitril), Haltbarkeit prüfen
3. Anzug (linke Hand)	Von oben fassen, über Unterarm ziehen
4. Anzug (rechte Hand)	Mit der linken Hand von oben fassen
5. Glatte Oberfläche	Falten glätten, keine Hohlräume lassen

3 HANDSCHUHE RICHTIG AUSZIEHEN (PSA ABLEGEFOLGE)

Schritt	Technik
1. Außenflächenberührung vermeiden	Nur die Innenseite anfassen; immer die kontaminierte Außenseite nach innen falten
2. Erste Handschuh (rechts)	Mit der linken Hand an der Innenseite des Handgelenks fassen, abstreifen, in die linke Hand falten
3. Zweite Handschuh (links)	Mit den nackten Fingern der rechten Hand unter die Innenseite am Handgelenk fassen, abstreifen und über dem ersten falten
4. Entsorgung	Sofort in den entsprechenden Müllbehälter (infektiöser Müll nach LAGA). Danach Hände waschen!

Hinweis: Diese Orientierung basiert auf dem Standard der KRINKO (Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention) und den Empfehlungen des RKI. Werte können je nach Einrichtungsstandard variieren – im Zweifelsfall gilt immer die interne Hygienerichtlinie.

Zimmerdesinfektion im Überblick

Richtige Reihenfolge und Häufigkeit verhindert Keimverschleppung

4 FLÄCHENDESINFEKTION - REIHENFOLGE

1. Oben nach unten

Immer von oben nach unten desinfizieren (Schwerkraft nutzen)

2. Bereiche:

Wände → Möbel → Boden

3. Kontaktflächen zuerst

Türklinken, Lichtschalter, Handläufe vor großen Flächen

4. Einwirkzeit beachten

Desinfektionsmittel nach Herstellerangabe wirken lassen (meist 30 Sek.)

5 KRITISCHE FLÄCHEN IM PATIENTENZIMMER

Fläche	Häufigkeit
Türklinken, Lichtschalter	3-4× täglich
Bettgitter, Bettrail	Nach jedem Patienten
Infusionsstativ, Monitore	2× täglich + nach Verunreinigung
Toilette, Becken	Nach Benutzung
Nachttische, Beistelltische	2× täglich
Fußboden	1-2× täglich (sichtbare Verunreinigung sofort)

6 CHECKLISTE - TÄGLICHE ZIMMERHYGIENE

- ☐ Handschuhe und Flächendesinfektion-Handschuhe bereitgestellt?
- ☐ Desinfektionsmittel-Spender gefüllt und erreichbar?
- ☐ Bettzeug nach Standards gewechselt (3-5 Tage, oder nach Verunreinigung)?
- ☐ Fenster und Türen regelmäßig gelüftet (mind. 2-3× täglich)?
- ☐ Blüten, Essensreste und feuchte Gegenstände entfernt?
- ☐ Zimmer nach Patientenentlassung grundgereinigt?
- ☐ Spülmaschine für Bettzubehör korrekt bestückt (≥ 65 °C)?

Hinweis: Infektionsschutzmaßnahmen sind patientenabhängig. Bei MRSA, C. difficile oder anderen Erregern gelten striktere Standards – Hygieneplan der Einrichtung beachten! Im Zweifelsfall: Pflegeleitung oder Hygieneteam konsultieren.

Praktische Szenarien & Häufige Fehler

Erkennen Sie sich selbst wieder? Dann jetzt anders machen.

7 DAS SZENARIO - KÖRPERPFLEGE EINES PATIENTEN MIT DURCHFALL

✓ Richtig:

Handschuhe anziehen → Körperpflege durchführen → Zielobjekt (Bettwanne, Bettlaken) wenn sichtbar kontaminiert direkt wechseln → Handschuhe ausziehen → Hände waschen → Neue Handschuhe anziehen → Umgebung desinfizieren (Nachttisch, Bettgitter, Türklinke) → Hände waschen.

✗ Falsch:

Handschuhe anziehen → Körperpflege + Zimmerreinigung mit denselben Handschuhen durchführen → Am Schluss Handschuhe ausziehen. (Fehler: Körperflüssigkeiten auf Oberflächen verschleppt!)

8 TOP-6-FEHLER IN DER HYGIENEPRAXIS

Fehler	Folge	Lösung
Hände nicht waschen vor Handschuhen	Keime unter den Handschuhen vermehren sich	30 Sek. mit Seife & Wasser (oder 20 Sek. Alkohol)
Handschuhe zu lange tragen	Maceration (Haut wird aufgeweicht), Wärmestau	Alle 30 Min. wechseln, nicht länger als 60 Min.
Von Inkontinenz direkt zur Desinfektion	Kontaminierte Handschuhe berühren Oberflächen	Zwischen verschiedenen Tätigkeiten Handschuhe wechseln
Zu viel Desinfektionsmittel auf einmal	Mittel läuft ab, trocknet nicht ein, Kostenverschwendung	Sparsam auftragen, mit Tuch verreiben, nach Herstellerangabe dosieren
Türgriffe vor Boden desinfizieren	Keime vom Boden hängen wieder an der Klinke	Immer oben → unten: Wand → Möbel → Boden
Handschuhe unvorsichtig ausziehen	Außenseite berührt Haut, Keimübertragung	Innenseite-Technik: immer Außenseite nach innen falten

Merksatz für die Prüfung: "Hände, Handschuhe, Flächen - in dieser Reihenfolge denken, und die Hygienerichtlinie beachten. Infektionsprävention ist Teamarbeit."