



Laborwerte kompakt

Die wichtigsten Laborwerte mit Normbereich und was erhöhte oder erniedrigte Werte bedeuten – mit Fokus auf das, was für die Pflege wichtig ist.

Bestehen ist planbar.

Blutbild

Elektrolyte

Niere

Gerinnung

Leber

BGA

7

Themenblöcke

35+

Laborwerte

A4

druckfertig

INHALT

1

Blutbild

2

Elektrolyte

3

Niere & Stoffwechsel

4

Entzündung & Notfall

5

Gerinnung

6

Leber & Pankreas

7

Blutgasanalyse (arteriell)

⚠ Referenzbereiche unterscheiden sich je nach Labor, Methode und Alter. Maßgeblich sind immer die Normwerte auf dem Befund deines Labors.

Laborwerte auf einen Blick

Normbereiche für Erwachsene · ↑ = erhöht · ↓ = erniedrigt

Wert	Normbereich	↑ erhöht bei	↓ erniedrigt bei
BLUTBILD			
Hämoglobin (Hb)	♀ 12–16 · ♂ 13,5–17,5 g/dl	Polyglobulie, Dehydratation	Anämie, Blutung
Hämatokrit (Hk)	♀ 37–47 · ♂ 40–52 %	Dehydratation	Anämie, Überwässerung
Erythrozyten	♀ 4,0–5,2 · ♂ 4,5–5,9 /pl	Polyglobulie	Anämie
Leukozyten	4–10 /nl	Infektion, Entzündung, Kortison	Chemotherapie, Knochenmarkschaden
Thrombozyten	150–400 /nl	Entzündung, nach Blutung	Blutungsgefahr, HIT, Sepsis
ELEKTROLYTE			
Natrium	135–145 mmol/l	Dehydratation	Verwirrtheit, Krampfanfälle
Kalium	3,5–5,0 mmol/l	Herzrhythmusstörungen! Niereninsuffizienz	Rhythmusstörungen, Muskelschwäche, Diuretika
Calcium	2,2–2,6 mmol/l	Hyperparathyreoidismus, Tumor	Tetanie, Kribbeln
Magnesium	0,7–1,1 mmol/l	Niereninsuffizienz	Krämpfe, Rhythmusstörungen
NIERE & STOFFWECHSEL			
Kreatinin	♀ 0,5–0,9 · ♂ 0,7–1,2 mg/dl	Niereninsuffizienz	geringe Muskelmasse
Harnstoff	17–43 mg/dl	Niereninsuffizienz, Dehydratation, GI- Blutung	Leberinsuffizienz
eGFR	> 90 ml/min	–	Nierenfunktion ↓ – Dosis anpassen!
Blutzucker nüchtern	70–100 mg/dl	Diabetes, Stress, Kortison	Hypoglykämie < 70 → Traubenzucker
HbA1c	< 5,7 %	Diabetes (≥ 6,5 %)	–
ENTZÜNDUNG & NOTFALL			
CRP	< 5 mg/l	Infektion, Entzündung	–
Procalcitonin (PCT)	< 0,5 ng/ml	bakterielle Infektion, Sepsis	–
Laktat	0,5–2,2 mmol/l	Schock, Sepsis, Minderperfusion	–
Troponin T (hs)	< 14 ng/l	Herzinfarkt, Myokardschaden	–
NT-proBNP	< 125 pg/ml	Herzinsuffizienz	–
GERINNUNG			
Quick	70–120 %	–	Marcumar, Leberschaden, Vit.-K-Mangel
INR	0,85–1,15	Marcumar (Ziel meist 2–3)	–
aPTT	25–38 s	Heparin, Gerinnungsstörung	–
D-Dimere	< 0,5 mg/l	Thrombose, Lungenembolie, nach OP	–
LEBER & PANKREAS			

GOT (AST)	♀ < 35 · ♂ < 50 U/l	Leber-, Herz-, Muskelschaden	–
GPT (ALT)	♀ < 35 · ♂ < 50 U/l	Leberschaden	–
γ-GT	♀ < 40 · ♂ < 60 U/l	Alkohol, Gallenstau	–
Bilirubin gesamt	< 1,2 mg/dl	Ikterus, Gallenstau, Hämolyse	–
Lipase	< 60 U/l	Pankreatitis	–
Albumin	35–52 g/l	–	Mangelernährung, Leberschaden, Ödeme
BLUTGASANALYSE (ARTERIELL)			
pH	7,35–7,45	Alkalose	Azidose
pO₂	75–100 mmHg	O ₂ -Gabe	Hypoxämie
pCO₂	35–45 mmHg	Hypoventilation (resp. Azidose)	Hyperventilation
HCO₃[–]	22–26 mmol/l	metabolische Alkalose	metabolische Azidose
BE	–2 bis +2 mmol/l	metabolische Alkalose	metabolische Azidose

Für die Pflege besonders wichtig: Kalium (Rhythmusstörungen!), Blutzucker (Hypoglykämie), Thrombozyten und Gerinnung (Blutungsgefahr, Injektionen), Kreatinin/eGFR (Medikamentendosis) und Laktat (Schock). Auffällige Werte immer an den Arzt weitergeben.



Bestehen ist planbar. Mit der PLAN-App.

Prüfungsfragen mit Erklärungen, Krankheitsbilder, Pflegeplanung und KI-Lernhilfe – kostenlos auf plan-nrw.de