

Terminale Maths Expertes

Année 2025 – 2026

Nom :
 Prénom :

DST DE MATHÉMATIQUES N° 1

Corrigé

La rédaction des raisonnements et des résultats comptera pour une part importante dans l'appréciation des copies.

*La calculatrice est **autorisée**.*

Exercice 1 :

Partie A

1. On a $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$ donc l'équation $z^2 + z + 1 = 0$ admet deux racines complexes conjuguées :

$$z_1 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad z_2 = \overline{z_1} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

L'ensemble des solutions est $S = \left\{ -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$.

2.a. $\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \left(-\frac{1}{2} \right)^2 + 2 \times \left(-\frac{1}{2} \right) \times i\frac{\sqrt{3}}{2} + \left(i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \frac{1}{4} - i\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}.$

et $\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 = \overline{\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2} = \overline{-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$

b. On pose $Z = z^2$, on a $z^4 + z^2 + 1 = 0 \iff Z^2 + Z + 1 = 0$. (*)

$$(*) \iff Z_1 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad Z_2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad (\text{question 1})$$

$$\iff z_1^2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad z_2^2 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\iff z_1^2 = \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \quad \text{et} \quad z_2^2 = \left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 \quad (\text{question 2.a})$$

$$\iff z_1 = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{ou} \quad z_1 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad z_2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{ou} \quad z_2 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

L'ensemble des solutions de $z^4 + z^2 + 1 = 0$ est $S = \left\{ \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$.

Partie B

1. $\forall u, v \in \mathbb{C}, \quad (u - v)(u^2 + uv + v^2) = u^3 + u^2v + uv^2 - vu^2 - uv^2 - v^3 = u^3 - v^3.$

2. Pour tout $z \in \mathbb{C}$ on a :

$$P(z) = z^6 - 1 = (z^2)^3 - 1^3 = (z^2 - 1)((z^2)^2 + z^2 \times 1 + 1^2) \quad (\text{question précédente}).$$

$$\text{D'où } P(z) = (z^2 - 1)(z^4 + z^2 + 1) \quad \text{pour tout } z \in \mathbb{C}.$$

3. $P(z) = 0 \iff z^2 - 1 = 0$ ou $z^4 + z^2 + 1 = 0$.

$$\text{On a } z^2 - 1 = 0 \iff z^2 = 1 \iff z = \pm 1 \quad \text{et} \quad z^4 + z^2 + 1 = 0 \iff z \in S \quad (\text{question 2b}).$$

$$\text{Les racines de } P \text{ dans } \mathbb{C} \text{ sont donc : } \pm 1; \frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}; -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 2 :

$$1. A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \times 3 + 1 \times (-2) & 3 \times 1 + 1 \times 0 \\ -2 \times 3 + 0 \times (-2) & -2 \times 1 + 0 \times 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ -6 & -2 \end{pmatrix}.$$

$$2. \det P = 1 \times (-2) - (-1) \times 1 = -2 + 1 = -1 \neq 0 \text{ donc } P \text{ est inversible et } P^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Soit } P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$3. P^{-1}A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 - 2 & 2 \\ -3 + 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\text{et } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 - 2 & 4 - 4 \\ -1 + 1 & -1 + 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = D \quad \text{ainsi } D \text{ est bien une matrice diagonale.}$$

4. Démontrons par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $A^n = PD^nP^{-1}$.

• Initialisation : On vérifie que la propriété est vraie pour $n = 0$:

$$\text{On a } A^0 = I_2 \quad \text{et} \quad PD^0P^{-1} = PI_2P^{-1} = PP^{-1} = I_2 \quad \text{d'où } A^0 = PD^0P^{-1}.$$

• Hérédité : Hypothèse de récurrence : Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé tel que $A^n = PD^nP^{-1}$.

Au rang $n + 1$: On veut démontrer que $A^{n+1} = PD^{n+1}P^{-1}$.

$$A^{n+1} = A^n \times A \quad \text{par définition}$$

$$= (PD^nP^{-1}) \times A \quad \text{par hypothèse de récurrence}$$

$$\text{Et } P^{-1}AP = D \quad (\text{question 3}) \text{ donc } PP^{-1}AP = PD \text{ d'où } I_2APP^{-1} = PDP^{-1}.$$

$$\text{Ainsi } A = PDP^{-1}.$$

$$\text{D'où } A^{n+1} = (PD^nP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^n \underbrace{(P^{-1}P)}_{=I_2} DP^{-1} = PD^n \times DP^{-1}$$

$$\text{Ainsi } A^{n+1} = PD^{n+1}P^{-1}.$$

• La propriété est héréditaire, elle est vraie pour $n = 0$, grâce au principe de récurrence, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$5. \forall n \in \mathbb{N}, \quad D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$PD^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n - 0 & 0 + 1 \\ -2^n - 0 & 0 - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n & 1 \\ -2^n & -2 \end{pmatrix}$$

$$A^n = PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 2^n & 1 \\ -2^n & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - 1 & 2^n - 1 \\ -2^{n+1} + 2 & -2^n + 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{D'où } A^n = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - 1 & 2^n - 1 \\ 2 - 2^{n+1} & 2 - 2^n \end{pmatrix}.$$