Polinomial Karakteristik Matriks

Ambillah persamaan eigenvalue:

$$Au = \alpha u$$
,

dengan A adalah sebuah matriks $n \times n$, u matriks $n \times 1$ (matriks kolom / vektor), dan α suatu nilai. u merupakan eigenvector dari operator / matriks A, dengan eigenvalue α . Paling banyak ada n buah u, n buah α . Carilah semua (n buah) α tersebut. Catatan, dalam bahasan ini dianggap tidak ada degenerasi¹.

Dengan I adalah matriks identitas,

$$Au = \alpha u$$
$$= \alpha I u$$
$$\to (\alpha I - A)u = 0.$$

Solusi trivial adalah bahwa u = 0. Solusi nontrivial $u \neq 0$.

Ambil kasus nontrivial, yang berarti $\alpha I - A$ matriks yang tidak dapat dibalik (*inverted*), tidak memiliki invers, determinannya sama dengan 0.

$$\det((\alpha I - A)u) = 0$$

$$\det(\alpha I - A)\det(u) = 0$$

$$\to \det(\alpha I - A) = 0.$$
(1)

Persamaan (1) merupakan **polinomial karakteristik matriks** A atau sebelumnya dikenal sebagai **persamaan sekuler**. Sisi kiri Pers. (1) merupakan fungsi polinomial berorde n dalam α . Dengan demikian, α **merupakan akar fungsi polinomial** $\det(\alpha I - A)$. Secara numerik α diperoleh dengan memanfaatkan metode-metode pencarian akar fungsi, contoh bisection, yang dikombinasikan dengan langkah-langkah lain, sehingga dapat mencari akar fungsi yang jumlahnya lebih dari satu.

Jika A merupakan matriks diagonal, maka α mudah diperoleh, yaitu α adalah elemen-

¹Pada kasus degenerasi ada lebih dari satu eigenvector yang memiliki eigenvalue yang sama. Pada kasus tersebut terdapat n buah eigenvector u, tapi < n buah eigenvalue α .

elemen diagonal A:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & a_{(n-1)(n-1)} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\alpha I - A = \begin{pmatrix} \alpha - a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha - a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & \alpha - a_{(n-1)(n-1)} & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \alpha - a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\det(\alpha I - A) = \prod_{i=1}^{n} (\alpha - a_{ii})$$

$$= (\alpha - a_{11}) (\alpha - a_{11}) \dots (\alpha - a_{(n-1)(n-1)}) (\alpha - a_{nn})$$

$$= 0$$

$$\rightarrow \alpha = a_{11}, a_{22}, \dots, a_{(n-1)(n-1)}, a_{nn}.$$

Jika A bukan matriks diagonal, maka mencari α lebih rumit. Berikut ini ditunjukkan fungsi polinomial $\det(\alpha I - A)$ untuk A sembarang matriks dan A matriks tridiagonal. α harus dicari sebagai akar fungsi polinomial tersebut.

Fungsi polinomial $det(\alpha I - A)$:

A. A sembarang matriks

n = 1

$$A = \left(a_{11}\right)$$

$$\alpha I - A = \left(\alpha - a_{11}\right)$$

$$\det(\alpha I - A) = \alpha - a_{11}$$

n=2

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\alpha I - A = \begin{pmatrix} \alpha - a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & \alpha - a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\det(\alpha I - A) = (\alpha - a_{11})(\alpha - a_{22}) - a_{12}a_{21}$$

n = 3

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\alpha I - A = \begin{pmatrix} \alpha - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} \\ -a_{21} & \alpha - a_{22} & -a_{23} \\ -a_{31} & -a_{32} & \alpha - a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\det(\alpha I - A) = (\alpha - a_{11}) (\alpha - a_{22}) (\alpha - a_{33}) - (\alpha - a_{11}) a_{23} a_{32} - (\alpha - a_{22}) a_{13} a_{31} - (\alpha - a_{33}) a_{12} a_{21} - a_{12} a_{23} a_{31} - a_{13} a_{32} a_{21}$$

n = 4

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

$$\alpha I - A = \begin{pmatrix} \alpha - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} & -a_{14} \\ -a_{21} & \alpha - a_{22} & -a_{23} & -a_{24} \\ -a_{31} & -a_{32} & \alpha - a_{33} & -a_{34} \\ -a_{41} & -a_{42} & -a_{43} & \alpha - a_{44} \end{pmatrix}$$

$$\det(\alpha I - A) = (\alpha - a_{11})(\alpha - a_{22})(\alpha - a_{33})(\alpha - a_{44}) - (\alpha - a_{11})(\alpha - a_{22})a_{34}a_{43} \\ -(\alpha - a_{11})(\alpha - a_{33})a_{24}a_{42} - (\alpha - a_{11})(\alpha - a_{44})a_{23}a_{32} \\ -(\alpha - a_{22})(\alpha - a_{33})a_{14}a_{41} - (\alpha - a_{22})(\alpha - a_{44})a_{13}a_{31} \\ -(\alpha - a_{33})(\alpha - a_{44})a_{12}a_{21} - (\alpha - a_{11})a_{23}a_{34}a_{42} \\ -(\alpha - a_{11})a_{24}a_{43}a_{32} - (\alpha - a_{22})a_{13}a_{34}a_{41} \\ -(\alpha - a_{22})a_{14}a_{43}a_{31} - (\alpha - a_{33})a_{12}a_{24}a_{41} \\ -(\alpha - a_{33})a_{14}a_{42}a_{21} - (\alpha - a_{44})a_{12}a_{23}a_{31} \\ -(\alpha - a_{44})a_{13}a_{32}a_{21} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} - a_{12}a_{24}a_{43}a_{31} \\ -(\alpha - a_{44})a_{13}a_{32}a_{21} - a_{12}a_{23}a_{34}a_{41} - a_{14}a_{42}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{34}a_{42}a_{21} - a_{13}a_{32}a_{24}a_{41} - a_{14}a_{42}a_{23}a_{31} - a_{13}a_{34}a_{42}a_{21} - a_{13}a_{32}a_{24}a_{41} - a_{14}a_{42}a_{23}a_{31} - a_{14}a_{43}a_{32}a_{21} + a_{12}a_{21}a_{34}a_{43} + a_{13}a_{31}a_{24}a_{42} + a_{14}a_{41}a_{23}a_{32}$$

B. A matriks tridiagonal

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & a_{(n-1)(n-2)} & a_{(n-1)(n-1)} & a_{(n-1)n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & a_{n(n-1)} & a_{nn} \end{pmatrix}$$

n = 1

$$A = \left(a_{11}\right)$$

$$\alpha I - A = \left(\alpha - a_{11}\right)$$

$$\det(\alpha I - A) = \alpha - a_{11}$$

n=2

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\alpha I - A = \begin{pmatrix} \alpha - a_{11} & -a_{12} \\ -a_{21} & \alpha - a_{22} \end{pmatrix}$$

$$\det(\alpha I - A) = (\alpha - a_{11})(\alpha - a_{22}) - a_{12}a_{21}$$

$$= \det(\alpha I - A)_1(\alpha - a_{22}) - a_{12}a_{21},$$

dengan $\det(\alpha I - A)_1$ adalah determinan dari 1×1 bagian pertama (pojok kiri atas) matriks $\alpha I - A$.

n = 3

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\alpha I - A = \begin{pmatrix} \alpha - a_{11} & -a_{12} & 0 \\ -a_{21} & \alpha - a_{22} & -a_{23} \\ 0 & -a_{32} & \alpha - a_{33} \end{pmatrix}$$

$$\det(\alpha I - A) = \{(\alpha - a_{11}) (\alpha - a_{22}) - a_{12}a_{21}\} (\alpha - a_{33}) - (\alpha - a_{11}) a_{23}a_{32}$$

$$= \det(\alpha I - A)_2 (\alpha - a_{33}) - \det(\alpha I - A)_1 a_{23}a_{32},$$

dengan $\det(\alpha I - A)_2$ adalah determinan dari 2×2 bagian pertama (pojok kiri atas) matriks $\alpha I - A$.

n = 4

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

$$\alpha I - A = \begin{pmatrix} \alpha - a_{11} & -a_{12} & 0 & 0 \\ -a_{21} & \alpha - a_{22} & -a_{23} & 0 \\ 0 & -a_{32} & \alpha - a_{33} & -a_{34} \\ 0 & 0 & -a_{43} & \alpha - a_{44} \end{pmatrix}$$

$$\det(\alpha I - A) = \left[\{ (\alpha - a_{11}) (\alpha - a_{22}) - a_{12}a_{21} \} (\alpha - a_{33}) - (\alpha - a_{11}) a_{23}a_{32} \right] (\alpha - a_{44}) - \{ (\alpha - a_{11}) (\alpha - a_{22}) - a_{12}a_{21} \} a_{34}a_{43}$$

$$= \det(\alpha I - A)_3 (\alpha - a_{44}) - \det(\alpha I - A)_2 a_{34}a_{43} ,$$

dengan $\det(\alpha I-A)_3$ adalah determinan dari 3×3 bagian pertama (pojok kiri atas) matriks $\alpha I-A$.

Secara umum untuk matriks tridiagonal Bdengan n>2berlaku relasi rekursi berikut

$$\det(B)_n = \det(B)_{n-1}b_{nn} - \det(B)_{n-2}b_{(n-1)n}b_{n(n-1)}.$$

Berkenaan dengan polinomial karakteristik matriks yang sedang dibahas $B=\alpha I-A.$