

《量子信息基础》2022.5.24 随堂作业:

1. Quantum gate can be expressed by matrix as the following

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$$

In the meantime, it can be expressed by using Dirac notations

$$X = |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0|$$

Hence

$$X|0\rangle = |1\rangle, X|1\rangle = |0\rangle$$

Write down the expression of the following gates using Dirac notations

(a) Z gate;

(b) H gate;

(c) P gate.

(要点: 0 代表 $(1, 0)$, 1 代表 $(0, 1)$)

(a)

$$Z = |0\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|$$

答案正确给 13 分

(b)

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle\langle 0| + |0\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 0| - |1\rangle\langle 1|)$$

答案正确给 14 分

(c)

$$P(\theta) = |0\rangle\langle 0| + e^{i\theta}|1\rangle\langle 1|$$

答案正确给 13 分


2. Calculate the output of the quantum circuit shown in the following figure when the input wave function is

(a) $|10\rangle$;

(b) $|01\rangle$;

(c) $|11\rangle$;

Assume that it is the first qubit that undergoes the Hadamard operation.



(a)

$$H \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

The input of CNOT gate is

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |10\rangle$$

The output of CNOT gate is

$$|\psi'\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |11\rangle$$

答案正确给 20 分

(b)

$$H \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

The input of CNOT gate is

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + |1\rangle) |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |11\rangle$$

The output of CNOT gate is

$$|\psi'\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |10\rangle$$

答案正确给 20 分

(c)

$$H \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

The input of CNOT gate is

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle - |1\rangle) |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |01\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |11\rangle$$

The output of CNOT gate is

$$|\psi'\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |01\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |10\rangle$$

答案正确给 20 分