

А.Н. ВАРЧЕНКО

О ПОЛУНЕПРЕРЫВНОСТИ СПЕКТРА И ОЦЕНКЕ СВЕРХУ
ЧИСЛА ОСОБЫХ ТОЧЕК ПРОЕКТИВНОЙ ГИПЕРПОВЕРХНОСТИ*(Представлено академиком С.П. Новиковым 1 XI 1982)*

Каждая изолированная критическая точка голоморфной функции имеет спектр — конечный набор рациональных чисел [1–3]; спектр тесно связан с большинством других характеристик критической точки [1, 4]. Интересная проблема — выяснить правила изменения спектра при распадах критической точки на более простые. Например, согласно гипотезе В.И. Арнольда спектр полунепрерывен снизу при распадах критической точки (см. [5, 6], п. 1). В настоящей заметке рассматривается произвольная нижняя деформация изолированной критической точки квазиоднородной функции. В этом важном частном случае доказано, что спектр исходной критической точки "гуще" суммарного спектра любого набора критических точек, встречающихся в деформации на одном критическом уровне. Точнее, доказано, что каждый интервал числовой оси длины 1 является множеством полунепрерывности спектра (см. п. 1). Это утверждение влечет гипотезу Арнольда в рассматриваемом случае. Отметим, что это первый пример, в котором гипотеза Арнольда доказывается не перечислением всех распадов, ср. [10]. Теорема о густоте прилагается к вопросу об оценке сверху числа N невырожденных особых точек алгебраической гиперповерхности степени d в $\mathbb{CP}^n$ в зависимости от d . Доказано, что N не больше числа Арнольда $A_n(d)$, где $A_n(d)$ — число целых точек $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ строго внутри куба $(0, d)^n$, для которых $(n-2)d/2 + 1 < \sum k_i \leq nd/2$. При $n=3$ число $A_3(d) = 23d^3/48 +$ (члены меньшей степени по d) оценивает сверху число всех особых точек гиперповерхности. Оценка сверху числа особых точек числом $A_n(d)$ сформулирована в виде гипотезы В.И. Арнольдом в 1981 г. при обсуждении работы Дж. Брюса [11]. Отметим, что оценка Брюса, а также недавняя оценка А.Б. Гивентали при $n=3$ имеют вид: число особых точек $\leq d^3/2 +$ (члены меньшей степени по d).

В заметке использована терминология статей [2, 6].

1. **Формулировка результата.** Пусть $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ — квазиоднородный многочлен типа $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$ и веса 1, имеющий в начале координат изолированную критическую точку. Назовем его нижней деформацией всякий многочлен $F(x, \lambda) = P(x) + \sum \lambda_j \varphi_j(x)$, где $\{\varphi_j\}$ — одночлены квазиоднородного веса меньше 1. Множеством полунепрерывности для данной деформации назовем всякое подмножество $U \subset \mathbb{R}$, обладающее свойством: для любого λ , если $x^1, x^2, \dots, x^s \in \mathbb{C}^n$ — критические точки многочлена $F(\cdot, \lambda)$, имеющие единое критическое значение, то количество чисел спектра исходной критической точки многочлена P , попавших в U , не меньше, чем суммарное количество попавших в U чисел спектров критических точек $x^1, x^2, \dots, x^s$ [6].

Теорема о густоте. Для распадов критической точки квазиоднородного многочлена P в произвольной нижней деформации F любой интервал $(\alpha, \alpha+1)$ является множеством полунепрерывности.

Теорема доказана в пп. 4, 5.

Замечание 1. Теорема о густоте для произвольных распадов простых критических точек и унимодальных критических точек основной серии T доказана в [6]. Там же теорема о густоте доказана для произвольных распадов любых критических точек, но для спектров, приведенных по модулю 2. Вероятно, справедлива гипотеза о полунепрерывности густоты: для любых

распадения любой критической точки множеством полунепрерывности является всякий интервал $(\alpha, \alpha + 1)$.

Следствие. Для распада критической точки квазиоднородного многочлена в произвольной нижней деформации любая полупрямая числовой оси с иррациональным краем является множеством полунепрерывности.

Это следствие доказывает гипотезу В.И. Арнольда [5] о полунепрерывности спектра в нашем частном случае распада квазиоднородной критической точки в нижней деформации.

2. Теорема об оценке. Пусть $Y \subset \mathbb{CP}^n$ — алгебраическая гиперповерхность степени d , имеющая только изолированные особые точки. Тогда число ее невырожденных особых точек не больше числа $A_n(d)$. Если $n = 3$, то число всех особых точек не больше $A_3(d)$.

Доказательство. Выберем в $\mathbb{CP}^n$ аффинные координаты $x_1, x_2, \dots, x_n$ так, чтобы бесконечность не проходила через особые точки гиперповерхности и трансверсально пересекала гиперповерхность. Пусть $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ — аффинное уравнение гиперповерхности. Тогда f легко включается в нижнюю деформацию однородного многочлена P степени d , имеющего изолированную критическую точку. Спектр критической точки многочлена P находится во взаимно однозначном соответствии с целыми точками строго внутри куба $(0, d)^n$. Точке $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ отвечает спектральное число $(k_1 + k_2 + \dots + k_n)/d - 1$. Спектр невырожденной особой точки состоит из одного числа $n/2 - 1$ [7, 2]. Теорема об оценке при $n \neq 3$ получается из теоремы о густоте для интервала $(n/2 - 2 + 1/d, n/2 - 1 + 1/d)$. Для доказательства при $n = 3$ достаточно заметить, что спектр каждой изолированной критической точки голоморфной функции трех переменных пересекается с этим интервалом. Это утверждение следует из полунепрерывности индексов инерции [6].

Замечание 2. Назовем изолированную критическую точку голоморфной функции хорошей, если ее спектр пересекается с интервалом $(n/2 - 3/2, n/2 - 1/2)$. Предыдущее рассуждение с учетом симметрии спектра относительно числа $n/2 - 1$ (см. [2, 1]) доказывает теорему: число хороших особых точек алгебраической гиперповерхности $Y \subset \mathbb{CP}^n$ степени d не больше $A_n(d)$. Помимо критических точек, стабильно эквивалентных критическим точкам функций трех переменных, хорошими являются критические точки полуквазиоднородных функций (определение в [12]). Действительно, спектр полуквазиоднородной критической точки равен спектру соответствующей квазиоднородной [2]. Квазиоднородная критическая точка хорошая согласно теореме о густоте, поскольку в ее подходящей нижней деформации встречаются невырожденные критические точки. Автору неизвестны примеры не хороших критических точек. Из гипотезы о полунепрерывности густоты следует, что таких точек нет.

3. Свойства спектра. В доказательстве теоремы о густоте используются следующие свойства спектра.

а) Число точек спектра изолированной критической точки ростка $f: \mathbb{C}^n, 0 \rightarrow \mathbb{C}, 0$ голоморфной функции, лежащих в полуинтервале $(k, k + 1]$, где $k \in \mathbb{Z}$, равно размерности пространства F^{n-2-k}/F^{n-1-k} , где $\{F^i\}$ — ходжева фильтрация в исчезающих когомологиях. Более того, число точек спектра, равных $\alpha \in (k, k + 1]$, равно $F_\lambda^{n-2-k}/F_\lambda^{n-1-k}$, где $\lambda = \exp(-2\pi i \alpha)$, F_λ^i — это корневое подпространство в F^i собственного числа λ полупростой части оператора монодромии [2, 1].

б) Спектр критической точки ростка $z^p: \mathbb{C}, 0 \rightarrow \mathbb{C}, 0$ равен $\{q/p \mid q = -1, \dots, -p + 1\}$ [2, 1].

в) Если $\{\alpha_i\}, \{\beta_j\}$ — соответственно спектры критических точек ростков $f: \mathbb{C}^n, 0 \rightarrow \mathbb{C}, 0$, $g: \mathbb{C}^l, 0 \rightarrow \mathbb{C}, 0$, то $\{\alpha_i + \beta_j + 1\}$ — спектр критической точки ростка $f + g: \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^l, 0 \times 0 \rightarrow \mathbb{C}, 0$ [2].

г) Пусть $f: \mathbb{C}^n, 0 \rightarrow \mathbb{C}, 0$ — росток голоморфной функции в изолированной критической точке. Рассмотрим росток $f + z^p: \mathbb{C}^{n+1}, 0 \rightarrow \mathbb{C}, 0$. На $\mathbb{C}^{n+1}$ действует циклическая группа Z_p умножения координаты z на корни p -й степени из 1. Это действие индуцирует действие в когомологиях, исчезающих в критической точке ростка $f + z^p$. Индуцированное действие сохраняет весовую и ходжеву фильтрации в исчезающих когомологиях. Более того, для характера χ группы Z_p обозначим

через ${}^{\chi}F^k$ максимальное подпространство ходжева пространства F^k , на котором группа Z_p действует умножением на χ . Тогда $\dim {}^{\chi}F^k / {}^{\chi}F^{k+1}$ равна числу всех точек спектра ростка f , которые после прибавления к ним числа α , где $0 < \alpha < 1$, $\chi((1)) = \exp(2\pi i \alpha)$, попадают в интервал $(n - k - 1, n - k]$, см. [6].

4. Начало доказательства теоремы о густоте. Рассмотрим многочлен $Q(x, z, \lambda) = F(x, \lambda) + z^p$, где $p \in \mathbb{Z}$. Если при некотором λ^0 многочлен $F(\cdot, \lambda^0)$ имеет в $x^0 \in \mathbb{C}^n$ критическую точку, то многочлен $Q(\cdot, \lambda)$ имеет критическую точку в $(x^0, 0) \in \mathbb{C}^{n+1}$ с тем же критическим значением. Спектры соответствующих критических точек связаны свойствами v), г).

Л е м м а. Для любых $q \in \{1, 2, \dots, p-1\}$, $k \in \mathbb{Z}$ количество чисел спектра критической точки многочлена P , попавших в интервал $(k + q/p, k + 1 + q/p)$, не меньше, чем суммарное количество попавших в $(k + q/p, k + 1 + q/p)$ чисел спектров критических точек, возникших на одном критическом уровне многочлена $F(\cdot, \lambda)$ при некотором λ .

Теорема для всех интервалов $(\alpha, \alpha + 1)$ при $\alpha \in \mathbb{Z}$ с очевидностью следует из леммы. Случай $\alpha \in \mathbb{Z}$ см. в замечании 3.

5. Доказательство леммы. Многочлен $P + z^p$ квазиоднороден с весами $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, 1/p)$. Следуя Стинбринку [7], запишем веса квазиоднородности в виде $\omega_i = u_i/v_i$, где $(u_i, v_i) = 1$. Положим $d = \text{НОК}(v_1, v_2, \dots, v_n, p)$. Рассмотрим взвешенное проективное пространство $\mathbb{CP}^{n+1}(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, 1/p, 1/d)$, компактифицирующее $\mathbb{C}^{n+1}$ (координатам (x, z) отвечают веса $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n, 1/p)$). Положим $Y(\lambda, t) = \{(x, z) \in \mathbb{C}^{n+1} \mid Q(x, z, \lambda) = t\}$, $\bar{Y}(\lambda, t)$ — замыкание $Y(\lambda, t)$ в $\mathbb{CP}^{n+1}(\omega, 1/p, 1/d)$. Если гиперповерхность $Y(\lambda, t)$ неособа, то $\bar{Y}(\lambda, t)$ и $\bar{Y}(\lambda, t) \setminus Y(\lambda, t)$ — V -многообразия [7]. Пространство $H^n(Y(\lambda, t))$ в этом случае несет смешанную структуру Ходжа, включаемую в точную последовательность смешанных структур Ходжа $0 \rightarrow P^n(Y) \rightarrow H^n(Y) \rightarrow P^{n-1}(\bar{Y} \setminus Y) \rightarrow 0$, где P^j — соответствующие примитивные когомологии [7, 1]. Размерности подпространств ходжевой фильтрации в $P^n(\bar{Y}(\lambda, t))$, $P^{n-1}(Y(\lambda, t) \setminus Y(\lambda, t))$ не зависят от выбора неособой $Y(\lambda, t)$. На $\bar{Y}(\lambda, t)$, $Y(\lambda, t)$ согласованно, голоморфно действует Z_p , см. г). Поэтому Z_p сохраняет ходжевы подпространства в $P^n(\bar{Y}(\lambda, t))$, $P^{n-1}(Y(\lambda, t) \setminus Y(\lambda, t))$. Для любого характера χ группы Z_p размерности ходжевых подпространств ${}^{\chi}F^k P(\bar{Y}(\lambda, t))$, ${}^{\chi}F^k P(Y(\lambda, t) \setminus Y(\lambda, t))$ не зависят от выбора неособой $Y(\lambda, t)$, в частности, такие же, как для $Y(0, t)$ при $t \neq 0$.

Пусть для некоторого (λ^0, t^0) гиперповерхность $Y(\lambda^0, t^0)$ особа и ее особые точки $y^j = (x^j, 0)$, $j = 1, 2, \dots, s$. Рассмотрим семейство гиперповерхностей уровня многочлена $Q(\cdot, \lambda^0)$ для значений уровня, близких к t^0 . А именно, положим $\xi = t - t_0$ и рассмотрим семейство $Y_{\xi} = Y(\lambda^0, t)$ при $|\xi| \leq 1$. С каждой критической точкой y^j многочлена $Q(\cdot, \lambda^0)$ ассоциировано ее расслоение Милнора. Его слой над точкой ξ , $\xi \neq 0$, обозначим через X_{ξ}^j . Естественное вложение $X_{\xi}^j \hookrightarrow Y_{\xi}$ индуцирует эпиморфизм $H^n(Y_{\xi}) \rightarrow {}_{\theta_j} H^n(X_{\xi}^j)$, см. [8]. Далее к семейству $\{Y_{\xi}\}$ при $|\xi| \leq 1$ приложим результаты Стинбринка из [1]. Стинбринк рассматривает чистую структуру Ходжа в $H^k(\bar{Y}_{\xi})$, $\xi \neq 0$, $k \geq 0$, определяет: предельную при $\xi \rightarrow 0$ смешанную структуру Ходжа (ССХ) в $H^k(\bar{Y}_{\xi})$, ССХ в каждом $H^n(X_{\xi}^j)$, $j = 1, 2, \dots, s$, ССХ в $H^k(\bar{Y}_0; \bigcup_j y^j)$ (как двойственную ССХ к стандартной в $H^{2n-k}(Y \cup \bigcup_j y^j)$), затем

доказывает, что эти структуры связаны точной последовательностью морфизмов ССХ

$$\rightarrow H^n(\bar{Y}_\xi) \rightarrow \oplus_j H^n(X_\xi^j) \rightarrow H^{n+1}(\bar{Y}_0; \bigcup_j Y^j) \rightarrow,$$

где 2-я стрелка индуцирована вложением. Отметим, что в [1] эти утверждения доказаны при $s = 1$, однако увеличение числа s не изменяет доказательства. Ограничение предельной ССХ в $H^n(\bar{Y}_\xi)$ на $P^n(\bar{Y}_\xi)$ — тоже ССХ. Ходжева фильтрация $\{\lim F^k\}$ предельной ССХ на $P^n(\bar{Y}_\xi)$ сохраняется действием группы Z_p . Это очевидно для конструкции предела Шмида [9], дающей тот же результат, см. приложение в [1]. Более того, размерности подпространств ${}^X F^k P(\bar{Y}_\xi)$ для всех характеров χ не изменяются при переходе к пределу.

Пусть M — оператор монодромии в $H^n(\bar{Y}_\xi)$, $H^n(Y_\xi)$, $H^n(X_\xi^j)$, порожденный обходом ξ вокруг 0. M сохраняет $P^n(\bar{Y}_\xi) \subset H^n(Y_\xi)$. На $H^n(Y_\xi)/P^n(\bar{Y}_\xi)$ M — тождественное преобразование. Обозначим индексом $\neq 1$ объединение всех корневых подпространств полупростой части оператора M с собственными числами, не равными 1. Тогда $P_{\neq 1}^n(\bar{Y}_\xi) \rightarrow \oplus_j H_{\neq 1}^n(X_\xi^j)$ — эпиморфизм. Таким образом, для любого характера χ группы Z_p

$$\lim {}^X F_{\neq 1}^k / \lim {}^X F_{\neq 1}^{k+1} \rightarrow \oplus_j {}^X F_{\neq 1}^k H^n(X_\xi^j) / {}^X F_{\neq 1}^{k+1} H^n(X_\xi^j)$$

— тоже эпиморфизм. Поэтому размерность пространства слева не меньше размерности пространства справа. Вычисляя размерности пространств с помощью а), г), получаем лемму.

З а м е ч а н и е 3. Теорема о густоте для интервалов $(\alpha, \alpha + 1)$ при $\alpha \in Z$ доказывается тем же рассуждением, но примененным не к $P + z^P$, а к P .

Теорема о полунепрерывности комплексного показателя особости. Пусть $f: C^n, 0 \rightarrow C, 0$ — росток в изолированной критической точке, α — его наименьшее спектральное число. Пусть $\alpha \leq 0$. Тогда α полунепрерывно снизу при деформациях ростка.

Доказательство будет приведено в другой статье.

Интерес автора к указанной тематике стимулирован В.И. Арнольдом, большое влияние на автора оказали обсуждения указанных вопросов с А.Б. Гивенталем. Автор приносит В.И. Арнольду и А.Б. Гивенталю глубокую благодарность.

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Поступило
9 XI 1983

ЛИТЕРАТУРА

1. Steenbrink J. — Nordic Summer School. Symp. in Math. Oslo, August, 1976, p. 525.
2. Варченко А.Н. — Изв. АН СССР. Сер. матем., 1981, т. 45, № 3, с. 540.
3. Варченко А.Н. — Функци. анализ и его прилож., 1982, т. 16, № 1, с. 1.
4. Арнольд В.И. — Там же, 1978, т. 12: № 1, с. 1.
5. Arnold V.I. — V.K. Patodi memorial volume. Bombay, 1979, p. 1.
6. Варченко А.Н. — ДАН, 1983, т. 270, № 2.
7. Steenbrink J. — Compositio Math., 1977, vol. 34, № 2, p. 211.
8. Гусейн-Заде С.М. — УМН, 1977, т. 32, № 2, с. 23.
9. Schmid W. — Inventiones Math., 1973, vol. 22, p. 211.
10. Горюнов В.В. — Вестн. МГУ. Математика, 1981, № 4, с. 19.
11. Bruce J. — Bull. Lond. Math. Soc., 1981, vol. 13, № 1, p. 47.
12. Арнольд В.И. — УМН, 1975, т. 30, № 5, с. 3.

