17. 심장진찰 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 6문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 김홍년

2025년 시험 20번 · 출제자 김홍련

1. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 맥박수 측정은 일반적으로 요골동맥을 촉진하고, 맥박이 규칙적이면 15초 또는 30초간 측정하고 맥박수가 불규칙한 경우(심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가며 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 심장 진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

④ 심음 청진 시, 환자를 좌측와위(left decubitus position)를 취하게 한 뒤, 청진기의 종(bell)을 통해 Aortic regurgitation을 청진한다.

⑤ 심장 촉진에서 진전(thrill)이 느껴진다면 심잡음의 강도(Murmur Grades) 4/6에 해당한다.

> **정답 ④**
>
> ④가 틀렸다. 대동맥판 역류(AR)는 고음의 확장기 잡음이므로, 환자를 앉혀 앞으로 숙이게 하고 숨을 내쉰 상태에서 왼쪽 복장뼈 가장자리를 청진기의 진동판(diaphragm)으로 듣는다. 왼쪽 옆으로 눕힌 자세(좌측와위)에서 종(bell)으로 심장끝을 듣는 것은 승모판 협착, S3 · S4 같은 저음을 들을 때다. 나머지(맥박 측정 시간, 경동맥 촉진은 한쪽씩 · 청진 시 숨 참기, 시진-촉진-타진-청진 순서, 진전이 있으면 4/6 이상)는 맞는 설명이다.

2024년

2024년 시험 15번 · 출제자 김홍련

2. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 심장진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

② 맥박수 측정은 요골동맥을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정하되 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

③ 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가며 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

④ 심음 청진 시, Aortic regurgitation, mitral regurgitation 등과 같은 high pitch음을 청진할 때는 청진기의 종(bell)을 사용한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 앞으로 숙이게 한 뒤, 청진기의 진동판(diaphragm)을 사용하여 심장을 청진한다

> **정답 ④**
>
> ④가 틀렸다. 대동맥판 역류 · 승모판 역류 같은 고음의 소리는 청진기의 진동판(diaphragm)으로 듣고, 종(bell)은 S3 · S4, 승모판 협착 잡음 같은 저음을 들을 때 쓴다. ⑤처럼 환자를 앞으로 숙이게 하고 진동판으로 청진하면 대동맥판 역류 잡음을 잘 들을 수 있다. 나머지(시진-촉진-타진-청진 순서, 맥박 측정 시간, 경동맥 촉진은 번갈아 한쪽씩)는 맞는 설명이다.

2023년 담당 김홍년

2023년 시험 6번

3. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 다음 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 심장진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽을 번갈아 가면서 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 맥박수 측정은 요골동맥을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정한다.

④ 맥박수가 불규칙한 경우 (심방세동 등)에는 60초간 맥박수를 측정한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 왼쪽 옆으로 돌아눕게 한 후 청진기의 종(bell)으로 심장 끝을 청진한다

> **정답 ④**
>
> 원본에서는 ④가 틀린 설명으로 표시되어 있다. 일반적으로 규칙적인 맥박은 15초 또는 30초간 세어 환산하고, 심방세동처럼 불규칙한 경우에는 60초간 센다. 다만 불규칙한 리듬에서는 요골동맥으로 전달되지 않는 박동(맥박결손)이 있어 요골동맥 촉진만으로는 정확하지 않으므로, 심장끝(심첨부)에서 청진으로 60초간 세는 것이 원칙이다.
> ※ 확인 필요: ④의 문장 자체는 교과서적으로 맞는 설명이고 다른 보기(시진-촉진-타진-청진 순서, 경동맥 촉진은 한쪽씩 · 청진 시 숨 참기, 15~30초 측정, 좌측와위에서 종으로 심장끝 청진)도 맞는 설명이다. 출제 의도(예: 요골동맥이 아닌 심첨부 청진)를 강의 자료로 확인하세요.

2022년

2022년 시험 1번

4. 다음은 심장 진찰에 대한 설명이다. 보기 중 틀린 것을 고르시오.

① 맥박수 측정은 요골동맥(radial artery)을 촉진하여 시행하며 15초 또는 30초간 측정한다.

② 경동맥 검사 시, 촉진은 양쪽 목동맥을 동시에 시행하고, 청진 시에는 환자에게 호흡을 멈추도록 한다.

③ 심장 진찰은 시진, 촉진, 타진, 청진 순으로 진행한다

④ 심음 청진 시, 대동맥판막 역류(aortic regurgitation), 승모판막 역류(mitral regurgitation)등과 같은 high pitch음을 청진할 때는 청진기의 진동판(Diaphragm)을 사용한다.

⑤ 심음 청진 시, 환자를 왼쪽 옆으로 돌아눕게 한 후 청진기의 종(bell)으로 심장 끝을 청진한다.

> **정답 ②**
>
> ②가 틀렸다. 경동맥 촉진은 한쪽씩 번갈아 해야 하며, 양쪽을 동시에 누르면 뇌혈류가 줄거나 경동맥동 반사로 서맥 · 실신이 생길 수 있다. 청진할 때는 숨을 잠깐 멈추게 해 호흡음을 없앤다. 고음(대동맥판 · 승모판 역류 잡음)은 진동판으로, 저음은 좌측와위에서 종으로 심장끝을 청진하는 것이 맞다.
>
> 원본 오답노트
>
> 경동맥 촉진은 한 쪽시 번갈아 시행하여야 하며, 동시에 하는 것은 환자의 실신 등을 유
> 발할 수 있으므로 피해야 한다.

2021년

2021년 시험 8번

5. 심장진찰에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 리듬이 불규칙해도 촉진으로 정확한 맥박수를 알 수 있다.

② 혈량저하 상태에서는 환자의 머리를 높이고 목정맥을 진찰한다.

③ 청진기의 진동판은 제 1심음, 제 2심음과 같은 고음을 청진하는데 유용하다.

④ 심장끝 박동은 심장 질환의 유무와 관계없이 항상 일정한 위치에서 촉진된다.

⑤ 가슴진찰은 의료 행위이기 때문에 환자의 동의를 구하지 않고 시행해도 무관하다.

> **정답 ③**
>
> ③ 진동판은 S1, S2, 역류성 잡음 같은 고음을 듣는 데 유용하다(종은 S3, S4 같은 저음). ① 리듬이 불규칙하면 맥박결손이 있어 촉진으로는 정확한 맥박수를 알 수 없고 심첨부 청진이 필요하다. ② 혈량저하 때는 목정맥이 낮아 보이지 않으므로 머리를 낮추어(눕혀) 진찰한다. ④ 심장끝 박동은 심비대 · 폐질환 · 임신 등에서 위치가 바뀐다. ⑤ 가슴 진찰도 설명하고 동의를 받은 뒤 시행해야 한다.

2020년

2020년 시험 88번

6. 심장진찰에 대한 내용으로 옳은 것은?

① 맥박수가 비정상적으로 느리면 15초 동안 측정하여 맥박을 측정한다.

② 임신이나 왼쪽 횡격막이 상승하면 심장끝 박동이 오른쪽 위로 이동한다

③ 갑상샘 항진, 빈혈, 대동맥협착증이 있으면 심장끝 박동의 강도가 증가한다

④ 진동판 (diaphragm)은 제3심음, 제 4심음과 같은 저음을 청진하는데 유용하다.

⑤ 종 (bell)은 대동맥, 승모판 부전에 의한 잡음과 같은 비교적 고음을 청진하는데 유용하다.

> **정답 ③**
>
> ③ 갑상샘 항진, 빈혈(고박출 상태)과 대동맥협착(압력 과부하로 좌심실 비대)에서는 심장끝 박동이 강해진다. ① 맥박이 비정상적으로 느리거나 불규칙하면 60초 동안 측정한다. ② 임신이나 왼쪽 횡격막 상승 시 심장끝 박동은 위쪽 · 왼쪽(바깥쪽)으로 이동한다. ④ 진동판은 고음, S3 · S4 같은 저음은 종으로 듣는다. ⑤ 대동맥 · 승모판 역류 같은 고음 잡음은 진동판으로 듣는다.