29. 급성 통증관리

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 10문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 전영훈

2025년 시험 44번 · 출제자 전영훈

1. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① Cox 2 selective 소염진통제는 출혈 위험도를 증가 시킬 수 있다.
② Acetaminophen은 소화기와 신장기능 이상 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.
③ 비선택적 소염진통제는 식도 정맥류 환자에게 안전하게 사용할 수 있다.
④ 마약성 진통제의 정맥투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다
⑤ 수술 후 통증은 신경병증성 통증으로 만성화되는 경향이 크다.

2025년 시험 79번 · 출제자 전영훈

2. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

① 통증 평가는 환자의 주관적인 진술이 가장 중요하다.
② 수술 후 통증 관리는 주치의가 선호하는 진통 방법을 먼저 고려하다.
③ 만성 수술후 통증은 수술 후 6개월이상으로 노인 환자에서 많이 발생한다.
④ Preventive analgesia는 수술전 주기동안 통증예방에 집중한다
⑤ Multimodal analgesia는 여러 진통 방법을 제공하여 수술 후 합병증을 감소시킨다.

2024년

2024년 시험 17번 · 출제자 전영훈

3. 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① Cox 2 selective 소염진통제는 신장기능에 영향을 미치지 않는다
② Acetaminophen은 위염이나 위장관 출혈의 위험성을 증가시킨다
③ Cox 2 selective 소염진통제는 위염이나 위궤양의 위험성을 증가시킨다
④ 마약성 진통제의 경구투여로 변비가 발생할 경우 패취형(경피투여)을 고려한다
⑤ 전신마취에서 신경차단법의 동반 사용은 마취제 투여량을 줄여 빠른 회복에 도움이 된다.

2024년 시험 36번 · 출제자 전영훈

4. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

① 간이나 신기능 이상 환자는 소염진통제를 우선 고려한다
② 항우울제는 통증조절능력이 없고 우울증치료에 사용한다.
③ 수술이나 외상으로 인한 통증에는 항경련제를 일차적으로 고려한다.
④ 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
⑤ 신경병증성 통증은 통증치료에 반응이 떨어져 만성화가 잘 된다.

2023년 담당 전영훈

2023년 9월 11일 시험 9번 · 출제자 전영훈

5. 가장 올바른 것을 고르시오

통증이 미치는 영향에 대하여 옳은 것은

① 통증은 신경 가소성을 통하여 소실된다.
② 심리적 스트레스는 통증유발물질의 분비를 억제 한다.
③ 통증 시각점수 2이상 부터 일상생활에 문제를 일으킨다.
④ 통증은 교감신경계를 억제시켜 만성통증으로 진행된다.
⑤ 통증은 신경계에 구조적 변화를 유발시켜 만성통증으로 진행된다.

2023년 9월 11일 시험 26번 · 출제자 전영훈

6. 다음중 가장 올바른 것을 고르시오

수술 후 통증 치료에 대하여 올바른 것은?

① 수술 후 통증은 대부분 신경병증성 통증이 많다.
② Nonsteroidal antiinflammatory drug (NSAID)은 작용이 느려 적합하지 않다.
③ 마약제제는 수술 후 오심 구토를 억제하므로 사용을 권장한다.
④ 신경차단술은 전신마취에서 환자의 의식 회복을 지연시키는 단점이 있다.
⑤ NSAID보다는 acetaminophen 사용이 출혈 위험성을 줄일 수 있다

2023년 9월 11일 시험 65번 · 출제자 전영훈

7. 가장 올바른 것으로 고르시오

통증 조절에 관하여 올바른 것은?

① 신장기능의 저하시에는 일차적으로 마약제재나 NSAID를 고려한다.
② 항우울제는 통증과 우울증 증세가 동반되는 경우에 고려한다.
③ 항경련제는 침해성 통증 질환이 있을 경우 일차적으로 고려한다.
④ 마약제재로 인한 변비는 장시간 사용하면 대부분 사라진다.
⑤ 신경병증성 통증은 통증치료에 저항성을 가지는 경우가 많다.

2021년

2021년 시험 8번

8. 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오

수술 후 급성 통증 치료에서 옳은 것은?

① 환자의 주관적인 진술에 의해 통증평가를 한다.
② 수술종류나 환자의 과거력 그리고 선호하는 약 등을 고려한다.
③ Acetaminophen은 혈소판을 억제하여 출혈가능성을 높인다.
④ 소염진통제(NSAID)는 신기능 장애의 환자에서 안전성이 높다
⑤ Multimodal 방법은 부작용을 증가시켜 입원기간이 길어진다.

2021년 시험 12번

9. 적합한 답을 하나만 고르시오

통증 조절에 관하여 옳은 것은?

① WHO통증조절법에 따르면 항경련제는 2단계부터 투여한다.
② 신경병증성 통증은 대체로 상처가 회복됨에 따라 사라진다.
③ 마약제재는 환자가 원할 때마다 주는 것을 원칙으로 한다.
④ 삼환계 항우울제는 우울증 개선과 함께 통증억제 작용도 있다.
⑤ 마약제재로 인한 변비와 가려움증의 부작용은 사용시간에 따라 개선된다.

2020년

2020년 시험 83번

10. 수술 후 통증 치료에서 옳은 것은?

① 통증의 평가는 영상검사를 통하여 객관화하는 것이 중요하다.
② 주로 통각수용성 통증으로 자극에 비례하여 통증이 심해진다.
③ Acetaminophen은 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.
④ 소염진통제(NSAID)는 신기능 및 간기능 장애의 환자에게 안전성이 높다.
⑤ 신경차단은 국소순환을 감소 시켜 상처 회복을 억제한다.