# 18. 폐진찰 / 호흡음 (OSCE 강의)

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 9문항 · 정답 · 해설판

## 2025년 담당 최선하

2025년 시험 21번 · 출제자 최선하

### 1. 다음 가슴 및 폐 진찰에 대한 설명 중 옳지 않는 것을 고르시오.

① 호흡하는 모습과 흉곽의 전체적인 모습을 확인하고 흉부 후면 진찰 후 전면 진찰을 시행한다.

② 시진, 촉진, 타진, 청진 순서로 이루어 진다.

③ **폐 실질의 밀도가 증가하면 호흡음이 감소 한다.**

④ 타진을 위해 한쪽 손의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다.

⑤ 청진을 위해 청진기의 진동판을 따뜻하게 한 후, 위에서 아래로, 좌우 대칭이 되게 “ㄹ”자 또는 “Z” 순서로 폐의 대칭부위를 비교하며 청진한다.

> **정답 ③**
>
> ③이 틀렸다. 폐렴처럼 폐 실질의 밀도가 증가(경화)하면 소리가 잘 전달되어 기관지 호흡음이 들리고 촉각진탕음 · 음성 전달이 증가한다. 호흡음이 감소하는 것은 흉막삼출, 기흉, 폐과팽창(COPD), 기도 폐쇄처럼 소리 전달이 방해될 때다. 나머지(후면 먼저 진찰, 시진-촉진-타진-청진 순서, 중지 끝 마디를 갈비뼈와 평행하게 갈비뼈 사이에 밀착한 타진판, 좌우를 비교하며 ㄹ자 · Z자 순서로 청진)는 맞는 설명이다.

## 2024년

2024년 시험 25번 · 출제자 최선하

### 2. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

② 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.

④ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

⑤ **타진시 양측 대칭으로 이동하며 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.**

> **정답 ⑤**
>
> ⑤ 타진은 좌우 대칭 부위를 비교하면서 ㄹ자 또는 Z자 순서로 내려가며 시행한다. ① 촉각진탕음은 낮은 음으로 크게 말하게 해야 진동이 잘 느껴진다. ② 호흡수는 환자가 의식하면 달라지므로 측정한다고 알리지 않고(맥박을 재는 것처럼 하면서) 측정한다. ③ 간접 타진은 왼손 중지를 흉벽에 밀착해 타진판으로 삼고 그 위를 오른손 중지로 두드린다. ④ 순서는 시진-촉진-타진-청진이다.

2023년 시험 2번

### 3. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

② 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.

④ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

**⑤ 타진시 양측 대칭으로 이동하며 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.**

**정답 ⑤**

⑤ 타진은 좌우 대칭 부위를 비교하면서 ㄹ자 또는 Z자 순서로 내려가며 시행한다. ① 촉각진탕음은 낮은 음으로 크게 말하게 해야 진동이 잘 느껴진다. ② 호흡수는 환자가 의식하면 달라지므로 측정한다고 알리지 않고(맥박을 재는 것처럼 하면서) 측정한다. ③ 간접 타진은 왼손 중지를 흉벽에 밀착해 타진판으로 삼고 그 위를 오른손 중지로 두드린다. ④ 순서는 시진-촉진-타진-청진이다.

원본 오답노트

Tactile fremitus (촉각진탕음) : 환자가 말을 할 때 bronchopulmonary tree를 통해 chest wall 로 전달되는, 손으로 감지할 수 있는 진동. 이를 통하여 폐실질과 흉곽의 밀도에 관한 정보를 얻을 수 있음. 환자가 호흡하는 것이 평가되고 있다고 인식을 하게되면, 호흡의 패턴과 호흡수가 평소와 다르게 변할 수 있음 => 호흡을 평가하고 있다는 사실을 모르도록 맥박을 재는 시늉을 하면서 눈으로 환자의 얼굴과 가슴을 관찰하여 호흡수를 재고, 호흡패턴을 확인한다 의사는 환자의 등 뒤 약간 옆으로 선 후, 한쪽 손(보통 왼손)의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다. 흉부진찰은 시진 촉진 타진 청진 순서로 진행한다.

## 2022년

2022년 시험 16번

### 4. 다음 가슴 및 폐 진찰에 대한 설명 중 옳지 않는 것을 고르시오.

① 호흡하는 모습과 흉곽의 전체적인 모습을 확인하고 흉부 후면 진찰 후 전면 진찰을 시행한다.

② 시진, 촉진, 타진, 청진 순서로 이루어 진다.

③ 촉각 진탕음 (Tactile fremitus) 확인하기 위해 환자에게 높고 빠르게 울리는 단어를 반복하여 말하도록 한다.

④ 타진을 위해 한쪽 손의 중지 끝 마디 (DIP) 를 갈비뼈와 평행하게 하여 갈비뼈 사이 흉벽에 단단히 고정하고 밀착하면서 힘껏 뒤로 젖혀 타진판이 되도록 한다.

⑤ 청진을 위해 청진기의 진동판을 따뜻하게 한 후, 위에서 아래로, 좌우 대칭이 되게 “ㄹ”자 또는 “Z” 순서로 폐의 대칭부위를 비교하며 청진한다.

> **정답 ③**
>
> ③이 틀렸다. 촉각진탕음은 환자가 말할 때 기관지 · 폐를 통해 흉벽으로 전달되는 진동으로, 손바닥의 자측면을 흉벽에 대칭으로 대고 환자에게 낮은 음으로 크게 울리는 단어를 반복해 말하게 해야 잘 느껴진다(높은 음이나 작은 목소리는 진동이 약하다). 나머지(후면 먼저 진찰, 시진-촉진-타진-청진 순서, 타진판 만드는 법, ㄹ자 · Z자 순서로 좌우 비교 청진)는 맞는 설명이다.
>
> 원본 오답노트
>
> * Tactile fremitus (촉각진탕음) : 환자가 말을 할 때 bronchopulmonary tree를 통해 chest wall 로 전달되는, 손으로 감지할 수 있는 진동. 이를 통하여 폐실질과 흉곽의 밀도에 관한 정보를 얻을 수 있음
> 진찰자의 양 손바닥의 자측(ulnar) 표면이나 손의 봉긋한 살을 대칭적으로 흉부 후면에 대고, 환자에게 낮게 울리는 단어를 반복하여 말하도록 하여 진탕음을 확인한다.
> - 환자의 목소리가 작거나 음이 높은 경우 진동이 잘 느껴지지 않을 수 있음 => 크고 낮게 말하도록 함

## 2021년

2021년 시험 21번

### 5. 폐진찰을 시행할 때의 올바른 항목을 고르시오.

① 환자에게 호흡수 측정을 한다고 이야기 한 후 호흡수를 측정한다.

② 촉각진탕음을 확인할 때 환자에게 높은음으로 말하도록 한다.

③ 타진시 환자 흉벽표면의 피부를 직접 오른손 중지로 두드린다.


④ 타진시 "ㄹ"자 또는 "Z" 순서로 시행한다.

⑤ 시진-청진-타진-촉진 순서로 진찰한다.

> **정답 ④**
>
> ④ 타진은 좌우 대칭 부위를 비교하면서 ㄹ자 또는 Z자 순서로 시행한다. ① 호흡수는 환자가 의식하면 달라지므로 측정한다고 알리지 않고 측정한다. ② 촉각진탕음은 낮은 음으로 크게 말하게 해야 진동이 잘 느껴진다. ③ 간접 타진은 왼손 중지를 흉벽에 밀착해 타진판으로 삼고 그 위를 오른손 중지로 두드린다. ⑤ 순서는 시진-촉진-타진-청진이다.

2020년 시험 83번

6. 78세의 여자가 1주일 전부터 숨소리에 쇳소리가 나고, 숨이 차서 내원하였다. 환자는 당뇨, 혈압 및 경한 치매로 투약 중이었다. CXR와 chest CT 사진이다. 호흡곤란의 원인으로 생각되는 것은?




① 환기장애
② 가스교환장애
③ 호흡조절장애
④ 심박출 증가
⑤ 호흡조절이상

**정답 ①**

가슴 X선과 CT에서 왼쪽 위쪽 폐문(대동맥궁 옆)에 종괴가 있어 기관지를 누르거나 막고 있다. 숨 쉴 때 쇳소리(쌕쌕거림)와 호흡곤란은 기도가 좁아져 공기가 드나들기 어려운 상태, 즉 환기장애(기도 · 흉벽 · 호흡근 같은 호흡 펌프의 문제)에 의한 것이다. 가스교환장애는 폐렴 · 간질성 폐질환 · 폐부종처럼 폐포-모세혈관 수준의 문제, 호흡조절장애는 호흡중추의 문제이며, 심박출 증가는 호흡곤란의 기전으로 맞지 않는다.

2020년 시험 84번


**7.** 69세 남자가 2일전부터 옷갈아 입을때도 숨차는 증상으로 내원하였다. 환자의 호흡곤란 modified MRC dyspnea scale grade는?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

> **정답 ④**
> modified MRC(mMRC) 호흡곤란 척도에서 옷을 입거나 벗을 때 숨이 차서 집 밖에 나가기 어려운 정도는 grade 4다. grade 0은 힘든 운동 시에만, 1은 빨리 걷거나 약간 오르막을 오를 때, 2는 평지에서 같은 나이보다 느리게 걷거나 쉬어야 할 때, 3은 평지 100 m 또는 몇 분 걸은 뒤 숨이 차서 멈춰야 할 때다.

2020년 시험 85번

**8.** 폐 진찰을 시행하는 순서에 맞게 나열한 문항은 무엇인가?






① A-B-C-D

② B-C-A-D

③ B-A-C-D

④ C-A-D-B

⑤ C-B-A-D

> **정답 ②**
>
> 폐 진찰은 시진-촉진-타진-청진 순서로 한다. 사진 B는 환자를 떨어져서 바라보는 시진, C는 양손으로 아래 갈비뼈를 감싸고 엄지를 정중선에 두어 흉곽 팽창을 보는 촉진, A는 흉벽에 손가락을 밀착하고 두드리는 타진, D는 청진기로 듣는 청진이므로 B-C-A-D가 맞다.

2020년 시험 90번

## 9. 호흡곤란을 일으키는 질환과 해당질환에서 호흡곤란의 주요 기전이 잘 짝지어진 조합은?

① 폐섬유화증 - 폐과팽창(hyperinflation) - 흡기용량(inspiratory capacity) 감소 및 호흡일 증가

② 만성폐쇄성폐질환 - 기도저항 (airway resistance) 증가 - 호흡일(work of breathing) 증가

③ 폐색전증- 기관지수축 - 가슴조임(chest tightness)

④ 호흡근을 침범하는 근육병증 - 저산소혈증 - air hunger

⑤ 척추측만증 (chest wall restriction)- 폐탄성(compliance) 증가 - 호흡일 증가

> **정답 ②**
>
> ② 만성폐쇄성폐질환은 기도저항이 증가해 숨을 쉬는 데 드는 일(호흡일)이 늘어난다. ① 폐섬유화증은 폐가 뻣뻣해져 탄성(유순도)이 감소하는 것이 기전이며, 폐과팽창은 COPD의 기전이다. ③ 폐색전증은 사강 증가 · 환기-관류 불균형과 저산소혈증이 주 기전이고, 기관지수축과 가슴조임은 천식의 기전이다. ④ 호흡근 근육병증은 호흡근 약화로 노력에 비해 환기가 부족해지는 것이 주 기전이다. ⑤ 척추측만증은 흉벽 유순도가 감소해 호흡일이 증가한다.