47. 선천기형, 두개안면, 미용수술

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2021, 2020년 기출 · 총 27문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 최강영

2025년 시험 36번 · 출제자 최강영

1. 두개골과 더불어 안면골에도 이형성을 나타내는 Crouzon syndrome, Apert syndrome, Pfeiffer syndrome의 원인 되는 유전자는?

① BMP
② TGF
③ FGFR
④ SHH
⑤ NOGGIN

2025년 시험 64번 · 출제자 최강영

2. 다음에서 구순열 수술 전 교정에서 장치물을 이용하지 않는 방법은?

① Latham
② NAM(Nasoalveolar molding)
③ Lip taping
④ Lip adhesion
⑤ Nasal elevator(DynaCleft)

2025년 시험 92번 · 출제자 최강영

3. 환자가 우울증이 있지만 미용수술을 할 때 좋은 결과를 예상할 수 있는 경우는?

① 신체적불만족이 우울증 발병에 앞서 건강한 시기에도 지속적으로 있어 왔음.
② 수술에 대한 기대가 모호하거나 추상적임.
③ 기분을 개선시키기 위한 다른 행동문제가 있음.
④ 인격장애가 동반됨.
⑤ 강박관련장애가 동반됨.

2025년 시험 99번 · 출제자 최강영

4. 다음은 눈꺼풀의 구조에 대한 설명이다. 이중에서 다른 구조를 설명하는 것은?

① Striated muscle
② 올라간 위눈꺼풀을 그 상태로 유지
③ Sympathetic nerve 지배
④ Conjunctiva와 밀접하게 위치
⑤ Tarsal plate에 부착

2024년

2024년 시험 24번 · 출제자 최강영

5. Syndromic cleft lip and palate의 가장 흔한 증후군중 하나로 IRF6 전사인자의 변화와 연관이 있는 질환은?

① CATCH22
② Pierre Robin Sequence
③ Ectodermal Dysplasia
④ Van Der Woude syndrome
⑤ Amniotic Band Sequence

2024년 시험 49번 · 출제자 최강영

6. 구순열과 구개열의 가장 적절한 수술시기는? (생후, 구순열 구개열 순으로)

① 2개월, 9개월
② 3개월, 12개월
③ 4개월, 14개월
④ 6개월, 14개월
⑤ 6개월, 18개월

2024년 시험 80번 · 출제자 최강영

7. 미용성형수술을 요구하는 가장 불량한 예후와 연관된 정신과적 질환은?

① 우울증
② 조현증
③ 망상장애
④ 신체이형장애
⑤ 자기애성성격장애

2024년 시험 83번 · 출제자 최강영

8. Frueh에 의한 눈꺼풀처짐의 분류에서 거짓눈꺼풀처짐 (pseudoptosis)은?

① Dermatochalasis
② Myopathic ptosis
③ Microphthalmia
④ Horner syndrome
⑤ Senile ptosis

2023년 9월 18일 시험 25번 · 출제자 최강영

9. 미용성형수술을 결정하는 가장 중요한 동기는?

① 자존감증진
② 대인관계개선
③ 타인에게 인정받기위함
④ 내적인 문제 해결을 위해
⑤ 새로운 사람이 되기 위해

2023년 9월 18일 시험 32번 · 출제자 최강영

10. 지방이식술에서 molding을 하는 시기는?

① 이식 직후
② 이식 지방이 생착된 후에
③ 2~3일 후에 붓기가 빠진상태에서
④ 일주일 후에
⑤ 불가능함

2023년 9월 18일 시험 37번 · 출제자 최강영

11. 정면얼굴을 수직으로 3부분으로 나누어질 수 있는데 그 기준이 아닌 것은?

① Trichion
② Glabella
③ Subnasale
④ pogonion
⑤ Menton

2023년 9월 18일 시험 45번 · 출제자 최강영

12. 외이(ear)에 대한 옳은 설명은?

① 발생 7주가 되면 이미 성인의 외이 형태가 완성된다
② 외이는 거의 90도 각도로 두개골과 떨어져 있다.
③ 이개의 상단은 관자측 피부와 대략 2cm 정도 떨어져 있다.
④ 외이의 장축은 거의 지면에 수직이다.
⑤ 외이의 전체 크기는 6~7세 경에 성인에 도달한다.

2023년 9월 18일 시험 52번 · 출제자 최강영

13. 우리나라 건강보험 빅데이터에 의한 한국인에서 신생아 1000명당 구순구개열은 약 몇 명 발생하는가?

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

2023년 9월 18일 시험 53번 · 출제자 최강영

14. 구개열 아이가 흔히 삼출장액성 중이염이 생기는 이유가 되는 해부학적 구조물을 지배하는 Cranial Nerve는?

① Trigeminal
② Abducens
③ Facial
④ Vestibulocochlear
⑤ Hypoglossal

2021년

2021년 시험 24번

15. Non-syndromic cleft lip을 초래하는 maternal risk factors가 아닌 것은?

① smoking
② alcoholism
③ progestational diabetics
④ folate deficiency
⑤ age > 30 years

2021년 시험 45번

16. 하연골원개(Lower Cartilaginous Vault)가 상외연골 (upper Cartilaginous Vault)과 중첩되는 곳의 해부학적 명칭은?

① lateral crural
② middle crural
③ medial crura
④ scroll area
⑤ keystone area

2021년 시험 62번

17. cleft lip의 가장 적절한 수술 시기는 ?

① 생후 1개월
② 생후 3-4개월
③ 생후 5-6 개월
④ 생후 7-9 개월
⑤ 생후 12개월

2021년 시험 68번

18. 눈꺼풀의 구조 중에 검판(tarsal plate)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 섬유성 결합조직
② 연골구조
③ 내안각건에 의해 안와내측에 고정
④ 눈의 돌출 및 지지대 역할
⑤ meibomian gland포함

2021년 시험 86번

19. 소이증 재건시 가장 많이 이용되는 것은?

① costal rib bone
② costal rib cartilage
③ iliac bone
④ dermofat graft
⑤ artificial implant

2021년 시험 90번

20. 다음 중 지방이식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 생존 불가능한 요소들을 원심분리로 정제하여 제거함으로써 지방반을 농축시켜 시행한다.
② 복부, 허벅지 내측은 주름이 생길 수 있지만 love handle, 엉덩이 뒤쪽, 외측 허벅지는 위험성이 비교적 적어 일반적으로 많이 공여부로 사용된다.
③ 공여 부위마다 이식 생착률이 거의 차이가 없어 충분한 지방을 제공해 줄 수 있는 부위인지, 접근의 용이성, 환자의 기호 등을 고려하여 공여부를 선택한다.
④ 지방이 우연히 작은 동맥으로 주입되면 지방색전증이 발생 할 수 있다.
⑤ 최대한 큰 지방 단위로 이식하는 것이 혈류 공급을 늘려 생착에 유리하다.

2021년 시험 99번

21.

cleft palate 환아에서 올수 있는 이상 소견은?

가. sucking power 떨어짐
나. serous otitis media
다. 언어장애(비음)
라. 학습수행능력 감소

① 가, 나
② 가, 나, 다
③ 나, 다
④ 나, 다, 라
⑤ 가, 나, 다, 라

2020년

2020년 시험 61번

22. 다음의 설명 중 틀린 것은?

① 정상적인 입술발생은 임신 4주에서 7주 사이에 일어난다.
② 내측비돌기와 외측비돌기는 상악돌기와 융합되고 여기에 중간엽대치 (mesenchymal replacement)와 상피화가 일어나 상구순이 형성된다.
③ 산모 흡연이나 알코올, 산모의 감염, 산모의 나이가 40세 이상인 경우 구순구개열의 위험을 증가시킨다.
④ 구순열은 아시아계통과 미국원주민에서 높은 비율을 보이고 아프리카인 비율이 가장 낮다.
⑤ 부모중에 구순구개열을 가지고 있을 때 구순열이나 구순구개열을 가진 자녀를 출생할 확률은 17%로 높다.

2020년 시험 62번

23. 완전구순구개열 환아에서 구순열(cleft lip)과 치조열의 수술 최적기는?

① 생후 11-12주, 생후 6-7세
② 생후 11-12주, 생후 7-8세
③ 생후 11-12주, 생후 9-11세
④ 생후 12개월, 생후 7-8세
⑤ 생후 12개월, 생후 9-11세

2020년 시험 63번

24. 구개열에 대한 설명중 틀린 것은?

① 구개열수술의 가장 중요한 목적은 정상언어 회복이다.
② 점막하구개열은 목젖이 갈라져 있으나 구개근육의 주행은 정상이다.
③ 구개범장근의 기능장애로 중이의 만성적 배수 장애와 유출로 청력손실을 유발한다.
④ 구개범거근(levator veli palatini muscle)이 언어 능력에 가장 중요한 역할을 한다.
⑤ 구개성형술시 경구개 점막골막 피판의 거상에 대구개동맥은 반드시 보존되어야 한다.

2020년 시험 64번

25. 소이증의 가장 적절한 수술시기는?

① 생후 3-4세
② 생후 5-6세
③ 생후 7-10세
④ 생후 11-13세
⑤ 생후 13-16세

2020년 시험 87번

26. 상안검을 위로 올리는 것에 관여하지 않는 것은?

① levator palpebrae superioris
② muller muscle
③ oculomotor
④ facial nerve
⑤ sympathetic nerve

2020년 시험 88번

27. 코에 없는 구조물은?

① upper lateral cartilage
② medial nasal artery
③ deep fatty layer
④ nasalis muscle
⑤ suspensory ligament