08. 배벽과 서혜부 덩이, 탈장

치료의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 20문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 박진영

2025년 시험 33번 · 출제자 박진영

1. 3개월 남아가 1개월 전부터 오른쪽 음낭이 부어서 병원에 왔다. 낮에는 오른쪽 음낭이 커졌다가, 자고 나면 줄어든다고 한다. 오른쪽 음낭에 빛을 비춘 사진(사진 1)이다. 치료는?



① 가는바늘흡인
② 절개배농
③ **고위결찰**
④ 냉찜질
⑤ 항생제 투여

> **정답 ③**
> 낮에 커졌다가 자고 나면 줄어드는 음낭 부종이 불빛에 환하게 비치므로(투광 양성) 복막초상돌기가 열려 있는 교통성 음낭수종이다. 영아에서는 서혜부 절개로 열린 복막초상돌기를 묶는 고위결찰술을 한다.

2. 70세 남자가 6개월 전부터 오른쪽 등 하부로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 무거운 물건을 들거나 기침을 하면 덩이가 튀어나왔다가 저절로 사라진다고 한다. 환자 사진(사진 2)이다. 진단은?



① epigastric hernia
② spigelian hernia
③ incisional hernia
④ lumbar hernia
⑤ obturator hernia


> **정답 ④**
> 힘을 주거나 기침하면 옆구리 뒤쪽 아래(허리 부위)로 튀어나왔다가 사라지는 덩이는 허리 탈장(lumbar hernia)이다. 위 허리 삼각(Grynfeltt)이나 아래 허리 삼각(Petit)의 약한 부위로 생긴다.

2024년

2024년 시험 43번 · 출제자 박진영

3. 80세 여자가 3일 전부터 왼쪽 서혜부로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 4개월 전부터 왼쪽 서혜부로 덩이가 나오기 시작했으며, 자고 나면 덩이가 저절로 사라졌다고 한다. 혈압 100/63 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.3℃ 이다. 배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 환자 배 사진, 복부 X선 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 치료는?

혈색소 10.7 g/dL, 백혈구 17,000/mm³, 혈소판 256,000/mm³



① 절개배농
② 가는바늘흡인
③ 도수정복
④ 광범위절제
⑤ 응급개복

> **정답 ⑤**
> 수개월 동안 들락날락하던 서혜부 탈장이 3일 전부터 들어가지 않고, 발열, 빈맥, 백혈구 증가, 복부 압통 · 반동압통이 있으므로 장이 괴사하거나 천공된 교액 탈장이다. 도수정복은 금기이고, 응급 개복술로 장 상태를 확인해 괴사 장을 절제하고 탈장을 교정한다.

4. 생후 3개월 남아가 2개월 전부터 배꼽에 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 울고 보채면 배꼽으로 덩이가 튀어나오고 진정되면 덩이는 저절로 사라진다. 배는 부드럽고, 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도이다. 환자 배꼽 사진이다. 치료는?



① 가는바늘흡인
② 광범위절제
③ 탈장꿰맴술
④ 응급수술
⑤ 5세까지 경과관찰

> **정답 ⑤**
> 생후 3개월 영아의 배꼽 탈장으로 근막 결손이 1cm이고 감돈 소견이 없으므로 대부분 저절로 닫힌다. 4-5세까지 경과를 관찰하고, 그때까지 남거나 결손이 크거나 감돈이 생기면 수술한다.

5. 83세 여자가 3일 전부터 배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 키 150 cm, 체중 39 kg이다. 혈압 90/50 mmHg, 맥박 113회/분, 호흡 21회/분, 체온 38.3℃이다. 양측 서혜부에 만져지는 덩이는 없다. 배는 부르고 아랫배에 압통과 반동압통이 있다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?

혈색소 9.7 g/dL, 백혈구 15,300/mm³, 혈소판 370,000/mm³



① inguinal hernia
② femoral hernia
③ spigelian hernia
④ obturator hernia
⑤ incisional hernia

정답 ④

마른 고령 여성의 장폐쇄 증상(복통, 구토, 복부 팽만)에 서혜부 덩이는 만져지지 않고, CT에서 치골근과 바깥폐쇄근 사이(화살표)로 장이 빠져나왔으므로 폐쇄공 탈장이다. 발열 · 복막 자극 징후는 교액을 시사하므로 응급수술한다.

6. 65세 남자가 1개월 전부터 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 혈압 140/80 mmHg, 맥박 85회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 10년 전에 트럭을 몰다가 승용차와 충돌한 후 발생한 소장 천공으로 수술받은 적이 있다. 아랫배에 힘을 주면 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나오고 누르면 사라진다. 환자 등 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① epigastric hernia
② spigelian hernia
③ lumbar hernia
④ obturator hernia
⑤ incisional hernia

> **정답 ③**
> 힘을 주면 옆구리 뒤쪽(등)으로 튀어나오고 누르면 들어가는 덩이와, CT에서 뒤가쪽 복벽 결손으로 지방 · 장이 빠져나온 소견은 허리 탈장(lumbar hernia)이다. 위 · 아래 허리 삼각(Grynfeltt, Petit)으로 생기며, 외상이나 옆구리 수술 뒤에도 생긴다.

2023년 9월 11일 시험 30번 · 출제자 박진영

7. 3개월 된 남아가 1주일 전부터 오른쪽 음낭에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 울거나 보채면 오른쪽 음낭 내에 2 cm 크기의 덩이가 생기고, 자고 나면 저절로 사라진다고 한다. 오른쪽 음낭 부위에 불빛을 비춘 사진이다. 치료는?



① 1세까지 경과관찰
② 가는바늘흡인
③ 도수정복
④ 덩이절제술
⑤ **고위결찰술**

> **정답 ⑤**
> 울거나 보채면 커지고 자고 나면 줄어드는 음낭 덩이가 불빛에 환하게 비치므로(투광 양성) 복막초상돌기가 열려 있는 교통성 음낭수종(또는 영아 간접 서혜부 탈장)이다. 영아에서는 저절로 닫히기를 기다리지 않고 열린 복막초상돌기를 묶는 고위결찰술을 한다. 비교통성 음낭수종은 1-2세까지 관찰할 수 있다.

8. 68세 남자가 2개월 전부터 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 혈압 130/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.5℃이다. 10년 전에 오토바이를 운전하다가 자동차와 충돌하여 발생한 소장 천공으로 수술을 받은 적이 있다. 아랫배에 힘을 주면 오른쪽 등으로 덩이가 튀어나오고 누르면 사라진다. 환자 등 사진과 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① epigastric hernia
② spigelian hernia
③ lumbar hernia
④ obturator hernia
⑤ incisional hernia

> **정답 ③**
> 힘을 주면 옆구리 뒤쪽(등)으로 튀어나오고 누르면 들어가는 덩이와, CT에서 뒤가쪽 복벽 결손으로 지방 · 장이 빠져나온 소견(화살표)은 허리 탈장(lumbar hernia)이다. 위 · 아래 허리 삼각(Grynfeltt, Petit)으로 생기며, 외상이나 옆구리 수술 뒤에도 생긴다.

9. 72세 남자가 3일 전부터 오른쪽 배에서 덩이가 만져져 병원에 왔다. 4일 전에 자전거를 타고 가다가 넘어지면서 자전거 핸들에 오른쪽 배를 부딪혔다고 한다. 혈압 135/86 mmHg, 맥박 83회/분, 호흡 19회/분, 체온 37.3℃이다. 배는 전반적으로 부드럽고, 배꼽 오른쪽에 5 cm 크기의 압통을 동반한 덩이가 만져진다. 혈액검사 결과는 다음과 같다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 치료는?

혈색소 11.5 g/dL, 백혈구 10,700/mm³, 혈소판 183,000/mm³



① 경과관찰
② 절개배액
③ 가는바늘흡인
④ 광범위 절제
⑤ 응급개복

정답 ①

자전거 핸들에 배를 부딪힌 뒤 생긴 압통 있는 덩이로, CT에서 복벽 안에 국한된 혈종 소견을 보인다. 생체징후가 안정적이고 복막자극 징후가 없으므로 대부분 저절로 흡수되며 경과관찰한다. 감염되면 배액, 계속 커지면 색전술이나 수술을 고려한다.

2022년 시험 9번

10. 70세 남자가 3일 전부터 갑자기 오른쪽 아랫배가 아프고 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 평소에 항응고제를 복용하고 있다. 3일 전에 기침을 심하게 하고 난 후부터 오른쪽 아랫배에 덩이가 만져졌다고 한다. 복부 진찰에서 오른쪽 아랫배에 압통을 동반한 4 cm 크기의 덩이가 만져진다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?




① fibroma
② lipoma
③ hemangioma
④ desmoid tumor
⑤ rectus sheath hematoma

정답 ⑤

항응고제를 복용하던 고령 환자가 심한 기침 뒤 아랫배에 압통 있는 덩이가 생기고, CT에서 복직근 안쪽에 고음영 덩이가 보이므로 복직근초 혈종이다. 복벽동맥이 터져 생기며 대부분 보존적 치료(항응고제 조절, 수혈)로 낫는다. 섬유종 · 지방종 · 혈관종 · 데스모이드는 갑자기 생기지 않는다.

11. 83세 여자가 1주일 전부터 왼쪽 아랫배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 배가 전반적으로 부르고 압통이 있다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① incisional hernia
② spigelian hernia
③ obturator hernia
④ epigastric hernia
⑤ lumbar hernia

> **정답 ③**
> 마른 고령 여성의 장폐쇄 증상과, CT에서 치골근과 바깥폐쇄근 사이(폐쇄공)로 장이 빠져나온 소견(화살표)은 폐쇄공 탈장이다. 감돈이 흔해 진단되면 수술한다.


12. 생후 4개월 된 여아가 배꼽으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 덩이를 누르면 사라졌고, 울면 다시 덩이가 튀어나왔다. 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도였으며, 감돈의 소견은 없었다. 치료는?



① 세침흡인
② 탈장대 착용
③ 응급수술
④ 1세 이전에 수술
⑤ 5세까지 경과 관찰

> **정답 ⑤**
> 생후 4개월 영아의 배꼽 탈장으로 근막 결손이 1cm이고 감돈 소견이 없으므로 대부분 저절로 닫힌다. 4-5세까지 경과를 관찰하고, 그때까지 남거나 결손이 크거나 감돈이 생기면 수술한다. 탈장대는 효과가 없다.

13. 아래 그림에서 A가 표시하는 부위에서 발생하는 탈장은?



① indirect inguinal hernia

② direct inguinal hernia

③ femoral hernia

④ obturator hernia

⑤ spigelian hernia

> **정답 ②**
>
> 그림의 A는 하복벽혈관 안쪽, 서혜인대 위쪽의 Hesselbach 삼각으로, 이 부위의 약해진 복벽을 직접 뚫고 나오는 탈장이 직접 서혜부 탈장이다. B(속서혜륜, 하복벽혈관 바깥쪽)로 나오면 간접 서혜부 탈장이고, 대퇴 탈장은 서혜인대 아래 대퇴관으로 나온다.

2021년 시험 5번

14. 65세 여자가 배 가운데 부분으로 덩이가 나와서 병원에 왔다. 20년 전에 교통사고로 개복 후 소장절제술을 받은 적이 있다고 한다. 배에 힘을 주면 배 정중앙으로 8 cm 크기의 덩이가 튀어나왔으며 누으면 덩이가 저절로 사라졌다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① Inguinal hernia
② Obturator hernia
③ Lumbar hernia
④ Spigelian hernia
⑤ Incisional hernia

정답 ⑤

개복술을 받은 사람에게 수술 흉터 부위로 배에 힘을 줄 때 튀어나오고 누우면 들어가는 덩이는 절개 탈장(복벽반흔 탈장)이다. CT에서 정중선 흉터 아래 근막 결손과 탈출된 장이 보인다. 서혜부 · 폐쇄공 · 요추 · Spigelian 탈장은 각각 다른 위치의 선천적 · 해부학적 약한 부위로 생긴다.

15. 생후 6개월 여아가 배꼽으로 덩이가 튀어나와서 병원에 왔다. 덩이를 누르면 사라졌고, 울면 다시 덩이가 튀어나왔다. 배꼽하방의 근막결손의 크기는 1 cm 정도였으며, 감돈의 소견은 없었다. 치료는?




① 항생제 및 수액투여
② 탈장대 착용
③ 응급수술
④ 1세이전에 수술
⑤ 5세까지 경과 관찰

정답 ⑤

영아의 배꼽 탈장은 근막 결손이 1.5cm 이하이면 대부분 4-5세 전에 저절로 닫히므로 감돈이 없으면 경과관찰한다. 5세 이후에도 남거나, 결손이 크거나(>1.5-2cm), 감돈이 생기면 수술한다. 탈장대는 효과가 없다.

16. 85세 여자가 3일전부터 아랫배가 아프고 토해서 병원에 왔다. 배가 전반적으로 부르고 압통이 있다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① Incisional hernia
② Spigelian hernia
③ Obturator hernia
④ Rectus sheath hematoma
⑤ Lumbar hernia

> **정답 ③**
> 마른 고령 여성의 장폐쇄 증상과 CT에서 치골근과 바깥폐쇄근 사이(폐쇄공)로 장이 빠져나온 소견은 폐쇄공 탈장이다. 넓적다리 안쪽으로 퍼지는 통증(Howship-Romberg 징후)이 단서이며, 감돈이 흔해 진단되면 수술한다.

17. 60세 남자가 오른쪽 서혜부에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 6개월 전부터 기침을 하거나 장시간 서있으면 우측 서혜부로 덩이가 나오고, 누으면 저절로 사라졌다고 한다. 5시간 전부터는 덩이가 나온 후 들어가지 않았으며, 덩이를 만지면 경미한 통증이 있었다. 복부는 부드러웠으며, 압통과 반동압통은 없다. 환자의 서혜부 사진이다. 치료는?



① 냉찜질
② 흡인천자
③ 절개배농
④ 도수정복
⑤ 응급수술

> **정답 ④**
> 5시간 전부터 들어가지 않는 서혜부 탈장이지만 통증이 경미하고 복막자극 징후나 장폐쇄 소견이 없으므로 교액(혈류 장애) 없는 감돈 탈장이다. 이때는 진정 · 진통 후 도수정복을 시도하고 이후 정규 수술을 한다. 심한 통증, 발적, 발열, 장폐쇄가 있으면 교액을 의심해 응급수술한다.

2020년 시험 39번

18. 75세 남자가 2일전부터 오른쪽 아랫배에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 최근에 자전거를 타고 가다가 넘어지면서 자전거 핸들에 오른쪽 아랫배를 부딪쳤다고 한다. 신체검사에서 오른쪽 아랫배에 4 cm 크기의 압통을 동반한 덩이가 만져졌다. 복부 컴퓨터단층촬영 사진이다. 진단은?



① incisional hernia
② spigelian hernia
③ lipoma
④ rectus sheath hematoma
⑤ desmoid tumor

> **정답 ④**
> 자전거 핸들에 부딪힌 뒤 생긴 아랫배의 압통성 덩이이고, CT에서 복직근초 안에 혈종이 보이면 복직근초 혈종이다. 외상이나 항응고제, 심한 기침이 원인이며, 대부분 안정 · 통증 조절 등 보존적 치료로 좋아진다.

19. xiphoid process와 symphysis pubis 사이의 linea alba에 만들어진 틈으로 복강 내 구조물이 튀어나오는 탈장은?

① sliding hernia
② incisional hernia
③ obturator hernia
④ lumbar hernia
⑤ epigastric hernia

정답 ⑤

복부 정중선(백선, linea alba)에서 칼돌기와 배꼽 사이의 결손으로 생기는 탈장이 상복부(epigastric) 탈장이다. 배꼽 부위면 배꼽 탈장, 반달선(Spigelian line)이면 Spigelian 탈장, 수술 흉터면 절개 탈장, 폐쇄공을 통하면 폐쇄공 탈장이다.

20. 2개월 남아가 오른쪽 음낭에 덩이가 만져져서 병원에 왔다. 음낭을 만져도 통증은 없었으며, 음낭에 불빛을 비추어보니 투명하게 빛이 잘 통과되었다 (사진). 진단은?



① 서혜부탈장
② 음낭수종
③ 부고환염
④ 고환꼬임
⑤ 정계정맥류

> **정답 ②**
> 통증 없는 음낭 덩이에 빛을 비추면 투명하게 통과하는 것(투광검사 양성)은 액체가 찬 음낭수종의 특징이다. 서혜부탈장은 장이 내려와 빛이 통과하지 않고 대개 누르면 들어가며, 부고환염 · 고환꼬임은 통증이 심하고, 정계정맥류는 사춘기 이후 '벌레 주머니' 같은 덩이로 만져진다.