20. CP 수술 전 · 중 · 후 환자관리

치료의 기본 · 2025년 기출 · 총 3문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 이정은, 이수현, 임정아

2025년 시험 1번 · 출제자 이수현

1. 특별한 기저질환이 없는 45세 남자 BMI 30. 외래 마취로 관절경 수술 예정이다. 수술실 입실 2시간 반 전에 물 120ml를 먹었다. 담당 마취통증의학과 의사로서 대응은?

① 예정대로 진행
② 2시간 연기
③ 6시간 연기
④ 수술 취소

> **정답 ①**
> ASA 금식 지침에서 맑은 물은 마취 2시간 전까지 마실 수 있다. 입실 2시간 반 전에 물 120mL를 마셨으므로 금식 기준을 지켰고, 기저질환 없는 비만(BMI 30)만으로 기준이 바뀌지 않으므로 예정대로 진행한다.

2025년 시험 6번 · 출제자 이수현

2. 특별한 기저질환이 없는 45세 남자 BMI 30. 외래 마취로 관절경 수술 예정이다. 수술실 입실 2시간 반 전에 물 120ml를 먹었다. 담당 마취통증의학과 의사로서 대응은?

① 예정대로 진행
② 2시간 연기
③ 6시간 연기
④ 수술 취소

> **정답 ①**
> ASA 금식 지침에서 맑은 물은 마취 2시간 전까지 마실 수 있다. 입실 2시간 반 전에 물 120mL를 마셨으므로 금식 기준을 지켰고, 기저질환 없는 비만(BMI 30)만으로 기준이 바뀌지 않으므로 예정대로 진행한다.

2025년 시험 28번 · 출제자 임정아

3. 마취 중 환자 감시 장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 맥박산소포화도 측정에서 산소화혈색소(oxygenated hemoglobin)는 적외선 (940nm)을 더 흡수한다.
② 심전도 채널 중 lead II 는 부정맥 진단과 심장 후벽 허혈 발견에 유용하다.
③ 요골 동맥 천자 시 modified Allen's test가 음성인 경우 천자한다.
④ 혈압계 cuff size는 측정 부위의 폭의 120% 혹은 둘레의 40%가 되게 한다.
⑤ capnography는 환자의 환기(ventilation)의 적절성을 감시하는 지표 중 하나이다.

> **정답 ③**
> 이 시험의 출제 기준에서 modified Allen 검사 '양성'은 척골동맥 측부순환이 충분하다는 뜻이고, '음성'이면 측부순환이 불충분해 요골동맥 천자를 피한다. 그래서 음성일 때 천자한다는 ③이 틀렸다. 산화혈색소의 940nm 적외선 흡수, 커프 폭(팔 둘레의 40%, 직경의 120%), capnography의 환기 감시는 맞는 설명이다.
> ※ 확인 필요: Allen 검사의 양성 · 음성은 교과서마다 반대로 쓰이기도 한다. 또 ②의 lead II가 보는 곳은 보통 '하벽'이라 '후벽' 표현도 정확하지 않다.