46. 성형외과학 소개

치료의 기본 · 2021, 2020년 기출 · 총 3문항 · 정답 · 해설판

2021년

2021년 시험 41번

1. Breast implant-associated anaplastic large cell lymphoma 환자에서 가장 흔한 임상적 징후는?

① Distinct mass
② Tenderness
③ Seroma
④ Ulcer
⑤ Skin rash

> **정답 ③**
> BIA-ALCL은 거친 표면 보형물 삽입 수년 후 보형물 주위에 지연성 장액종(seroma)이 차서 유방이 붓는 것이 가장 흔한 첫 증상이다. 장액을 흡인해 CD30 염색으로 진단하며, 덩이나 림프절 비대는 덜 흔하다.

2020년

2020년 시험 97번

2. 유방보형물 연관 역형성 대세포 림프종(BIA-ALCL)의 가장 흔한 증상은?

① seroma
② capsular mass
③ skin rash
④ capsular contracture
⑤ lymphadenopathy

> **정답 ①**
> 유방보형물 연관 역형성 대세포 림프종(BIA-ALCL)은 주로 거친 표면(textured) 보형물 삽입 수년 후 보형물 주위에 지연성 장액종(seroma)이 차서 유방이 갑자기 붓는 것으로 가장 흔히 나타난다. 장액을 흡인해 CD30 염색과 세포검사로 진단한다. 피막 덩이나 림프절 비대는 덜 흔하다.

3. 다음 중 Expander-implant를 이용한 Breast reconstruction을 시행하기 적절한 환자는?

① Smoker

② Scleroderma로 치료받은 병력이 있는 환자

③ Radiation therapy를 받은 환자

④ 피판 거상으로 인한 추가적인 scar를 원하지 않는 환자

⑤ Breast skin에 contour irregularity가 심한 환자

> **정답 ④**
>
> 조직확장기-보형물 재건은 피판 거상으로 인한 추가 흉터와 공여부 손상이 없다는 것이 장점이라, 추가 흉터를 원하지 않는 환자에게 적합하다. 흡연, 방사선 치료, 경피증처럼 피부 혈류와 탄력이 나쁜 경우나 피부가 심하게 울퉁불퉁한 경우는 확장이 어렵고 합병증(괴사, 피막구축)이 많아 자가조직 재건이 낫다.