

Lý thuyết Galois dành cho bé

Chúa tế bóng tối, 24ST2, Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Ngày 11 tháng 8 năm 2026

1	Vài trọng điểm về nhóm	1
1.1	Nhóm con chuẩn tắc	1
1.2	Tác động nhóm (Group action)	1
1.3	Nhóm Frobenius	4
1.4	Nhóm các phép thế S_n (Symmetric group)	4
1.5	p -nhóm	6
1.6	Các Định lý Sylow và Định lý Cauchy	8
1.7	Nhóm giải được	9
2	Đa thức	12
2.1	Đặc số của vành và trường hữu hạn	12
2.2	Vành đa thức	14
2.3	Thuật toán Euclide	15
2.4	Phân tích đa thức	16
3	Lý thuyết mở rộng trường	19
3.1	Mở rộng bậc hữu hạn	19
3.2	Mở rộng đơn	20
3.3	Mở rộng đại số	22
3.4	Trường phân rã của một đa thức	24
3.5	Trường đóng đại số	26
3.6	Mở rộng tách được	28
3.7	Mở rộng chuẩn tắc	31
4	Galois	33
4.1	Nhóm các tự đẳng cấu của trường	33
4.2	Định lý cơ bản của lý thuyết Galois	35
	Tài liệu tham khảo	36

CHƯƠNG 1

VÀI TRỌNG ĐIỂM VỀ NHÓM

1.1 Nhóm con chuẩn tắc

Định lí 1.1.1 (Định lí Lagrange). Cho H là nhóm con của nhóm hữu hạn G . Khi đó, cấp của H là ước của cấp của G . Hơn nữa, $|G| = |H|[G : H]$.

Hệ quả 1.1.2. Cho G là một nhóm hữu hạn và $a \in G$. Khi đó, cấp của a là ước của cấp của G . Đặc biệt, G là nhóm cyclic nếu G có cấp nguyên tố.

Định lí 1.1.3 (Định lí đẳng cấu thứ nhất). Cho hai nhóm G và G' và đồng cấu nhóm $f : G \rightarrow G'$. Khi đó

a) $\ker f := \{g \in G \mid f(g) = e_{G'}\} \triangleleft G$.

b) $\operatorname{im} f := \{f(g) \mid g \in G\} \leq G'$.

c) $G/\ker f \cong \operatorname{im} f$.

Định lí 1.1.4 (Định lí đẳng cấu thứ hai). Cho G là một nhóm, H là một nhóm con của G và N là một nhóm con chuẩn tắc của G . Khi đó

a) $HN := \{hn \mid h \in H, n \in N\}$ là một nhóm con của G .

b) $HN/N \cong H/(H \cap N)$.

Định lí 1.1.5 (Định lí đẳng cấu thứ ba). Cho G là một nhóm và H, N là các nhóm con chuẩn tắc của G sao cho $N \subset H \subset G$. Khi đó

a) $H/N \triangleleft G/N$.

b) $(G/N)/(H/N) \cong G/H$.

1.2 Tác động nhóm (Group action)

[dummit]

Định nghĩa 1.2.1. Cho G là một nhóm và X là một tập hợp. Ánh xạ

$$\begin{aligned} \bullet : G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto g \cdot x. \end{aligned}$$

được gọi là một tác động của nhóm G lên X , kí hiệu là $G \curvearrowright X$, nếu nó thỏa hai điều kiện sau:

(i) $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ với mọi $g, h \in G$ và với mọi $x \in X$,

(ii) $e \cdot x = x$ với mọi $x \in X$.

Cho X là tập hợp khác rỗng. Ta kí hiệu S_X (hoặc $Sym(X)$) là tập các song ánh từ $X \rightarrow X$, cùng với phép hợp thành ánh xạ, S_X trở thành một nhóm.

Mệnh đề 1.2.2. Cho G tác động lên tập X . Với mỗi $g \in G$, ta định nghĩa ánh xạ $\sigma_g: X \rightarrow X$ bởi $\sigma_g(x) = g \cdot x$. Khi đó

(i) Với mỗi $g \in G$, σ_g là một hoán vị của X , tức là σ_g là một song ánh.

(ii) Ánh xạ $\varphi: G \rightarrow S_X$ xác định bởi $\varphi(g) = \sigma_g$ là một đồng cấu.

Chứng minh.

(i) Ta định nghĩa $\sigma_{g^{-1}}: X \rightarrow X$ xác định bởi $\sigma_{g^{-1}}(x) = g^{-1} \cdot x$. Khi đó, $\sigma_{g^{-1}} = (\sigma_g)^{-1}$. Thật vậy, $\sigma_g \circ \sigma_{g^{-1}}(x) = \sigma_g(\sigma_{g^{-1}}(x)) = \sigma_g(g^{-1} \cdot x) = g \cdot (g^{-1} \cdot x) = (gg^{-1}) \cdot x = e \cdot x = x = \text{id}(x)$, tương tự ta cũng có $\sigma_{g^{-1}} \circ \sigma_g(x) = \text{id}(x)$. Như vậy, σ_g là một hoán vị của X .

(ii) Dễ dàng thấy rằng φ là ánh xạ. Với mọi $g, h \in G$, ta có $\varphi(gh)(x) = \sigma_{gh}(x) = (gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x) = \sigma_g \circ \sigma_h(x) = \varphi(g) \circ \varphi(h)(x)$ với mọi $x \in X$, do đó $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$. $\square$

Nhận xét 1.2.3. Cho X là một tập khác rỗng và G là một nhóm. Nếu $\varphi: G \rightarrow S_X$ là một đồng cấu nào đó thì ta định nghĩa ánh xạ

$$\begin{aligned} \bullet: G \times X &\rightarrow X \\ (g, x) &\mapsto g \cdot x = \varphi(g)(x). \end{aligned}$$

Khi đó, $\bullet$ cũng thỏa các điều kiện của một tác động nhóm.

Mệnh đề 1.2.4. Với mọi nhóm G và mọi tập X . Tồn tại song ánh từ tập các tác động của G lên X với tập các đồng cấu $\varphi: G \rightarrow S_X$.

Định nghĩa 1.2.5. Cho G là một nhóm, một biểu diễn hoán vị là một đồng cấu từ G vào S_X với X là tập khác rỗng. Lúc này, ta nói một tác động của G lên X cảm sinh biểu diễn hoán vị tương ứng của G .

Định nghĩa 1.2.6. Cho nhóm G tác động lên một tập hợp X . Ta có các định nghĩa sau:

- Tập $\text{orb}(X) = G \cdot x := \{g \cdot x \in X | g \in G\}$ được gọi là tập orbit của x .
- Tập $\text{stab}(X) = G_x := \{g \in G | g \cdot x = x\}$ được gọi là stabilizer của x .
- Tập $\text{ker}(G \curvearrowright X) := \{g \in G | g \cdot x = x, \forall x \in X\}$ được gọi là nhân (kernel) của tác động nhóm.
- Một tác động được gọi là faithful nếu $\text{ker}(G \curvearrowright X) = \{e\}$.

G_x là một nhóm con của G .

Nhận xét 1.2.7. Cho nhóm G tác động lên một tập hợp X khác rỗng và $\varphi: G \rightarrow S_X$ là biểu diễn hoán vị cảm sinh từ tác động này. Khi đó, ta có $\text{ker } \varphi = \text{ker}(G \curvearrowright X) = \bigcap_{x \in X} G_x \triangleleft G$.

Chứng minh. Thật vậy, $\text{ker } \varphi = \{g \in G | \varphi(g) = \sigma_g = \text{id}\} = \{g \in G | \sigma_g(x) = \text{id}(x) = x, \forall x \in X\} = \{g \in G | g \cdot x = x, \forall x \in X\} = \text{ker}(G \curvearrowright X)$. Tiếp theo, $\text{ker}(G \curvearrowright X) = \bigcap_{x \in X} G_x$ vì ta có

$$\begin{aligned} g \in \text{ker}(G \curvearrowright X) &\Leftrightarrow g \cdot x = x, \forall x \in X \\ &\Leftrightarrow g \in G_x, \forall x \in X \\ &\Leftrightarrow g \in \bigcap_{x \in X} G_x. \end{aligned}$$

Bây giờ ta chỉ ra $\text{ker}(G \curvearrowright X) \triangleleft G$. Với mọi $g, h \in \text{ker}(G \curvearrowright X)$, có $h \cdot x = x$ nên $x = e \cdot x = (h^{-1}h) \cdot x = h^{-1} \cdot (h \cdot x) = h^{-1} \cdot x$, từ đây suy ra $(gh^{-1}) \cdot x = x$ hay $gh^{-1} \in \text{ker}(G \curvearrowright X)$. Do đó, $\text{ker}(G \curvearrowright X) \leq G$. Với mọi $g \in G$ và $h \in \text{ker}(G \curvearrowright X)$, ta có $(ghg^{-1}) \cdot x = g \cdot (h \cdot (g^{-1} \cdot x)) = g \cdot (g^{-1} \cdot x) = (gg^{-1}) \cdot x = e \cdot x = x$ nên $ghg^{-1} \in \text{ker}(G \curvearrowright X)$ nên $\text{ker}(G \curvearrowright X) \triangleleft G$. $\square$

Mệnh đề 1.2.8. Xét quan hệ R được xác định bởi $xRy \Leftrightarrow \exists g \in G : g \cdot x = y$ với $x, y \in X$. Khi đó R là một quan hệ tương đương và $\bar{x} = G \cdot x$ với $x \in X$. Do đó, ta có thể phân hoạch X thành các lớp tương đương rời nhau và khi đó $|X| = \sum_i |G \cdot x_i|$.

Định nghĩa 1.2.9. Một tác động nhóm G lên tập X khác rỗng được gọi là transitive nếu chỉ tồn tại một orbit, hay nói cách khác là với mọi $x, y \in X$ thì tồn tại $g \in G$ sao cho $y = g \cdot x$.

Định lý 1.2.10. Cho nhóm G tác động lên tập X . Với mỗi $x \in X$, ta có ánh xạ f được xác định như sau là một song ánh:

$$\begin{aligned} f : G \cdot x &\rightarrow \{gG_x | g \in G\} \\ g \cdot x &\mapsto gG_x. \end{aligned}$$

Chứng minh. Rõ ràng f là toàn ánh. Ta chỉ ra f là đơn ánh, lấy $gG_x, hG_x \in \{gG_x | g \in G\}$ bất kì sao cho $gG_x = hG_x$, suy ra $g^{-1}h \in G_x$, điều này có nghĩa là

$$\begin{aligned} (g^{-1}h) \cdot x &= x \Leftrightarrow g^{-1} \cdot (h \cdot x) = x \\ &\Leftrightarrow g \cdot (g^{-1} \cdot (h \cdot x)) = g \cdot x \\ &\Leftrightarrow (gg^{-1}) \cdot (h \cdot x) = g \cdot x \\ &\Leftrightarrow e \cdot (h \cdot x) = g \cdot x \\ &\Leftrightarrow h \cdot x = g \cdot x. \end{aligned}$$

□

Hệ quả 1.2.11. Cho nhóm G tác động lên tập X . Nếu G là hữu hạn thì $|G \cdot x|$ là ước của $|G|$.

Chứng minh. Từ Định lý trên suy ra $|G \cdot x| = [G : G_x] = |G|/|G_x|$. □

Cho H là một nhóm con của G và X là tập tất cả các lớp trái của H trong G . Định nghĩa tác động của G lên X như sau

$$\begin{aligned} \bullet : G \times X &\rightarrow X \\ (g, aH) &\mapsto g \cdot aH = gaH. \end{aligned}$$

Dễ dàng kiểm tra được đây là một tác động nhóm.

Định lý 1.2.12. Cho G là một nhóm, H là nhóm con của G và cho G tác động lên tập X là tập tất cả các lớp trái của H trong G . Đặt π_H là biểu diễn hoán vị cảm sinh từ tác động này. Khi đó

a) Tác động G lên X là transitive.

b) $G_{eH} = H$.

c) $\ker \pi_H = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1}$ và $\ker \pi_H$ là nhóm con chuẩn tắc lớn nhất của G chứa trong H .

Chứng minh.

a) Với mọi $aH, bH \in X$, đặt $g = ba^{-1} \in G$, khi đó rõ ràng $bH = g \cdot aH$.

b) $G_{eH} = \{g \in G | g \cdot eH = H\} = \{g \in G | gH = H\} = H$.

c) Với mỗi $aH \in X$ ta có $G_{aH} = \{g \in G | g \cdot aH = aH\} = \{g \in G | a^{-1}ga \in H\} = aHa^{-1}$, theo

Nhận xét 1.2.7 suy ra $\ker \pi_H = \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} \triangleleft G$, dễ dàng thấy được $\ker \pi_H = \ker(G \curvearrowright X) \subset H$. Để chứng minh tính lớn nhất, giả sử $N \triangleleft G$ chứa trong H nên $N = gNg^{-1} \leq gHg^{-1}$ với mọi $g \in G$ nên $N \leq \bigcap_{g \in G} gHg^{-1} = \ker \pi_H$. □

Hệ quả 1.2.13 (Định lý Cayley). Mỗi nhóm G đều đẳng cấu với một nhóm con của một nhóm đối xứng nào đó.

Chứng minh. Cho $H = \{e\} \leq G$, cho G tác động lên tập $X = G$ là tập tất cả các lớp trái của H trong G (ở đây ta đồng nhất $gH = g\{e\}$ với g) và $\varphi: G \rightarrow S_G$ là biểu diễn hoán vị cảm sinh từ tác động này. Theo Định lý 1.2.12 suy ra $\ker \varphi = \{e\}$ nên φ là đơn cấu, suy ra G đẳng cấu với ảnh của nó trong S_G . $\square$

1.3 Nhóm Frobenius

Định nghĩa 1.3.1. Một nhóm hữu hạn G được gọi là nhóm Frobenius với nhân Frobenius $Q \neq \{e_G\}$ là nhóm con chuẩn tắc thật sự của G và $C_G(X) \leq Q$ với mọi $x \neq e_G$ của Q .

1.4 Nhóm các phép thế S_n (Symmetric group)

Định nghĩa 1.4.1. Cho n là một số nguyên dương và $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Gọi S_n là tập tất cả các song ánh trên X . Với mỗi $\sigma \in S_n$ được gọi là một phép thế bậc n và viết là

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

Tập S_n cùng với phép hợp thành ánh xạ tạo thành một nhóm được gọi là nhóm các phép thế bậc n . Cấp của nhóm S_n là $n!$.

Định nghĩa 1.4.2. Giả sử $i_1, i_2, \dots, i_k$ với $k > 1$ là những phần tử khác nhau của tập $X = \{1, 2, \dots, n\}$. Kí hiệu $(i_1 i_2 \dots i_k)$ là một phép thế bậc n sao cho $i_1 \mapsto i_2, i_2 \mapsto i_3, \dots, i_{k-1} \mapsto i_k, i_k \mapsto i_1$ và các phần tử còn lại của X biến thành chính nó. Khi đó, ta nói rằng $(i_1 i_2 \dots i_k)$ là một vòng xích cấp k hay k -vòng xích. Một vòng xích cấp 2 được gọi là một chuyển vị. Hai vòng xích

$$\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k) \text{ và } \tau = (j_1 j_2 \dots j_h)$$

được gọi là độc lập nếu $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_h\} = \emptyset$. Phép thế đồng nhất được xem là một vòng xích cấp 1 và kí hiệu là (1) .

Mệnh đề 1.4.3. Nếu $\sigma(i_1, i_2, \dots, i_k)$ và $\tau(j_1, j_2, \dots, j_h)$ độc lập nhau thì $\sigma\tau = \tau\sigma$.

Chứng minh. Vì σ, τ độc lập nên $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \cap \{j_1, j_2, \dots, j_h\} = \emptyset$. Nếu $x \notin \{i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_h\}$ thì $\sigma(x) = x = \tau(x)$, do đó $\sigma\tau(x) = \tau\sigma(x)$. Nếu $x \in \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ thì $\sigma(x) \in \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ nên $\tau\sigma(x) = \sigma(x) = \sigma\tau(x)$. Tương tự, nếu $x \in \{j_1, j_2, \dots, j_h\}$ thì $\tau(x) \in \{j_1, j_2, \dots, j_h\}$ nên $\sigma\tau(x) = \tau(x) = \tau\sigma(x)$. $\square$

Định lý 1.4.4. Mọi phép thế $\sigma \in S_n$ đều phân tích được thành tích các vòng xích độc lập.

Chứng minh. Giả sử $\sigma \neq id$ và $a_1 \in \{1, \dots, n\}$ sao cho $\sigma(a_1) \neq a_1$. Đặt $a_2 = \sigma(a_1), a_3 = \sigma(a_2), \dots$. Gọi k là chỉ số đầu tiên sao cho $\sigma(a_k) \in \{a_1, \dots, a_{k-1}\}$, ta chỉ ra $\sigma(a_k) = a_1$. Thật vậy, nếu $\sigma(a_k) = a_i \neq a_1$, khi đó theo định nghĩa ta có $\sigma(a_k) = a_i = \sigma(a_{i-1})$ và $i-1 < i \leq k$, điều này mâu thuẫn với cách chọn k . Khi đó, σ được viết thành $\sigma = (a_1 \dots a_k)\tau$ với $\tau(x) = x$ nếu $x \in \{a_1, \dots, a_k\}$ và $\tau(x) = \sigma(x)$ nếu $x \notin \{a_1, \dots, a_k\}$. Tiếp theo, gọi $b_1 \in \{1, \dots, n\} \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$ và đặt $b_2 = \sigma(b_1), b_3 = \sigma(b_2), \dots$. Gọi h là chỉ số đầu tiên sao cho $\sigma(b_h) \in \{b_1, \dots, b_{h-1}\}$, lập luận tương tự như trên ta được $\sigma(b_h) = b_1$, nếu tồn tại j_0 sao cho $b_{j_0} = a' \in \{a_1, \dots, a_k\}$ thì ta có $b_1 = \sigma^{n_0}(b_{j_0}) = \sigma^{n_0}(a') \in \{a_1, \dots, a_k\}$ (mâu thuẫn).

Do đó, ta có thể viết $\sigma = (a_1 \dots a_k)(b_1 \dots b_h)\alpha$ với $\alpha(x) = x$ nếu $x \in \{a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_h\}$ và $\alpha(x) = \sigma(x)$ nếu $x \notin \{a_1, \dots, a_k, b_1, \dots, b_h\}$, trong đó $\sigma_1 = (a_1 a_2 \dots a_k)$ và $\sigma_2 = (b_1 b_2 \dots b_h)$ là hai vòng xích độc lập. Tiếp tục quá trình này, ta tìm được $\sigma_3, \sigma_4, \dots, \sigma_m$ sao cho $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_m$, trong đó các $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ đôi một độc lập nhau. $\square$

Hệ quả 1.4.5. Mọi phép thế của $\sigma \in S_n$ đều phân tích được thành tích chuyển vị.

Chứng minh. Theo Định lý 1.4.4, ta chỉ cần chứng minh một vòng xích $(i_1 i_2 \dots i_k)$ bất kì có thể được phân tích thành các chuyển vị. Thật vậy, ta có hai sự phân tích vòng xích như sau:

$$(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_2)(i_2 i_3) \dots (i_{k-1} i_k)$$

hoặc

$$(i_1 i_2 \dots i_k) = (i_1 i_k)(i_1 i_{k-1}) \dots (i_1 i_2)$$

$\square$

Hệ quả 1.4.6. Mọi phép thế của $\sigma \in S_n$ đều phân tích được thành tích chuyển vị có dạng $(1a)$ với $a \in \{1, \dots, n\}$.

Chứng minh. Theo Hệ quả 1.4.5 ta chỉ cần chỉ ra (ij) được viết dưới dạng tích các $(1a)$. Thật vậy, dễ dàng kiểm tra được $(ij) = (1i)(1j)(1i)$. $\square$

Mọi phép thế của S_n đều có thể được viết dưới dạng tích các chuyển vị, lưu ý rằng các cách viết này là không duy nhất. Tuy nhiên, số lượng các chuyển vị xuất hiện trong tích thì luôn là chẵn hoặc lẻ. Để thấy được điều này ta giới thiệu đa thức sau

$$\Delta_n = \prod_{i < j} (x_i - x_j),$$

với $i, j \in \{1, \dots, n\}$. Với mỗi $\sigma \in S_n$ ta định nghĩa $\sigma(\Delta_n) := \prod_{i < j} (x_{\sigma(i)} - x_{\sigma(j)})$. Như vậy, σ hoán vị các chỉ số dưới của x_i và do đó nó đổi dấu của một vài cặp $(x_i - x_j)$ trong Δ_n . Vì vậy, $\sigma(\Delta_n) = \pm \Delta_n$. Từ đây, ta định nghĩa được hàm dấu $\text{sgn}(\sigma) := \frac{\sigma(\Delta_n)}{\Delta_n}$.

Mệnh đề 1.4.7. Hàm dấu $\text{sgn}: S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ được định nghĩa như trên là một đồng cấu. Hơn nữa, sgn là toàn cấu nếu $n > 1$.

Chứng minh. Đầu tiên ta chứng minh sgn được định nghĩa tốt. Thật vậy, với mọi $\sigma, \sigma' \in S_n$ mà $\sigma = \sigma'$ thì rõ ràng $\sigma(\Delta_n) = \sigma'(\Delta_n)$, do đó $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma')$.

Bây giờ ta chỉ ra sgn là một đồng cấu. Thật vậy, với mọi $\sigma, \tau \in S_n$, ta có

$$\text{sgn}(\sigma\tau) = \frac{\sigma\tau(\Delta_n)}{\Delta_n} = \frac{\sigma(\tau(\Delta_n))}{\Delta_n} = \frac{\sigma(\tau(\Delta_n))}{\tau(\Delta_n)} \cdot \frac{\tau(\Delta_n)}{\Delta_n} = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau).$$

Nếu $n \geq 2$ thì ta có $\text{sgn}(\text{id}) = 1$ và $\text{sgn}(12) = -1$ nên sgn là toàn cấu. $\square$

Nhận xét 1.4.8. Nếu $\sigma \in S_n$ là một chuyển vị thì $\text{sgn}(\sigma) = -1$.

Định nghĩa 1.4.9. Phép thế $\sigma \in S_n$ được gọi là phép thế chẵn (tương ứng lẻ) nếu $\text{sgn}(\sigma) = 1$ (tương ứng $\text{sgn}(\sigma) = -1$).

Nhận xét 1.4.10. Phép thế $\sigma \in S_n$ được gọi là phép thế chẵn (tương ứng lẻ) nếu nó được viết dưới dạng tích một số chẵn (tương ứng lẻ) các chuyển vị.

Định lý 1.4.11. Cho $n > 1$, khi đó tập các phép thế chẵn của S_n , kí hiệu là A_n , là một nhóm con chuẩn tắc của S_n có cấp $n!/2$ và $[S_n : A_n] = 2$

Chứng minh. Theo định nghĩa, A_n là nhóm các phép thế chẵn của S_n nên rõ ràng $A_n = \text{sgn}^{-1}(1) = \ker(\text{sgn}) \triangleleft S_n$. Khi đó, ta có $[S_n : A_n] = |S_n/A_n| = 2 = |\{-1, 1\}|$, theo Định lý Lagrange, ta có $|S_n| = [S_n : A_n]|A_n|$ hay $|A_n| = n!/2$. Nhóm A_n như vậy gọi là nhóm thay phiên bậc n (alternating group). $\square$

Một nhóm con quan trọng khác của S_n chính là nhóm nhị diện (dihedral group) D_n được sinh bởi hai phần tử $\sigma = (123 \cdots n)$ và

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & n & n-1 & \cdots & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

hay

$$\tau = \prod_{2 \leq i < n+2-i} (i \ n-i-2).$$

Định lý 1.4.12. Với $n \geq 3$, nhóm D_n có cấp $2n$ và sinh bởi hai phần tử σ và τ thỏa mãn:

(i) σ có cấp n và τ có cấp 2,

(ii) $\tau\sigma = \sigma^{-1}\tau$.

Ngược lại, một nhóm G bất kì sinh bởi hai phần tử σ_1 và τ_1 thỏa mãn (i), (ii) với $n \geq 3$ thì G đẳng cấu với D_n .

Chứng minh. Dễ dàng kiểm tra được σ và τ thuộc D_n thỏa mãn (i) và (ii). Từ định nghĩa nhóm D_n , ta có $D_n - \langle \sigma, \tau \rangle = \{\sigma^i \tau^j | 0 \leq i < n, 0 \leq j \leq 1\}$, từ đây dễ dàng thấy được rằng $|D_n| = 2n$.

Nếu $G = \langle \sigma_1, \tau_1 \rangle$ thì mọi phần tử của G đều có dạng $\sigma^{m_1} \tau^{m_2} \sigma^{m_3} \tau^{m_4} \cdots \tau^{m_k}$ với $m_i \in \mathbb{Z}$. Do G thỏa (i), (ii) nên mọi phần tử của G đều có thể viết dưới dạng $\sigma_1^i \tau_1^j$ với $0 \leq i < n$ và $0 \leq j \leq 1$. Xét ánh xạ $f: D_n \rightarrow G$ cho bởi $f(\sigma^i \tau^j) = \sigma_1^i \tau_1^j$, dễ dàng kiểm tra được f là toàn cấu, ta chỉ cần chứng minh f đơn cấu. Thật vậy, giả sử $\varphi \in \ker f$, khi đó $\varphi = \sigma^i \tau^j$ và $f(\varphi) = \sigma_1^i \tau_1^j = e$ với $0 \leq i < n, 0 \leq j \leq 1$. Nếu $j = 1$ thì ta có $\sigma_1^i = \tau_1^{-1} = \tau_1$, điều này dẫn đến $\sigma_1^{i+1} = \sigma_1^i \sigma_1 = \tau_1 \sigma_1 = \sigma_1^{-1} \tau_1 = \sigma_1^{-1} \sigma_1 = \sigma_1^{i-1}$ nên $\sigma_1^2 = e$ (vô lí vì $n \geq 3$). Do đó $j = 0$, suy ra $\sigma_1^i = e$ suy ra $i = 0$. Như vậy, $\varphi = \sigma^0 \tau^0 = id$ hay $\ker f = \{id\}$ nên f đơn ánh. $\square$

Mệnh đề 1.4.13. Mọi nhóm con hữu hạn cấp n đều đẳng cấu với một nhóm con của S_n .

Chứng minh. Đây là hệ quả trực tiếp của Hệ quả 1.2.13. $\square$

1.5 p -nhóm

Cho G là một nhóm. Ta xét tác động nhóm từ G lên chính nó bởi phép liên hợp như sau:

$$\begin{aligned} \bullet: G \times G &\rightarrow G \\ (g, h) &\mapsto g \cdot h = ghg^{-1}. \end{aligned}$$

Định nghĩa 1.5.1. Hai phần tử $a, b \in G$ được gọi là liên hợp nếu tồn tại $g \in G$ thỏa mãn $b = gag^{-1}$ (tức là nó nằm trong cùng một orbit của tác động G lên chính nó bởi phép liên hợp). Những orbit của tác G lên chính nó bởi phép liên hợp gọi là lớp liên hợp.

Định nghĩa 1.5.2. Cho G là một nhóm và $a \in G$. Khi đó, ta có các định nghĩa sau:

a) Tập $C_G(a) := G_a = \{g \in G | ag = ga\}$ được gọi là tâm hay các hoán tử của a trong G .

b) Tập $Z(G) := \ker(G \curvearrowright G) = \{x \in G \mid gx = xg, \forall g \in G\}$ được gọi là tâm của G .

Nhận xét 1.5.3. Cho G là một nhóm và $a \in G$. Khi đó, $C_G(a)$ là một nhóm con của G và $Z(G)$ là một nhóm con chuẩn tắc của G . Hơn nữa, lớp liên hợp của các phần tử thuộc $Z(G)$ chỉ bao gồm một phần tử.

Từ Định lý 1.2.10 suy ra được bổ đề sau:

Bổ đề 1.5.4. Cho G là một nhóm hữu hạn và $a \in G$. Khi đó, số phần tử trong lớp liên hợp của a là $[G : C_G(a)]$ và do đó nó chia hết cho cấp của G .

Bây giờ, ta đi xây dựng công thức lớp. Cho G là một nhóm hữu hạn, sử dụng quan hệ liên hợp, ta phân hoạch G ra thành các lớp liên hợp rời nhau $C_1, C_2, \dots, C_d$. Khi đó, ta có

$$|G| = |C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_d| = |C_1| + |C_2| + \dots + |C_d|. \quad (1.1)$$

Trong mỗi lớp liên hợp C_i , chọn ra a_i . Khi đó, C_i bao gồm các phần tử liên hợp với a_i . Theo Bổ đề 1.5.4, ta có

$$|G| = [G : C_G(a_1)] + [G : C_G(a_2)] + \dots + [G : C_G(a_d)]. \quad (1.2)$$

Các đẳng thức (1.1) và (1.2) được gọi là công thức lớp của nhóm G . Hơn nữa, từ Nhận xét 1.5.3, công thức lớp còn có thể viết dưới dạng

$$|G| = |Z(G)| + |C_1| + |C_2| + \dots + |C_r|, \quad (1.3)$$

trong đó $C_1, C_2, \dots, C_r$ là các lớp liên hợp rời nhau của G với $|C_i| > 1$ và $|C_i|$ chia hết $|G|$ với mọi $i \in \{1, \dots, r\}$.

Định nghĩa 1.5.5. Cho p là một số nguyên tố. Một nhóm hữu hạn G được gọi là p -nhóm nếu cấp của nó là lũy thừa của p . Nhóm con của một p -nhóm thì được gọi là p -nhóm con.

Định lý 1.5.6. Nếu G là một p -nhóm cấp p^n với $n \geq 1$ thì $|Z(G)| > 1$.

Chứng minh. Thật vậy, từ công thức lớp (1.3) ta có

$$|Z(G)| = |G| - (|C_1| + |C_2| + \dots + |C_r|) \quad (*)$$

trong đó $|C_i| > 1$ và $|C_i|$ chia hết $|G|$ với mọi $i \in \{1, \dots, r\}$. Từ đây suy ra $|C_i| : p$ với mọi $i \in \{1, \dots, r\}$. Vậy p là ước của vế phải của (*) nên p cũng chia hết $|Z(G)|$ và do đó $|Z(G)| > 1$. $\square$

Định lý 1.5.7. Cho G là một p -nhóm cấp p^n . Khi đó, G chứa một p -nhóm con chuẩn tắc cấp p^{n-1} .

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp. Rõ ràng định lý đúng với $n = 1$. Giả sử định lý đúng với mọi $k < n$ với $n \geq 1$. Từ Nhận xét 1.5.3 và Định lý 1.5.6 suy ra $|G/Z(G)|$ là ước thật sự của p^n , giả sử $|G/Z(G)| = p^k$, với $k < n$. Theo giả thuyết quy nạp, tồn tại p -nhóm con $M \triangleleft G/Z(G)$ cấp p^{k-1} , xét toàn cấu chính tắc

$$\begin{aligned} f: G &\rightarrow G/Z(G) \\ g &\mapsto gZ(G). \end{aligned}$$

Ta có $N = f^{-1}(M) \triangleleft G$, khi đó, ta có thể viết $M = f(N) = N/Z(G)$. Khi đó, ta có

$$|N| = |M| \cdot |Z(G)| = |M| \cdot \frac{|G|}{[G : Z(G)]} = p^{k-1} \cdot \frac{p^n}{p^k} = p^{n-1}.$$

Vậy N là nhóm con cần tìm. Từ nguyên lý quy nạp suy ra định lý đã được chứng minh. $\square$

Hệ quả 1.5.8. Cho G là một p -nhóm cấp p^n với $n \geq 1$. Khi đó tồn tại một dãy các nhóm con của G sao cho

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots \supset G_n = \{e\},$$

trong đó $G_i \triangleleft G_{i-1}$ và $G_i = p^{n-i}$ với mọi $i \in \{1, \dots, n\}$.

1.6 Các Định lí Sylow và Định lí Cauchy

Cho G là một nhóm và $H \leq G$ thì ta định nghĩa $gHg^{-1} := \{ghg^{-1} | h \in H\}$. Bây giờ ta xét tác động nhóm từ G lên $\mathcal{P}(G)$ là tập tất cả các tập con của G bởi phép liên hợp như sau:

$$\begin{aligned} \bullet : G \times \mathcal{P}(G) &\rightarrow \mathcal{P}(G) \\ (g, S) &\mapsto g \cdot S = gSg^{-1}. \end{aligned}$$

Lưu ý rằng nếu $S = \{s\}$ thì $g \cdot S = \{gsg^{-1}\}$ và do đó tác động này có thể xem như một mở rộng của tác động liên hợp từ G lên chính nó.

Định nghĩa 1.6.1. Hai tập con S, T của G được gọi là liên hợp trong G nếu tồn tại $g \in G$ sao cho $T = gSg^{-1}$ (hay nói cách khác là S, T cùng nằm trong quỹ đạo của tác động G lên $\mathcal{P}(G)$ bằng phép liên hợp).

Định nghĩa 1.6.2. Cho G là một nhóm và S là một tập con của G . Khi đó, $N_G(S) := G_S = \{g \in G | gSg^{-1} = S\}$ được gọi là normalizer của S trong G .

Định nghĩa 1.6.3. Cho G là một nhóm hữu hạn. Khi đó, H được gọi là một p -nhóm con Sylow của G nếu H có cấp p^m sao cho m là số nguyên không âm lớn nhất thỏa $p^m \mid |G|$ nhưng $p^{m+1} \nmid |G|$.

Cho p là số nguyên tố và $k \in \mathbb{N}$ sao cho $\gcd(k, p) = 1$. Khi đó $C_{kp^m}^{p^m}$ ko chia hết cho p . Thật vậy, ta có

$$\begin{aligned} C_{kp^m}^{p^m} &= \frac{(kp^m)!}{(kp^m - p^m)! \cdot (p^m)!} \\ &= \frac{kp^m}{p^m} \cdot \frac{kp^m - 1}{p^m - 1} \cdots \frac{kp^m - p^m + 1}{1} \\ &= \frac{kp^m}{p^m} \cdot \frac{kp^m - 1}{p^m - 1} \cdots \frac{kp^m - (p^m - 1)}{1} \\ &= k \cdot \frac{kp^m - 1}{p^m - 1} \cdots \frac{kp^m - (p^m - 1)}{1}. \end{aligned}$$

Với $i \in \{1, \dots, p^m - 1\}$ ta có $\frac{kp^m - i}{p^m - i} = \frac{(k-1)p^m}{p^m - i} + 1$ không chia hết cho p . Từ đây suy ra điều phải chứng minh.

Định lí 1.6.4. Cho G là một nhóm hữu hạn có cấp chia hết cho số nguyên tố p . Giả sử p^m là lũy thừa lớn nhất của p sao cho $|G| : p^m$ và đặt $k = |G|/p^m$. Khi đó ta có các định lí sau:

- Tồn tại p -nhóm con Sylow của G .
- Hai p -nhóm con Sylow bất kì của G là liên hợp.
- Số p -nhóm con Sylow của G là ước của k và có dạng $1 + np$.

Chứng minh. Trước hết ta chứng minh a), đặt X là tập tất cả các tập con chứa p^m phần tử của G . Xét tác động nhóm sau

$$\begin{aligned} \varphi : G \times X &\rightarrow X \\ (g, A) &\mapsto gA. \end{aligned}$$

Ta có $|X| = C_{kp^m}^{p^m} = \sum_i |G \cdot A_i|$ không chia hết cho p . Do đó, tồn tại một orbit $G \cdot A$ sao cho $|G \cdot A| \not\equiv 0 \pmod{p}$. Theo Định lý 1.2.10, ta có $|G| = |G \cdot A| |G_A|$, do đó $|G_A|$ chia hết cho p^m . Mặt khác, $G_A a \subset A$ với mọi $a \in A$ nên $|G_A| = |G_A a| \leq |A| = p^m$. Do đó, G_A là p -nhóm con Sylow cần tìm.

Bây giờ ta chứng minh ý b) và c), cho $H_1, \dots, H_t$ là các p -nhóm con của G và ta lấy H_1 tác động lên tập $\{H_1, \dots, H_t\}$ bởi phép liên hợp

$$\begin{aligned} H_1 \times \{H_1, \dots, H_t\} &\rightarrow \{H_1, \dots, H_t\} \\ (h, H_j) &\mapsto h H_j h^{-1}. \end{aligned}$$

Gọi $K_j = G_{H_j}$, theo định nghĩa $K_j = \{h \in H_1 | h H_j h^{-1} = H_j\}$, do đó ta có $K_j \leq H_1$ và $H_1 \cap H_j \subset K_j$. Rõ ràng $K_j H_j = H_j K_j$ nên $K_j H_j \leq G$. Hơn nữa $H_j \triangleleft K_j H_j$ nên theo định lý đẳng cấu thứ 2 suy ra

$$K_j H_j / H_j \cong K_j / (K_j \cap H_j).$$

Do đó $|K_j H_j| = |K_j| |H_j| / |K_j \cap H_j| = p^a$ (vì H_1, H_j là p -nhóm và $K_j \leq H_1$, $K_j \cap H_j \leq H_j$) nhưng do $|H_j| = p^m$ là lũy thừa lớn nhất có thể có của p nên $|K_j H_j| = |H_j|$, suy ra $K_j \subset H_j$. Như vậy, $K_j = H_1 \cap H_j$. Khi đó, $K_1 = H_1$ và orbit của H_1 chỉ có một phần tử chính là H_1 . Nếu $j \neq 1$ thì theo Định lý 1.2.10 ta có cấp của các orbit H_j là bội của p và do đó $t \equiv 1 \pmod{p}$.

Bây giờ ta cho G tác động lên $\{H_1, \dots, H_t\}$ bởi phép liên hợp

$$\begin{aligned} G \times \{H_1, \dots, H_t\} &\rightarrow \{H_1, \dots, H_t\} \\ (g, H_j) &\mapsto g H_j g^{-1}. \end{aligned}$$

Ta cần chỉ ra chỉ tồn tại tác động này là transitive, tức có một orbit. Khi lấy H_1 tác động lên $G \cdot H_1$, ta phân hoạch $G \cdot H_1$ thành các orbit theo tác động của H_1 , rõ ràng $G \cdot H_1$ chứa H_1 nên $|G \cdot H_1| \equiv 1 \pmod{p}$ theo các lập luận ở trên. Giả sử tồn tại $H_r \notin G \cdot H_1$ và ta có H_r tác động lên $G \cdot H_1$ như sau

$$\begin{aligned} H_r \times G \cdot H_1 &\rightarrow G \cdot H_1 \\ (h, H_j) &\mapsto h H_j h^{-1}. \end{aligned}$$

Khi đó $G \cdot H_1$ được phân hoạch thành các orbit rời theo tác động của H_r , theo lập luận trên, mỗi orbit do H_r tác động đều là bội p (do $H_r \notin G \cdot H_1$). Điều này dẫn đến $|G \cdot H_1| \equiv 0 \pmod{p}$ (mâu thuẫn). Do đó $G \cdot H_1 = \{H_1, \dots, H_t\}$. Từ định lý 1.2.10 suy ra $t = |G \cdot H_1|$ là ước của $|G| = kp^m$, mà t không là ước của p nên t là ước của k . $\square$

Định lý 1.6.5 (Cauchy). *Giả sử G là một nhóm hữu hạn có cấp chia hết cho một số nguyên tố p . Khi đó G chứa một phần tử có cấp p .*

1.7 Nhóm giải được

Định nghĩa 1.7.1. Cho G là một nhóm và một dãy lồng nhau các nhóm con của G :

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots \supset G_n = \{e\}. \quad (1.4)$$

Dãy (1.4) được gọi là một tháp chuẩn tắc nếu $G_i \triangleleft G_{i-1}$ với mọi $i \in \{1, \dots, n\}$. Dây (1.4) được gọi là tháp Abel (tương ứng cyclic) nếu các nhóm thương G_i/G_{i-1} là nhóm Abel (tương ứng cyclic) với mọi i . Dây (1.4) được gọi là tháp cyclic cấp nguyên tố nếu nó là tháp cyclic và các nhóm thương G_i/G_{i-1} có cấp nguyên tố với mọi i .

Định nghĩa 1.7.2. Một nhóm G được gọi là giải được nếu tồn tại một tháp Abel của G .

Định lí 1.7.3. Cho G là một nhóm hữu hạn. Khi đó các mệnh đề sau đây là tương đương

- (i) G là một nhóm giải được.
- (ii) Tồn tại tháp cyclic của G .
- (iii) Tồn tại tháp cyclic cấp nguyên tố của G .

Chứng minh. Dễ dàng chỉ ra (iii) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i). Bây giờ ta chỉ ra (i) $\Rightarrow$ (iii). Giả sử G là một nhóm giải được, khi đó tồn tại một tháp Abel của G :

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n = \{e\}. \quad (\#)$$

trong đó $G_i \triangleleft G_{i-1}$ và nhóm thương G_{i-1}/G_i là Abel với mọi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Giả sử p là một ước nguyên tố của $|G_{i-1}/G_i|$. Theo Định lí Cauchy, tồn tại H_i thỏa $|H_i/G_i| = p$ và $G_i \subset H_i \subset G_{i-1}$. Do G_{i-1}/G_i là Abel nên $H_i/G_i \triangleleft G_{i-1}/G_i$, do đó $H_i \triangleleft G_{i-1}$. Mà $G_i \subset H_i$ và $G_i \triangleleft G_{i-1}$ nên $G_i \triangleleft H_i$. Theo Định lí đẳng cấu thứ ba $G_{i-1}/H_i \cong (G_{i-1}/G_i)/(H_i/G_i)$. Suy ra G_{i-1}/H_i là nhóm Abel và do đó G_{i-1}/H_i là nhóm Abel.

Từ các kết quả trên ta thu được $G_i \subset H_i \subset G_{i-1}$ sao cho G_{i-1}/H_i , H_i/G_i là các nhóm Abel và H_i/G_i có cấp nguyên tố.

Với mỗi $i \in \{1, \dots, n\}$, lập luận tương tự như trên ta thu được một dãy $\{K_j\}$ thỏa mãn

$$G_{i-1} = K_0 \supset K_1 \supset K_2 \supset \cdots \supset K_k = G_i$$

và K_{j-1}/K_j là nhóm Abel với mọi $j \in \{1, \dots, k\}$ và K_{j-1}/K_j có cấp nguyên tố với mọi $j \in \{2, \dots, k\}$. Ta cần chỉ ra K_0/K_1 có cấp nguyên tố hoặc là nhóm tầm thường, ta có K_1 nhóm con tối đại của $K_0 = G_{i-1}$, nếu không ta luôn có thể bổ sung được một nhóm K' sao cho K' tối đại, K_0/K' , K'/K_1 là các nhóm Abel và K'/K_1 có cấp nguyên tố. Suy ra K_0/K_1 không có nhóm con thật sự, điều này dẫn đến hoặc K_0/K_1 là nhóm tầm thường hoặc K_0/K_1 sẽ là một nhóm cyclic có cấp nguyên tố.

Như vậy, ta đã “làm mịn” tháp Abel (#) thành tháp cyclic cấp nguyên tố. $\square$

Định lí 1.7.4.

- (i) Mọi nhóm con của một nhóm giải được là một nhóm giải được.
- (ii) Ảnh đồng cấu của một nhóm giải được là giải được.
- (iii) Nhóm thương của một nhóm giải được là giải được.

Chứng minh.

(i) Giả sử G là nhóm giải được và $H \leq G$. Do G là nhóm giải được nên tồn tại một tháp Abel của G :

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n = \{e\},$$

trong đó $G_i \triangleleft G_{i-1}$ và G_{i-1}/G_i là nhóm Abel với mọi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Đặt $H_i = H \cap G_i$, khi đó $H_i \leq H$ và $H_i \triangleleft G_{i-1}$ với mọi $i \in \{1, \dots, n\}$. Xét ánh xạ $\varphi: H_{i-1}/H_i \rightarrow G_{i-1}/G_i$ cho bởi $aH_i \mapsto aG_i$. Dễ dàng thấy được φ là một đơn cấu và do đó các nhóm H_{i-1}/H_i là Abel. Vậy H là nhóm giải được.

(ii) Giả sử G là nhóm giải được và $f: G \rightarrow G'$ là một đồng cấu. Do G là nhóm giải được nên tồn tại một tháp Abel của G :

$$G = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \cdots \supset G_n = \{e\},$$

trong $G_i \triangleleft G_{i-1}$ và G_{i-1}/G_i là nhóm Abel với mọi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Dễ dàng thấy được $f(G_i) \triangleleft f(G_{i-1})$. Xét ánh xạ $\varphi: G_{i-1}/G_i \rightarrow f(G_{i-1})/f(G_i)$, dễ dàng kiểm tra được φ là toàn cấu và do đó các nhóm $f(G_{i-1})/f(G_i)$ là Abel. Vậy $f(G)$ là nhóm giải được.

(iii) Giả sử G giải được và $H \triangleleft G$. Xét toàn cấu chính tắc $p: G \rightarrow G/H$, theo (ii) suy ra G/H là nhóm giải được. $\square$

Định lí 1.7.5. Mọi p -nhóm đều là nhóm giải được

Chứng minh. Đây là hệ quả trực tiếp từ Hệ quả 1.1.2 và Hệ quả 1.5.8. $\square$

Định lí 1.7.6. Nhóm các phép thế là không giải được nếu $n \geq 5$.

Chứng minh. Giả sử S_n (với $n \geq 5$) là nhóm giải được. Khi đó tồn tại tháp Abel của S_n :

$$S_n = G_0 \supset G_1 \supset G_2 \supset \dots \supset G_m = \{(1)\},$$

trong $G_i \triangleleft G_{i-1}$ và G_{i-1}/G_i là nhóm Abel với mọi $i \in \{1, 2, \dots, m\}$. Giả sử (rst) là một vòng xích cấp 3 bất kì trong S_n và u, v là hai phần tử của tập $T = \{1, 2, \dots, n\}$ khác r, s, t (u và v luôn tồn tại vì $n \geq 5$). Nhóm S_n/G_1 là Abel nên $(tus)(srv)(tus)^{-1}(srv)^{-1} = (tus)(srv)(sut)(vrs) = (rst) \in G_1$ (vì $\sigma\tau G_1 = \sigma G_1 \tau G_1 = \tau G_1 \sigma G_1 = \tau\sigma G_1$ nên $\sigma\tau\sigma^{-1}\tau^{-1} \in G_1$). Do đó G_1 chứa tất cả các vòng xích cấp 3. Lập luận tương tự như trên ta cũng có G_2 chứa tất cả các vòng xích cấp 3... và cuối cùng $G_m = \{(1)\}$ chứa tất cả các vòng xích cấp 3. Đây là điều vô lí nên S_n không giải được. $\square$

CHƯƠNG 2

ĐA THỨC

2.1 Đặc số của vành và trường hữu hạn

Định nghĩa 2.1.1. Cho F là một trường. Một F -đại số là một vành R chứa F như vành con. Một đồng cấu giữa các F -đại số $\alpha: R \rightarrow R'$ là một đồng cấu vành thỏa mãn $\alpha(c) = c$ với mọi $c \in F$. Một F -đại số được gọi là hữu hạn nếu nó số chiều hữu hạn khi được xem như một F -KGV.

Ta có thể dễ dàng kiểm tra được ánh xạ

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow F, n \mapsto n1_F := 1_F + \cdots + 1_F \text{ (} n \text{ lần)}$$

là một đồng cấu vành. Ta xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: $\ker f = \langle 0 \rangle$. Khi đó

$$n1_F = 0 \Leftrightarrow n = 0.$$

Lúc này, ta có thể mở rộng f thành một đơn cấu như sau

$$\frac{m}{n} \mapsto (m1_F)(n1_F)^{-1} : \mathbb{Q} \hookrightarrow F.$$

Trong trường hợp này, F chứa một phiên bản của $\mathbb{Q}$ và ta nói F có đặc số 0. Kí hiệu $\text{char}(F) = 0$.

Trường hợp 2: $\ker f \neq \langle 0 \rangle$, do đó $n1_F = 0$ với $n \neq 0$ nào đó. Số n nhỏ nhất thỏa mãn điều đó là một số nguyên tố p và $\ker f = \langle p \rangle$. Khi đó, f định nghĩa được một đẳng cấu từ $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ đến vành con $\{m1_F \mid m \in \mathbb{Z}\}$ của F . Trong trường hợp này F chứa một phiên bản của trường $\mathbb{F}_p$ và ta nói F có đặc số p . Kí hiệu: $\text{char}(F) = p$.

Chứng minh. Dễ dàng kiểm tra được ánh xạ $f: \mathbb{Z} \rightarrow A$ cho bởi $f(n) = n1_A$ là một đồng cấu vành và $\text{im } f = P$ là một vành con. Hơn nữa, ta có $\mathbb{Z}/\ker f \cong P$. Nếu $\text{char}(A) = 0$ thì $n1_A = 0 \Leftrightarrow n = 0$ hay $\ker f = \{0\}$, lúc này $\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/\ker f \cong P$. Nếu $\text{char}(A) = p$ thì $n1_A = 0 \Leftrightarrow p \mid n$ hay $\ker f = p\mathbb{Z}$, lúc này $\mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}/\ker f \cong P$. $\square$

Định nghĩa 2.1.2. Một trường con nguyên tố của F là trường sinh bởi 1_F của F .

Mệnh đề 2.1.3. Trường con nguyên tố P của một trường F bất kì hoặc đẳng cấu với $\mathbb{Q}$ hoặc đẳng cấu với $\mathbb{Z}_p$ với p là số nguyên tố.

Chứng minh. Nếu $\text{char}(F) = 0$ thì ta xét đồng cấu $f: \mathbb{Q} \rightarrow P \subset F$ xác định bởi $f(m/n) = (m1_F)/(n1_F)$, dễ dàng thấy rằng f là đẳng cấu.

Nếu $\text{char}(F) = p$ thì ta xét đồng cấu $f: \mathbb{Z}_p \rightarrow P$ xác định bởi $f(a) = a1_F$, ta cũng dễ dàng kiểm tra được f là đẳng cấu. $\square$

Do mỗi trường F đặc số p đều có trường con nguyên tố đẳng cấu với $\mathbb{Z}_p$ nên ta thường đồng nhất $\mathbb{Z}_p$ với trường con nguyên tố của F và xem $\mathbb{Z}_p$ như một (phiên bản) trường con của F .

Một cách tổng quát hơn, ta nói một vành giao hoán có đơn vị có đặc số p (hoặc 0) nếu nó chứa một trường nguyên tố như một vành con. Khi đó, trường nguyên tố này là duy nhất và chứa 1_R (theo định nghĩa).

Cho R là một vành giao hoán. Với mỗi $a, b \in R$ ta có

$$(a + b)^m = a^m + \binom{m}{1} a^{m-1} b + \binom{m}{2} a^{m-2} b^2 + \cdots + b^m.$$

với $\binom{n}{k} := \frac{n!}{(n-k)!k!}$. Khi đó, dễ dàng thấy được $p \mid \binom{p}{r}$ với p là số nguyên tố. Do đó, nếu R có đặc số p thì

$$(a + b)^p = a^p + b^p, \forall a, b \in R,$$

và ánh xạ $a \mapsto a^p : R \rightarrow R$ là một đồng cấu vành (thậm chí đồng cấu $\mathbb{F}_p$ -đại số). Đồng cấu này được gọi là đồng cấu Frobenius của R . Ánh xạ $a \mapsto a^{p^n} : R \rightarrow R$ cũng là một đồng cấu và do đó

$$(a_1 + \cdots + a_m)^{p^n} = a_1^{p^n} + \cdots + a_m^{p^n}, \forall a_i \in R,$$

Khi $R = F$ là một trường thì đồng cấu Frobenius là một đơn cấu và do đó là đẳng cấu nếu F hữu hạn.

Định nghĩa 2.1.4. Đặc số mũ của một trường F là 1 nếu $\text{char}(F) = 0$ và là p nếu $\text{char}(F) = p \neq 0$.

Nếu q là đặc số mũ của F và $n \geq 1$ thì ánh xạ $x \mapsto X^{q^n}$ là một đẳng cấu giữa F và trường con của F (được kí hiệu là F^{q^n}).

Định lí 2.1.5. Cho F là một trường hữu hạn có đặc số nguyên tố p . Khi đó

- (i) Cấp của F là p^n , với n là số chiều của không gian vector F trên $\mathbb{Z}_p$.
- (ii) Phương trình $X^{p^n} - x = 0$ có p^n nghiệm phân biệt trong F .
- (iii) $X^{p^n} - x = x \prod_{u_i \in F^*} (X - u_i)$ với $F^* = F \setminus \{0\}$.

Chứng minh.

(i) Xét cơ sở của không gian vector F trên $\mathbb{Z}_p$ $\{u_1, \dots, u_n\}$ với $a_i \in F$. Với mỗi $x \in F$ ta có $x = a_1 u_1 + \cdots + a_n u_n$ với $a_i \in \mathbb{Z}_p$, với mỗi i thì ra có p cách chọn a_i , do đó F có p^n phần tử. Như vậy cấp của F là p^n với n là số chiều của không gian vector F trên $\mathbb{Z}_p$.

(ii) và (iii) Xét nhóm nhân F^* có $p^n - 1$ phần tử, theo Định lí Lagrange suy ra $X^{p^n-1} = 1$ với mọi $x \in F^*$, do đó $x^{p^n} - x = 0$ với mọi $x \in F$. Hay nói cách khác, mọi phần tử của F đều là nghiệm của $x^{p^n} - x = 0$. $\square$

Hệ quả 2.1.6. Cho F là một trường hữu hạn. Khi đó, nhóm nhân $F^* = F \setminus \{0\}$ là một nhóm cyclic.

Chứng minh. Giả sử cấp của F là n và gọi M là tập các cấp của các phần tử trong F , do F hữu hạn nên tồn tại m là cấp lớn nhất trong M , điều này có nghĩa là $X^m = 1$ với mọi $x \in F^*$. Theo Định lí 2.1.5, $X^{n-1} = 1$ với mọi $x \in F^*$, từ đây suy ra $n - 1 \leq m$. Mặt khác, theo Hệ quả 1.1.2 ta có $m \mid n - 1$, suy ra $m \leq n - 1$. Như vậy, suy ra tồn tại phần tử của F^* có cấp $m = n - 1 = |F^*|$, do đó F^* là nhóm nhân cyclic. $\square$

2.2 Vành đa thức

Hãy đọc Chương 4. Vành đa thức trong [1] để hiểu chi tiết hơn về đa thức.

Định nghĩa 2.2.1. Một vành $F[X]$ của đa thức với biến hình thức (hay "ẩn") X với các hệ số trong F là một F -KGVN với cơ sở $1, X, \dots, X^n, \dots$ với phép nhân

$$\left(\sum_i a_i X^i \right) \left(\sum_j b_j X^j \right) = \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j \right) X^k.$$

Mệnh đề 2.2.2. Cho R là một F -đại số. Với mỗi $r \in R$, có duy nhất một đồng cấu F -đại số $\alpha: F[X] \rightarrow R$ sao cho $\alpha(X) = r$.

Chứng minh. Định nghĩa ánh xạ $\alpha: F[X] \rightarrow R$ như sau:

$$\alpha: \begin{array}{ccc} F[X] & \rightarrow & R \\ \sum_i (a_i X^i) & \mapsto & \sum_i (a_i r^i). \end{array}$$

Ta chỉ cần kiểm tra α là một đồng cấu. Lấy $f(X) = \sum_i a_i X^i, g(X) = \sum_j b_j X^j \in F[X]$, không giảm tổng quát giả sử $i \leq j$ và ta đặt $a_m = 0$ với $m > i$, khi đó

$$\alpha\left(\sum_k (a_k + b_k) X^k\right) = \sum_k (a_k + b_k) r^k = \sum_i a_i r^i + \sum_j b_j r^j = \alpha\left(\sum_i a_i X^i\right) + \alpha\left(\sum_j b_j X^j\right),$$

suy ra $\alpha(f(X) + g(X)) = \alpha(f(X)) + \alpha(g(X))$.

$$\begin{aligned} \alpha(f(X)g(X)) &= \alpha\left(\sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) X^k\right) \\ &= \sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) r^k \\ &= \left(\sum_i a_i r^i\right) \left(\sum_j b_j r^j\right) \\ &= \left(\alpha\left(\sum_i a_i X^i\right)\right) \left(\alpha\left(\sum_j b_j X^j\right)\right) \\ &= \alpha(f(X)) \alpha(g(X)). \end{aligned}$$

Bây giờ, ta chứng minh tính duy nhất của α , giả sử tồn tại một đồng cấu F -đại số $\beta: F[X] \rightarrow R$ thỏa mãn $\beta(X) = r$. Khi đó, với mọi $f(X) = \sum_i a_i X^i$, ta có

$$\alpha(f(X)) = \alpha\left(\sum_i a_i X^i\right) = \sum_i a_i r^i = \sum_i \beta(a_i) \beta(X^i) = \sum_i \beta(a_i X^i) = \beta\left(\sum_i a_i X^i\right) = \beta(f(X)).$$

Do đó $\alpha = \beta$. □

Ta có một mệnh đề tốt hơn

Mệnh đề 2.2.3 (Tính phổ quát của vành đa thức). Cho R và B là hai vành. Với mỗi đồng cấu $\varphi: R \rightarrow B$ và với mỗi $b \in B$, có duy nhất một đồng cấu $\theta: R[X] \rightarrow B$ là một mở rộng của φ sao cho $\theta(X) = b$.

Chúng minh. Định nghĩa ánh xạ $\theta: R[X] \rightarrow B$ như sau:

$$\begin{aligned} \theta: R[X] &\rightarrow B \\ \sum_i (a_i X^i) &\mapsto \sum_i (\varphi(a_i) b^i). \end{aligned}$$

Ta chỉ cần kiểm tra θ là một đồng cấu. Lấy $f(X) = \sum_i a_i X^i, g(X) = \sum_j a_j X^j \in F[X]$, không giảm tổng quát giả sử $i \leq j$ và ta đặt $a_m = 0$ với $m > i$, khi đó

$$\theta\left(\sum_k (a_k + b_k) X^k\right) = \sum_k \varphi(a_k + b_k) b^k = \sum_i \varphi(a_i) b^i + \sum_j \varphi(b_j) b^j = \theta\left(\sum_i a_i X^i\right) + \theta\left(\sum_j b_j X^j\right),$$

suy ra $\theta(f(X) + g(X)) = \theta(f(X)) + \theta(g(X))$.

$$\begin{aligned} \theta(f(X)g(X)) &= \theta\left(\sum_k \left(\sum_{i+j=k} a_i b_j\right) X^k\right) \\ &= \sum_k \left(\sum_{i+j=k} \varphi(a_i b_j)\right) b^k \\ &= \sum_k \left(\sum_{i+j=k} \varphi(a_i) \varphi(b_j)\right) b^k \\ &= \left(\sum_i \varphi(a_i) b^i\right) \left(\sum_j \varphi(b_j) b^j\right) \\ &= \theta\left(\sum_i a_i X^i\right) \theta\left(\sum_j b_j X^j\right) \\ &= \theta(f(X)) \theta(g(X)). \end{aligned}$$

Bây giờ, ta chứng minh tính duy nhất của θ , giả sử tồn tại một đồng cấu $\psi: R[X] \rightarrow B$ là mở rộng của φ thỏa mãn $\psi(X) = b$. Khi đó, với mọi $f(X) = \sum_i a_i X^i$, ta có

$$\theta(f(X)) = \theta\left(\sum_i a_i X^i\right) = \sum_i \varphi(a_i) b^i = \sum_i \psi(a_i) \psi(X^i) = \sum_i \psi(a_i X^i) = \psi\left(\sum_i a_i X^i\right) = \psi(f(X)).$$

Do đó $\theta = \psi$. □

2.3 Thuật toán Euclide

Thuật toán chia: Cho $f(X), g(X) \in F[X]$ với $g \neq 0$, khi đó tồn tại $q(X), r(X) \in F[X]$ với $r = 0$ hoặc $\deg(r) < \deg(g)$ sao cho

$$f = gq + r;$$

hơn nữa, $q(X), r(X)$ là duy nhất. Do đó, $F[X]$ là một vành Euclide với ánh xạ Euclide $\deg: F[X] \rightarrow \mathbb{N}$ xác định bởi $\deg(a_n X^n + \dots + a_0) = n$ và là một miền phân tích duy nhất. Một đa thức $f(X)$ là bất khả quy nếu nó chỉ có ước tầm thường.

Cho $f \in F[X]$ khác hằng và cho $a \in F$. Từ thuật toán chia suy ra

$$f = (X - a)q + c$$

với $q \in F[X]$ và $c \in F$. Khi đó, nếu a là nghiệm của f ($f(a) = 0$) thì $X - a$ chia hết f . Từ tính phân tích duy nhất, f có tối đa $\deg f$ nghiệm.

Mệnh đề 2.3.1 (Thuật toán Euclide). Cho $f(X), g(X) \in F[X]$. Khi đó, tồn tại các đa thức $a(X), b(X), d(X)$ thỏa mãn

$$a(X)f(X) + b(X)g(X) = d(X)$$

với $\deg a < \deg g, \deg b < \deg f$ và $d(X) = \gcd(f, g)$.

Chứng minh. Không giảm tổng quát giả sử $\deg f \geq \deg g$. Sử dụng thuật toán chia, ta tìm được một dãy hữu hạn các thương và dư như sau

$$f = q_0g + r_0$$

$$g = q_1r_0 + r_1$$

$$r_0 = q_2r_1 + r_2$$

$$\dots$$

$$r_{n-2} = q_nr_{n-1} + r_n$$

$$r_{n-1} = q_{n+1}r_n$$

với r_n là dư khác không cuối cùng. Khi đó, $r_n \mid r_{n-1}$ và do đó $r_n \mid r_{n-2}, \dots$, và do đó $r_n \mid f$ và $r_n \mid g$. Hơn nữa,

$$r_n = r_{n-2} - q_nr_{n-1} = r_{n-2} - q_n(r_{n-3} - q_{n-1}r_{n-2}) = \dots = af + bg,$$

và do đó mọi ước chung của f và g đều chia hết r_n , do đó $r_n = \gcd(f, g)$.

Cho $af + bg = d$. Nếu $\deg a \geq \deg g$, viết $a = gq + r$ với $\deg r < \deg g$, khi đó

$$rf + (b + qf)g = d,$$

và $\deg b \leq \deg(b + qf) < \deg f$ (vì $\deg(b + qf) + \deg g = \deg(b + qf)g = \deg(d - rf) < \deg f + \deg g$). $\square$

Cho I là ideal khác không của $F[X]$ và f là đa thức khác 0 có bậc nhỏ nhất trong I ; khi đó $I = \langle f \rangle$. Khi ta có f là đa thức đơn khởi (tức là có hệ số bậc cao nhất bằng 1) thì sẽ tồn tại một tương ứng 1-1 giữa f và ideal I . Khi đó, ideal nguyên tố sẽ ứng với đa thức đơn khởi bất khả quy.

Do $F[X]$ là miền nguyên nên ta có thể mở rộng nó thành trường các thương $F(X)$. Các phần tử của nó có dạng f/g với $f, g \in F[X]$ và $g \neq 0$ và $f/g = f'/g'$ khi và chỉ khi $fg' = f'g$.

2.4 Phân tích đa thức

Mệnh đề 2.4.1. Cho $r \in \mathbb{Q}$ là một nghiệm của đa thức

$$f(X) = a_nX^n + \dots + a_0 \in \mathbb{Z}[X].$$

Viết $r = p/q$ với $\gcd(p, q) = 1$. Khi đó, $p \mid a_0, q \mid a_n$.

Chứng minh. Thật vậy, do $r = p/q$ là nghiệm của f nên ta có

$$a_n(p/q)^n + \dots + a_1(p/q) + a_0 = 0.$$

Suy ra

$$a_np^n + \dots + a_1pq^{n-1} + a_0q^n = 0.$$

Từ đây, dễ dàng thấy được $q \mid a_np^n$ và do $\gcd(p, q) = 1$ nên $q \mid a_n$. Tương tự, ta có $p \mid a_0$. $\square$

Mệnh đề 2.4.2 (Bổ đề Gauss). Cho $f(X) \in \mathbb{Z}$. Nếu $f(X)$ có phân tích không tầm thường trong $\mathbb{Q}$ thì nó cũng có phân tích không tầm thường trong $\mathbb{Z}$.

Chứng minh. Giả sử $f = gh \in \mathbb{Q}$ với g, h khác hằng. Ta luôn tìm được hai số nguyên m, n sao cho $g_1 = mg$ và $h_1 = nh$ là các đa thức trong $\mathbb{Z}[X]$. Khi đó, ta có phân tích

$$mnf = g_1h_1 \in \mathbb{Z}[X].$$

Nếu một số nguyên tố p chia hết mn thì ta có

$$0 = \overline{g_1}\overline{h_1} \in \mathbb{F}_p[X].$$

Vì $\mathbb{F}_p[X]$ là miền nguyên¹ nên hoặc $\overline{g_1} = 0$ hoặc $\overline{h_1} = 0$. Giả sử $\overline{g_1} = 0$, khi đó $p \mid g_1[X]$ và do đó p chia hết tất cả các hệ số trong $g_1[X]$, lúc này ta viết $g_1[X] = pg_2[X]$ với $g_2 \in \mathbb{Z}[X]$. Khi đó, ta có

$$(mn/p)f = g_2h_1 \in \mathbb{Z}[X].$$

Tiếp tục quá trình này, ta sẽ lần lượt loại bỏ tất cả các nhân tử nguyên tố của mn và có được điều phải chứng minh. $\square$

Mệnh đề 2.4.3. Nếu $f \in \mathbb{Z}$ là đa thức đơn khởi thì mọi nhân tử đơn khởi của f trong $\mathbb{Q}[X]$ đều thuộc $\mathbb{Z}[X]$.

Chứng minh. Giả sử g là nhân tử đơn khởi của f trong $\mathbb{Q}[X]$, suy ra $f = gh$ với $h \in \mathbb{Q}[X]$ là đa thức đơn khởi. Ta luôn chọn được $m, n \in \mathbb{Z}$ sao cho m, n có ít nhân tử nguyên tố nhất thỏa mãn $mg[X], nh[X] \in \mathbb{Z}[X]$. Lập luận tương tự như trong chứng minh của Bổ đề Gauss, nếu $p \mid mn$ thì p chia hết cho tất cả hệ số của $mg[X]$ hoặc nh , không giảm tổng quát giả sử p chia hết cho tất cả hệ số của $mg[X]$. Khi đó, $p \mid m$ vì $g[X]$ là đa thức đơn khởi và do đó $(m/p)g[X] \in \mathbb{Z}[X]$, điều này mâu thuẫn với cách chọn m . $\square$

Từ Bổ đề Gauss, ta có thể chứng minh được một tiêu chuẩn để xét tính bất khả quy, tiêu chuẩn này được gọi là tiêu chuẩn Eisenstein (yub, không phải Albert Einstein).

Mệnh đề 2.4.4 (Tiêu chuẩn Eisenstein). Cho

$$f = a_nX^n + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[X];$$

giả sử tồn tại một số nguyên tố p sao cho

- $\otimes p \nmid a_n;$
- $\otimes p \mid a_i$ với mọi $i = 0, \dots, n-1;$
- $\otimes p^2 \nmid a_0.$

Khi đó, f bất khả quy trong $\mathbb{Q}[X]$.

Chứng minh. Nếu $f[X]$ được phân tích không tầm thường trong $\mathbb{Q}[X]$ thì nó cũng phân tích không tầm thường trong $\mathbb{Z}[X]$ theo Bổ đề Gauss, tức là

$$f[X] = (b_rX^r + \cdots + b_0)(c_sX^s + \cdots + c_0)$$

với $b_i, c_j \in \mathbb{Z}$ và $0 < r, s < n$. Do $p \mid a_0 = b_0c_0$ và $p \nmid a_0 = b_0c_0$ nên hoặc $p \mid b_0$ hoặc $p \mid c_0$. Không giảm tổng quát giả sử $p \mid b_0$. Khi đó ta có

$$a_1 = b_0c_1 + b_1c_0$$

suy ra $p \mid b_1$. Tương tự, từ

$$a_2 = b_0c_2 + b_1c_1 + b_2c_0$$

suy ra $p \mid b_2$. Tiếp tục quá trình này ta thu được $p \mid b_r$, điều này dẫn đến $p \mid a_n$ (mâu thuẫn với giả thuyết). $\square$

¹Do $\mathbb{F}_p$ là một trường và do đó là miền nguyên

Ta còn một cách để xét tính bất khả quy của đa thức

Nhận xét 2.4.5. Cho $f[X] \in \mathbb{Z}[X]$ là một đa thức. Nếu $f[X]$ bất khả quy trong $\mathbb{F}_p$ với p là số nguyên tố không chia hết hệ số bậc cao nhất của f thì nó cũng bất khả quy trong $\mathbb{Z}[X]$.

Chứng minh. Giả sử ngược lại, f có phân tích không tầm thường trong $\mathbb{Z}[X]$ thì $f = gh$. Chọn p là số nguyên tố không chia hết cho hệ số bậc cao nhất của f , khi đó $0 \neq \bar{f} = \bar{g}\bar{h}$ trong $\mathbb{F}_p$, đây là một phân tích không tầm thường của f trong $\mathbb{F}_p$. $\square$

CHƯƠNG 3

LÝ THUYẾT MỞ RỘNG TRƯỜNG

3.1 Mở rộng bậc hữu hạn

Định nghĩa 3.1.1. Cho F và K là hai trường. Trường K được gọi là trường mở rộng của trường F hay là mở rộng trường của F nếu có một đồng cấu từ F vào K . Thông thường, ta đồng nhất F và ảnh của nó trong K và xem như $F \subset K$. Kí hiệu: $K : F$ hoặc K/F (Ta không nên nhầm lẫn K/F là trường thương).

Mệnh đề 3.1.2. Cho K là một mở rộng trường của F . Khi đó ta có thể định nghĩa không gian vector K trên F .

Định nghĩa 3.1.3. Bậc mở rộng $[K : F]$ của mở rộng trường $K : F$ là số chiều của không gian vector K trên F . K được gọi là mở rộng bậc hữu hạn (tương ứng vô hạn) nếu $[K : F]$ hữu hạn (tương ứng vô hạn).

Một tháp các trường là một dãy các trường $K_1, K_2, \dots, K_n$ sao cho $K_1 \subset K_2 \subset \dots \subset K_n$, K_{i+1} là mở rộng trường của K_i với mọi $i \in \{1, \dots, n-1\}$.

Định lí 3.1.4. Cho một tháp các trường $F \subset E \subset K$. Khi đó, K là mở rộng hữu hạn của F nếu và chỉ nếu K là mở rộng hữu hạn của E và E là mở rộng hữu hạn của F . Hơn nữa, $[K : F] = [K : E][E : F]$.

Hệ quả 3.1.5. Cho K là mở rộng bậc hữu hạn của F và $p(X) \in F[X]$ là đa thức bất khả quy. Khi đó, nếu $\deg f(X) \nmid [K : F]$ thì $f(X)$ không có nghiệm trong L .

Định nghĩa 3.1.6. Cho F là một trường và $S \subset F$. Khi đó, giao tất cả các trường chứa F và S được gọi là trường con của F sinh bởi tập S . Nếu K là một mở rộng F và $S \subset K$ thì trường con sinh bởi $F \cup S$ được gọi là trường con sinh bởi X trên F , kí hiệu là $F(X)$. Trong trường hợp S là tập hữu hạn gồm n phần tử u_i thì ta viết $F(S) = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$. Trường $F(u_1, u_2, \dots, u_n)$ lúc này được gọi là một mở rộng hữu hạn sinh của F .

Định lí này cho ta biết cấu trúc của một trường $F(S)$.

Định lí 3.1.7. Cho K là một mở rộng trường của F và $S \subset K$. Khi đó, trường $F(S)$ bao gồm các phần tử có dạng:

$$\frac{f(u_1, u_2, \dots, u_n)}{g(v_1, v_2, \dots, v_m)},$$

trong đó $u_i, v_j \in S$, $g(v_1, v_2, \dots, v_m) \neq 0$ và $f(u_1, u_2, \dots, u_n), g(v_1, v_2, \dots, v_m)$ là các đa thức trên F .

Chứng minh. Đặt E là các phần tử có dạng trên, dễ dàng thấy rằng các trường chứa cả F và S thì phải chứa các phần tử trong E và do đó $E \subset F(S)$. Bây giờ, với mọi $f, g \in F[X_1, \dots, X_n]$ và $f_1, g_1 \in F[X_1, \dots, X_m]$. Ta định nghĩa $h, h_1 \in F[X_1, \dots, X_{m+n}]$ như sau

$$h(X_1, \dots, X_{m+n}) = f(X_1, \dots, X_n)g_1(X_{n+1}, \dots, X_{m+n}) - g(X_1, \dots, X_n)f_1(X_{n+1}, \dots, X_{m+n});$$

$$h_1(X_1, \dots, X_{m+n}) = g(X_1, \dots, X_n)g_1(X_{n+1}, \dots, X_{m+n}).$$

Khi đó, với mọi $u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m \in X$ sao cho $g(u_1, \dots, u_n) \neq 0$ và $g_1(v_1, \dots, v_m) \neq 0$. Ta có

$$\frac{f(u_1, \dots, u_n)}{g(u_1, \dots, u_n)} = \frac{f_1(v_1, \dots, v_m)}{g_1(v_1, \dots, v_m)} = \frac{h(u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m)}{h_1(u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_m)}.$$

Do đó E lập thành một nhóm cộng. Tương tự, đặt $h(X_1, \dots, X_{m+n}) = f(X_1, \dots, X_n)g_1(X_{n+1}, \dots, X_{m+n})$ và $h_1(X_1, \dots, X_{m+n}) = g(X_1, \dots, X_n)f_1(X_{n+1}, \dots, X_{m+n})$, ta cũng chỉ ra được E lập thành 1 nhóm nhân. Do đó E là trường con của $F(S)$. Mặt khác, ta thấy rằng E chứa cả S và F nên theo định nghĩa $F(S) \subset E$. Vậy $E = F(S)$. $\square$

Mệnh đề 3.1.8. Cho K là một mở rộng trường của F . Khi đó, $[K : F] = 1 \Leftrightarrow F = K$

Chứng minh. Dễ dàng chứng minh được chiều ($\Leftarrow$). Ta chứng minh chiều ($\Rightarrow$), giả sử $[K : F] = 1$, khi đó, tồn tại một cơ sở $\{u\}$ của K trên F . Lúc này, với mọi $x \in F \subset K$, tồn tại $y \in F \setminus \{0\}$ sao cho $x = uy$ hay $u = xy^{-1} \in F$. Do đó, $F = K$. $\square$

Mệnh đề 3.1.9. Cho tháp các trường $F \subset E \subset K$. Nếu $[K : F] = p$ nguyên tố thì hoặc $E = F$ hoặc $E = K$.

Chứng minh. Theo Định lý 3.1.4 ta có $p = [K : F] = [K : E][E : F]$, như vậy hoặc $[K : E] = 1$ suy ra $K = E$ hoặc $[E : F] = 1$ suy ra $E = F$. $\square$

3.2 Mở rộng đơn

Định nghĩa 3.2.1. Cho K là một mở rộng trường của F . Khi đó, K là một mở rộng đơn của F nếu tồn tại $u \in K$ sao cho $K = F(u)$, u được gọi là phần tử nguyên thủy của K .

Định nghĩa 3.2.2. Cho K là một mở rộng trường của F và $u \in K$. Phần tử u được gọi là đại số trên F nếu tồn tại đa thức $f(X) \in F[X]$ sao cho $f(u) = 0$. Phần tử u được gọi là siêu việt trên F nếu nó không là phần tử đại số trên F .

Mệnh đề 3.2.3. Cho F là một trường và $F(X)$ là trường các thương của vành đa thức $F[X]$. Khi đó, $F(X)$ là một mở rộng siêu việt.

Chứng minh. Thật vậy, rõ ràng $F(X)$ là một mở rộng đơn. Nếu $f(X) = p(X)/q(X) \in F(X)$ mà $f(X) = 0$ thì rõ ràng f phải là đa thức 0. Do đó, X là siêu việt trên F . $\square$

Định lý 3.2.4. Cho K là một mở rộng của F và $u \in K$ đại số trên F . Khi đó, tồn tại một đa thức đơn khởi $p(X)$ bất khả quy nhận u làm nghiệm. Hơn nữa, nếu $f(X)$ nhận u làm nghiệm thì $f(X)$ chia hết cho $p(X)$. Đa thức $p(X)$ như vậy được gọi là đa thức tối thiểu của u trên F . Các đa thức tối thiểu thì liên kết với nhau.

Định lý 3.2.5. Cho K là một mở rộng trường của F và $u \in K$ đại số trên F . Gọi $p(X)$ là đa thức tối thiểu của u trên F , khi đó

$$(i) \quad F[u] = F(u) \cong_F F[X]/\langle p(X) \rangle.$$

$$(ii) \quad \{1, u, \dots, u^{n-1}\} \text{ là một cơ sở của } F(u) \text{ trên } F.$$

$$(iii) \quad [F(u) : F] = n = \deg p(X).$$

Chúng minh.

(i) Xét ánh xạ $\varphi: F[X] \rightarrow F[u]$ xác định bởi $\varphi(f(X)) = f(u)$, từ Mệnh đề 2.2.3 suy ra φ là một đồng cấu và ta cũng dễ dàng chỉ ra được φ là toàn cấu, do $p(X)$ là đa thức tối tiểu của u nên $\ker \varphi = \langle p(X) \rangle$ nên theo Định lí đẳng cấu vành suy ra $F[X]/\langle p(X) \rangle \cong F[u]$. Mặt khác, do $p(X)$ bất khả quy nên $\langle p(X) \rangle$ là ideal tối đại, do đó $F[X]/\langle p(X) \rangle$ là một trường chứa u và F , theo định nghĩa $F(u) \subset F[u]$ nên $F(u) = F[u]$.

(ii) Với mọi $f(X) \in F[X]$, theo thuật toán chia, tồn tại $q(X), r(X) \in F[X]$ với $\deg r(X) < \deg p(X)$ sao cho $f(X) = q(X)p(X) + r(X)$. Khi đó với mọi $f(u) \in F[u] = F(u)$ có thể được viết dưới dạng

$$f(u) = q(u)p(u) + r(u) = r(u) = a_0 + a_1u + \cdots + a_{n-1}u^{n-1},$$

với $\deg p(X) = n$. Như vậy, $\{1, u, \dots, u^{n-1}\}$ là một tập sinh của $F(u)$. Bây giờ ta chứng minh nó độc lập tuyến tính, giả sử $c_0 + c_1u + \cdots + c_{n-1}u^{n-1} = 0$, khi đó u là nghiệm của $f(X) = c_0 + c_1X + \cdots + c_{n-1}X^{n-1}$, theo định nghĩa $p(X) \mid f(X)$, điều này chỉ xảy ra nếu $c_0 = c_1 = \cdots = c_{n-1} = 0$, đây là điều phải chứng minh.

(iii) Suy ra trực tiếp từ (ii). □

Nhận xét 3.2.6.

- Cho K là một mở rộng trường của F và $u, v \in F$. Nếu u, v là hai nghiệm của cùng một đa thức tối tiểu $p(X)$ trên F thì $F(u) \cong_F F(v) (\cong_F F[X]/\langle p(X) \rangle)$.
- Nếu α là phần tử siêu việt trên trường F thì $[F(\alpha) : F] = \infty$.
- Cho K, E là hai trường và $\sigma : K \rightarrow E$ là một đẳng cấu. Khi đó ánh xạ $K[X] \rightarrow E[X]$ cho bởi:

$$f(X) = a_0 + \cdots + a_nX^n \mapsto \sigma f(X) = \sigma(a_0) + \cdots + \sigma(a_n)X^n.$$

cũng là một đẳng cấu. Dễ thấy nếu $p(X)$ là một đa thức bất khả quy trong $K[X]$ thì $\sigma p(X)$ cũng là một đa thức bất khả quy trong $E[X]$.

Hệ quả 3.2.7. Cho $\sigma : K \rightarrow E$ là một đẳng cấu trường. Giả sử u, v lần lượt là phần tử đại số của một mở rộng nào đó trên K và trên E nhận $p(X)$ và $\sigma p(X)$ làm đa thức tối tiểu. Khi đó, ta có thể mở rộng σ thành $\bar{\sigma} : K(u) \rightarrow E(v)$ sao cho $\bar{\sigma}(u) = v$.

Chúng minh. Theo Nhận xét 3.2.6 ta có thể mở rộng σ thành đẳng cấu $K[X] \rightarrow E[X]$, để thuận tiện, ta kí hiệu đẳng cấu này là σ . Theo Định lí 3.2.5, tồn tại đẳng cấu $\bar{\tau} : E[X]/\langle \sigma p(X) \rangle \rightarrow E[v] = E(v)$ cho bởi $\bar{\tau}(\overline{g(X)}) = g(v)$. Xét toàn cấu $\pi : E[X] \rightarrow E[X]/\langle \sigma p(X) \rangle$ và hợp thành các ánh xạ

$$\begin{array}{ccccccc} K[X] & \xrightarrow{\sigma} & E[X] & \xrightarrow{\pi} & E[X]/\langle \sigma p(X) \rangle & \xrightarrow{\bar{\tau}} & E(v) \\ f(X) & \mapsto & \sigma f(X) & \mapsto & \overline{\sigma f(X)} & \mapsto & \sigma f(v). \end{array}$$

Theo Định lí đẳng cấu thứ nhất, tồn tại đẳng cấu $\theta : K[X]/\langle p(X) \rangle \rightarrow E(v)$ cho bởi $\theta(\overline{f(X)}) = \sigma f(v)$, lần lượt xét $g_1(X) = X$ và $g_2(X) = c \in K$ bất kì, ta thu được $\theta(\overline{g_1(X)}) = \sigma g_1(v) = \sigma(1_K)v = v$ và $\theta(\overline{g_2(X)}) = \sigma g_2(v) = \sigma(c)$. Theo Định lí 3.2.5, ta có một đẳng cấu $\bar{\varphi} : K[u] = K(u) \rightarrow K[X]/\langle p(X) \rangle$ cho bởi $\bar{\varphi}(f(u)) = \overline{f(X)}$. Xét phép hợp thành các ánh xạ:

$$K(u) \xrightarrow{\bar{\varphi}} K[X]/\langle p(X) \rangle \xrightarrow{\theta} E(v)$$

cho bởi $\bar{\sigma}(f(u)) = \theta \bar{\varphi}(f(u)) = \sigma f(v)$ là một đẳng cấu thỏa mãn $\bar{\sigma}(u) = \theta(\bar{\varphi}(u)) = \theta(\overline{X}) = v$ và $\bar{\sigma}(c) = \theta(\bar{\varphi}(c)) = \theta(\overline{c}) = \sigma(c)$ với mọi $c \in K$. □

Hệ quả 3.2.8. Cho K là mở rộng trường của F và $u, v \in K$. Nếu u, v đều là nghiệm của cùng một đa thức tối tiểu $p(X)$ thì tồn tại F -đẳng cấu $\tau : F(u) \rightarrow F(v)$ sao cho $\tau(u) = v$.

Trường mầm

Định nghĩa 3.2.9. Cho $f \in F[X]$ là đa thức đơn khởi bất khả quy. Một cặp (K, α) chứa mở rộng K của F và $\alpha \in K$ được gọi là trường mầm đối với f nếu $E = K[\alpha]$ và $f(\alpha) = 0$.

Ví dụ 3.2.10. Cho cặp (E, α) với $E = F[X]/\langle f \rangle = F[x]$ và $\alpha = x$ là một trường mầm đối với f .

Bây giờ, cho (E, α) là một trường mầm và xét toàn cấu giữa các F -đại số như sau:

$$g(X) \mapsto g(\alpha) : F[X] \rightarrow E.$$

Nhân của đồng cấu này được sinh bởi f . Do đó ta có thể định nghĩa được một F -đẳng cấu

$$x \mapsto \alpha : F[x] \rightarrow E, \text{ với } F[x] = F[X]/\langle f \rangle.$$

Nói cách khác, một trường mầm (E, α) bất kì của f đều F -đẳng cấu với trường mầm $(F[x]/\langle f \rangle, x)$. Do đó, mọi phần tử của trường mầm (E, α) đối với f có thể được biểu diễn duy nhất dưới dạng

$$a_0 + a_1\alpha + \cdots + a_{m-1}\alpha^{m-1}, a_i \in F, m = \deg f$$

và các thuật toán trong $F[\alpha]$ có thể được thực hiện tương tự như trong $F[X]$. Nếu (E', α') là trường mầm thứ 2 của f thì có duy nhất một F -đẳng cấu $E \rightarrow E'$ biến α thành α' . Thỉnh thoảng người ta viết “trường mầm $F[\alpha]$ ” thay vì “trường mầm $(F[\alpha], \alpha)$ ”.

3.3 Mở rộng đại số

Định nghĩa 3.3.1. Cho K là một mở rộng trường của F . Trường K được gọi là mở rộng đại số của F nếu mọi phần tử của K đều đại số trên F .

Định lý 3.3.2. Cho K là mở rộng bậc hữu hạn của F . Khi đó, K là mở rộng đại số của F .

Từ Định lý 3.3.2 suy ra ngay nếu tồn tại một phần tử của K siêu việt trên F thì K phải là mở rộng bậc vô hạn của F .

Định lý 3.3.3. Cho K là mở rộng bậc hữu hạn của F . Khi đó, K là mở rộng hữu hạn sinh của F .

Chứng minh. Giả sử $[K : F] = n$, gọi $\{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ là cơ sở của không gian vector K trên F , ta chỉ ra $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$. Thật vậy, ta có ngay $F(u_1, u_2, \dots, u_n) \subset K$. Bây giờ, lấy $a \in K$, suy ra $a = c_1u_1 + c_2u_2 + \cdots + c_nu_n \in F(u_1, u_2, \dots, u_n)$, với $c_i \in F$, do đó $K \subset F(u_1, u_2, \dots, u_n)$. Như vậy, $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$. $\square$

Định lý 3.3.4. Giả sử $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$ là một mở rộng hữu hạn sinh của trường F và các phần tử u_i là đại số trên $F(u_1, \dots, u_{i-1})$. Khi đó, K là mở rộng bậc hữu hạn của F .

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp. Với $n = 1$ thì từ Định lý 3.2.5 suy ra kết quả đúng. Giả sử kết quả đúng cho mọi $n < k$, khi đó, xét $K = F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})(u_k) = F(u_1, u_2, \dots, u_k)$ là mở rộng bậc hữu hạn của $F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})$ theo Định lý 3.2.5, mà theo giả thiết quy nạp thì $F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})$ là mở rộng bậc hữu hạn của F , do đó theo Định lý 3.1.4 ta có $[F(u_1, u_2, \dots, u_k) : F] = [F(u_1, u_2, \dots, u_k) : F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1})][F(u_1, u_2, \dots, u_{k-1}) : F]$ là hữu hạn. $\square$

Hệ quả 3.3.5. K là mở rộng bậc hữu hạn của F khi và chỉ khi tồn tại $u_i \in K$ đại số trên F sao cho $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$.

Hệ quả 3.3.6. Cho một tháp các trường $F \subset E \subset K$. Nếu E là mở rộng đại số của F và K là mở rộng đại số của E khi và chỉ khi F là mở rộng đại số của K .

Chứng minh. Dễ dàng chứng minh được chiều ($\Leftarrow$). Ta chứng minh chiều ($\Rightarrow$), lấy $u \in K$ bất kì, theo giả thiết, tồn tại $a_i \in E$ đại số trên F và không đồng thời bằng không sao cho $a_0 + a_1u + \dots + a_mu^m = 0$. Rõ ràng, u đại số trên $F(a_1, \dots, a_m)$ nên theo Định lý 3.3.2 và Định lý 3.3.4 suy ra $F(a_1, \dots, a_m, u)$ là mở rộng đại số trên F , do đó u đại số trên F . $\square$

Hệ quả 3.3.7. Cho K là một mở rộng trường của F . Giả sử E là tập hợp các phần tử đại số của K trên F . Khi đó, E là trường con của K và là mở rộng đại số của F .

Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh E là trường con của K . Thật vậy, với mọi $u, v \in E$ thì u, v đại số trên F , xét $F(u, v)$ là mở rộng đại số của F theo Định lý 3.3.4, mặc khác E chứa F nên ta có $F(u, v) \subset E$, do đó $u - v \in E$, nếu $v \neq 0$ thì $uv^{-1} \in E$, do đó E là một trường con của K . $\square$

Đồng cấu từ các mở rộng đơn

Cho F là một trường và E, E' là hai trường chứa F . Một F -đồng cấu $\varphi: E \rightarrow E'$ biến

$$\sum a_{i_1 \dots i_m} \alpha_1^{i_1} \dots \alpha_m^{i_m}$$

thành

$$\sum a_{i_1 \dots i_m} \varphi(\alpha_1)^{i_1} \dots \varphi(\alpha_m)^{i_m},$$

với $a_{i_1 \dots i_m} \in F, \alpha_i \in E$. Một F -đồng cấu $E \rightarrow E'$ là một F -ánh xạ tuyến tính đơn ánh của F -KGV và nó sẽ là F -đẳng cấu nếu E và E' có cùng bậc mở rộng hữu hạn trên F .

Mệnh đề 3.3.8. Cho $F(\alpha)$ là một mở rộng đơn của trường F và $\varphi_0: F \rightarrow \Omega$ là một đồng cấu trường.

(i) Nếu α siêu việt trên F thì ánh xạ $\varphi \mapsto \varphi(\alpha)$ xác định một tương ứng 1-1 giữa

$$\{\varphi: F(\alpha) \rightarrow \Omega \text{ là mở rộng của } \varphi_0\} \leftrightarrow \{\text{Số phần tử của } \Omega \text{ siêu việt trên } \varphi_0(F)\}.$$

(ii) Nếu α đại số trên F , gọi $f(X)$ là đa thức tối thiểu của α , khi đó ánh xạ $\varphi \mapsto \varphi(\alpha)$ xác định một tương ứng 1-1 giữa

$$\{\varphi: F(\alpha) \rightarrow \Omega \text{ là mở rộng của } \varphi_0\} \leftrightarrow \{\text{Nghịệm của } \varphi_0 f \text{ trong } \Omega\}.$$

Chứng minh.

(i) Do α siêu việt trên F nên $F[X] \cong F[\alpha]$. Với mỗi $\gamma \in \Omega$, theo Mệnh đề 2.2.3, tồn tại một đồng cấu $\varphi: F[\alpha] \rightarrow \Omega$ là mở rộng của φ_0 thỏa mãn $\varphi(\alpha) = \gamma$. Đồng cấu φ này được mở rộng một cách duy nhất (ta vẫn sẽ kí hiệu mở rộng đó là φ) thành $F(\alpha) \rightarrow \Omega$ với $F(\alpha)$ là trường phân rã của $F[\alpha]$ nếu và chỉ nếu các phần tử khác không của $F[\alpha]$ biến thành những phần tử khác không của Ω , điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi γ siêu việt trên $\varphi_0(F)$. Điều này khẳng định điều phải chứng minh.

(ii) Cho $f(X) = \sum a_i X^i$ và xét mở rộng $\varphi: F[\alpha] \rightarrow \Omega$ của φ_0 . Từ $f(\alpha) = \sum a_i \alpha^i = 0$ ta suy ra $\varphi(f(\alpha)) = \varphi(\sum a_i \alpha^i) = \sum \varphi_0(a_i) \varphi(\alpha)^i = 0$, hay nói cách khác $\varphi_0 f(\varphi(\alpha)) = 0$. Ngược lại, nếu $\gamma \in \Omega$ là một nghiệm của $\varphi_0 f$ bất khả quy nên $\varphi_0 f$ là đa thức tối thiểu của γ , khi đó từ Định lý 3.2.5 suy ra $F[\alpha] \cong F[X]/\langle f(X) \rangle$. Từ Mệnh đề 2.2.3 Tồn tại mở rộng $\psi: F[X] \rightarrow \Omega$ của φ_0 sao cho $\psi(X) = \gamma$, lúc này $\ker \psi = \langle f(X) \rangle$ nên ta có một đồng cấu $\varphi: F[\alpha] \rightarrow \Omega$ sao cho $\varphi(\alpha) = \gamma$. $\square$

3.4 Trường phân rã của một đa thức

Định nghĩa 3.4.1. Giả sử K là một mở rộng trường của F . Giả sử $f(X) \in F[X]$ là một đa thức trên F có bậc $n \geq 1$, $f(X)$ được gọi là *chẻ trên K* nếu nó được viết dưới dạng tích các nhân tử tuyến tính (đa thức bậc nhất) trong $K[X]$, tức là

$$f(X) = a(X - u_1)(X - u_2) \dots (X - u_n).$$

với $a \in F$ và các $u_i \in K$ không nhất thiết khác nhau.

Định nghĩa 3.4.2. Cho K là một mở rộng trường của F và $f(X) \in F[X]$ là một đa thức bậc $n \geq 1$. Trường K được gọi là *trường phân rã* (trường nghiệm) của $f(X)$ trên F nếu nó thỏa hai điều kiện sau:

(i) $f(X)$ chẻ trên K , tức là

$$f(X) = a(X - u_1)(X - u_2) \dots (X - u_n).$$

(ii) $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n)$.

Nhận xét 3.4.3.

a) Từ định nghĩa ta dễ dàng thấy rằng trường phân rã của một đa thức $f(X)$ trên F chính là trường nhỏ nhất chứa tất cả các nghiệm của $f(X) = 0$. Hơn nữa, nếu K là trường phân rã của f trên F thì $[K : F]$ phải là hữu hạn và do đó K cũng là một mở rộng đại số của F theo Định lý 3.3.2 và Hệ quả 3.3.5.

b) Cho một tháp các trường $F \subset E \subset K$ sao cho E là trường phân rã của f trên F và $\alpha \in K$. Khi đó, dễ dàng chỉ ra được $E(\alpha)$ là trường phân rã của f trên $F(\alpha)$.

Định lý 3.4.4 (Kronecker). Cho F là một trường và $p(X) \in F[X]$ là đa thức bất khả quy. Khi đó, tồn tại một mở rộng trường K của F làm cho $p(X)$ có nghiệm trong K .

Chứng minh. Do $p(X)$ là đa thức bất khả quy nên $\langle p(X) \rangle$ là ideal tối đại trong vành $F[X]$, suy ra $K = F[X]/\langle p(X) \rangle$ là một trường. Xét đồng cấu vành $\sigma: F \rightarrow K$ xác định bởi $\sigma(a) = \bar{a} = a + \langle p(X) \rangle$, ta chỉ ra σ là đơn cấu, thật vậy, với mọi $\bar{a}, \bar{b} \in K$ mà $\bar{a} = \bar{b}$ thì $a - b \in \langle p(X) \rangle$ nên $p(X) | a - b$, điều này chỉ xảy ra nếu và chỉ nếu $a = b$. Do đó, ta có thể đồng nhất a và $\bar{a}$ và xem K là một mở rộng của F . Lấy $u = \bar{x} \in K$, khi đó ta có $p(u) = p(\bar{x}) = \overline{p(x)} = 0$ trong K . Như vậy, u là một nghiệm của $f(X)$ trong K và do đó $p(X)$ có nghiệm trong K . $\square$

Định lý 3.4.5. Cho F là một trường và $f(X) \in F[X]$ là một đa thức bậc n . Tồn tại trường phân rã E_f của $f(X)$ trên F sao cho $[E_f : F]$ là ước của $n!$.

Chứng minh. Kết quả hiển nhiên đúng với $n = 1$. Ta giả sử kết quả đúng với $n < k$. Bây giờ ta chứng minh kết quả cũng đúng với $n = k$, giả sử f là đa thức bậc k .

Nếu f không bất khả quy, ta viết $f = gh$ với $\deg g = l < k$ và $\deg h = k - l < k$. Theo giả thiết quy nạp, ta có $[E_g : F] \mid l!$ với E_g là trường phân rã của g trên F . Gọi E_h là trường phân rã của h trên E_g , theo giả thiết quy nạp ta có $[E_h : E_g] \mid (l - k)!$. Khi đó, E_h cũng là trường phân rã của $f = gh$ trên F và $[E_h : F] = [E_h : E_g][E_g : F] \mid (l - k)! \cdot l! \mid k!$.

Nếu f bất khả quy, theo Định lý 3.4.4, tồn tại trường K làm cho f có nghiệm trong K , giả sử nghiệm đó là α và đặt $F_1 = F(\alpha)$, rõ ràng f cũng có nghiệm trên F_1 và $\alpha \in F_1$ đại số trên F . Ta viết $f = (X - \alpha)f_1$ với $f_1 \in F_1$ là đa thức bậc $k - 1$, theo giả thiết quy

nạp, tồn tại trường phân rã của f_1 trên F_1 sao cho $[E_{f_1} : F_1] \mid (k-1)!$. Rõ ràng, E_{f_1} cũng là trường phân rã của f trên F và

$$[E_{f_1} : F] = [E_{f_1} : F_1] \cdot [F_1 : F] \mid (k-1)! \cdot k = k!$$

do Định lí 3.1.4 và Định lí 3.2.5. □

Như vậy, với f là một đa thức trên trường F cho trước, ta có thể xây dựng nhiều trường phân rã của f trên F . Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là các trường phân rã này có mối liên hệ với nhau như thế nào? Định lí dưới đây sẽ trả lời cho câu hỏi này.

Định lí 3.4.6. Cho K và E là hai trường và $\sigma: K \rightarrow E$ là một đẳng cấu. Giả sử K' và E' lần lượt là trường phân rã của đa thức f và σf trên trường K và E . Khi đó, σ được mở rộng thành một đẳng cấu $\sigma': K' \rightarrow E'$.

Chứng minh. Dễ dàng thấy rằng định lí đúng với $\deg f = 1$ vì trường phân rã của đa thức bậc 1 trên một trường F là chính nó. Giả sử định lí đúng với mọi đa thức có bậc $n-1$ và giả sử $\deg f(X) = n$, với $n > 1$. Chọn $p(X) \in K[X]$ là một nhân tử bất khả quy của $f(X)$, khi đó $\sigma p(X)$ cũng là một nhân tử bất khả quy của $\sigma f(X)$. Mà K' chứa tất cả các nghiệm của $f(X)$ nên nó cũng chứa mọi nghiệm của $p(X)$, tương tự E' cũng chứa mọi nghiệm của $\sigma p(X)$, gọi $u \in K'$ và $v \in E'$ lần lượt là nghiệm của $p(X)$ và $\sigma p(X)$. Theo Hệ quả 3.2.7, σ được mở rộng thành đẳng cấu $\delta: K(u) \rightarrow E(v)$ sao cho $\delta(u) = v$ và $\delta(c) = \sigma(c)$ với mọi $c \in K$. Mặt khác, ta có thể viết $f(X) = (X-u)g(X)$ với $g(X) \in K[X]$ và

$$\sigma f(X) = \delta f(X) = (X - \delta(u)) \cdot \delta g(X) = (X - v) \cdot \delta g(X).$$

Mà K' là trường phân rã của f trên K nên f chẻ trên K' , tức là $f(X) = c(X-u_1) \dots (X-u_n)$, không giảm tổng quát giả sử $u_1 = u$. Do đó, $g(X) = c(X-u_2) \dots (X-u_n)$ và $K' = K(u)(u_2, \dots, u_n) = K(u_1, \dots, u_n)$ là trường phân rã của g trên $K(u)$. Hoàn toàn tương tự, vì E' là trường phân rã của σf trên E nên σf chẻ trên E' , tức là $\delta f(X) = \sigma f(X) = c'(X-v_1) \dots (X-v_n)$, không giảm tổng quát giả sử $v_1 = v$. Khi đó, $\delta g(X) = c'(X-v_2) \dots (X-v_n)$ và $E' = E(v)(v_2, \dots, v_n) = E(v_1, \dots, v_n)$ là trường phân rã của $\delta g(X)$. Theo giả thiết quy nạp, δ được mở rộng thành $\sigma': K' \rightarrow E'$ thỏa mãn $\sigma'(c) = \sigma(c)$ với mọi $c \in K$, tức σ' là một mở rộng của σ . □

Hệ quả 3.4.7. Hai trường phân rã của cùng một đa thức thì đẳng cấu.

Đồng cấu giữa các mở rộng đại số

Mục này viết cách tiếp cận của J.S. Milne, cách ở trên tuy dễ hơn nhưng khi học xa hơn thì sẽ gặp bế tắc.

Mệnh đề 3.4.8. Cho $f \in F[X]$, E là mở rộng trường của F sinh bởi các nghiệm của f và Ω là một mở rộng trường của F sao cho f chẻ trên Ω . Khi đó, tồn tại một F -đồng cấu $\varphi: E \rightarrow \Omega$; hơn nữa, số lượng những F -đồng cấu này không vượt quá $[E : F]$ và đúng bằng $[E : F]$ nếu f có nghiệm phân biệt trong Ω .

Chứng minh. Không giảm tổng quát, giả sử f là đơn khởi.

Từ giả thuyết suy ra $f = \prod (X - \beta_i) \in \Omega[X]$. Cho L là trường con của Ω chứa F và $g \in L[X]$ là nhân tử đơn khởi của f . Khi đó, $g \mid f$ và do đó g có dạng $g = \prod (X - \beta_j)$. Cụ thể hơn, g chẻ trong $\Omega[X]$ và có nghiệm phân biệt nếu f có nghiệm phân biệt.

Lại từ giả thuyết, $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ với mỗi α_i là nghiệm của $f(X)$. Đa thức tối thiểu của α_1 là đa thức bất khả quy f_1 chia hết f . Sử dụng khẳng định ở trên (chọn $L = F$),

suy ra f_1 chẻ trong $\Omega[X]$ và có nghiệm phân biệt nếu f có nghiệm phân biệt. Theo Mệnh đề 3.3.8 và Định lý 3.2.5, tồn tại F -đồng cấu $\varphi_1: F[\alpha_1] \rightarrow \Omega$ và số các F -đồng cấu này không vượt quá $[F(\alpha_1) : F]$, dấu bằng xảy ra khi f có nghiệm phân biệt trong Ω .

Đa thức tối thiểu của α_2 trên $F(\alpha_1)$ là nhân tử bất khả quy f_2 của f trong $F(\alpha_1)[X]$. Sử dụng khẳng định ở trên, chọn $L = \varphi_1 F(\alpha_1)$ và $g = \varphi_1 f_2$, khi đó $\varphi_1 f_2$ chẻ trong $\Omega[X]$ và có nghiệm phân biệt nếu f có nghiệm phân biệt. Theo Mệnh đề 3.3.8 mỗi F -đồng cấu φ_1 được mở rộng thành một $\varphi_1 F(\alpha_1)$ -đồng cấu $\varphi_2: F(\alpha_1, \alpha_2) \rightarrow \Omega$ ¹ và có tối đa $[F(\alpha_1, \alpha_2) : F(\alpha_1)]$ các φ_2 như vậy; dấu bằng xảy ra khi f có nghiệm phân biệt.

Tóm lại, ta có thể nói rằng tồn tại F -đồng cấu $\varphi: F(\alpha_1, \alpha_2) \rightarrow \Omega$ và số đồng cấu như vậy không vượt quá $[F(\alpha_1, \alpha_2) : F] = [F(\alpha_1, \alpha_2) : F(\alpha_1)][F(\alpha_1) : F]$ và dấu bằng xảy ra khi f có nghiệm phân biệt.

Lặp lại quá trình này m lần ta có điều phải chứng minh. $\square$

Hệ quả 3.4.9. Nếu E_1 và E_2 là hai trường phân rã của f trên F thì mọi F -đồng cấu $E_1 \rightarrow E_2$ là đẳng cấu. Nói cách khác, hai trường phân rã của f là F -đẳng cấu.

Chứng minh. Lưu ý rằng mỗi F -đồng cấu $E_1 \rightarrow E_2$ đều là một đơn cấu và do đó $[E_1 : F] \leq [E_2 : F]$. Do đó, từ Mệnh đề 3.4.8, tồn tại các đồng cấu đi từ $E_1 \rightarrow E_2$ và $E_2 \rightarrow E_1$ và do đó $[E_1 : F] = [E_2 : F]$. Từ đây suy ra mọi F -đồng cấu $E_1 \rightarrow E_2$ là F -đẳng cấu.² $\square$

Hệ quả 3.4.10. Cho E và L là hai mở rộng trường của F với $[E : F]$ hữu hạn. Số F -đồng cấu $E \rightarrow L$ không vượt quá $[E : F]$.

Chứng minh. Viết $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ và $f = \prod f_i \in F[X]$ với f_i là đa thức tối thiểu của α_i ; như vậy E chính là trường được sinh ra bởi các nghiệm của F . Gọi Ω là trường phân rã của f trên L (ta xem như $f \in L[X]$). Từ Mệnh đề 3.4.8, số F -đồng cấu $E \rightarrow \Omega$ không vượt quá $[E : F]$, mà mỗi F -đồng cấu $E \rightarrow L$ có thể được xem như là F -đồng cấu $E \rightarrow \Omega$, từ đây ta có điều phải chứng minh. $\square$

Nhận xét 3.4.11. Cho $E_1, E_2, \dots, E_m$ là các mở rộng trường hữu hạn của F và L là một mở rộng trường của F . Từ hệ quả trên, dễ dàng thấy rằng tồn tại một mở rộng $L_1 : L$ sao cho L_1 chứa ảnh đẳng cấu của E_1 ; tương tự, tồn tại một mở rộng $L_2 : L_1$ sao cho L_2 chứa ảnh đẳng cấu của E_2 . Cứ như vậy, ta tìm được mở rộng $\Omega : L$ sao cho Ω chứa toàn bộ các ảnh đẳng cấu của mọi E_i .

3.5 Trường đóng đại số

Mệnh đề 3.5.1. Cho F là một trường. Khi đó, các phát biểu sau là tương đương:

- (i) Mọi đa thức $f(X) \in F[X]$ khác hằng đều chẻ trên F .
- (ii) Mọi đa thức $f(X) \in F[X]$ khác hằng có ít nhất một nghiệm trong F .
- (iii) Các đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ có bậc 1.
- (iv) Mọi mở rộng bậc hữu hạn của F chính là F .

Chứng minh. Dễ dàng kiểm tra được (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii).

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Giả sử K là mở rộng bậc hữu hạn của F , theo Định lý 3.3.2 suy ra K là mở rộng đại số của F . Lấy $u \in K$ bất kỳ và gọi $p(X)$ là đa thức tối thiểu của u trên F , theo giả thuyết $p(X)$ bậc 1 nên $u \in F$, do đó $K = F$.

¹Ở đây ta cố tình xây dựng φ_2 là một $\varphi_1 F(\alpha_1)$ -đồng cấu, do đó $\varphi_2|_{\varphi_1 F(\alpha_1)} = \varphi_1$

²Ở đây, ta có sử dụng tính chất bảo toàn số chiều của ánh xạ tuyến tính

(iv) $\Rightarrow$ (i) Gọi $f(X) \in F[X]$ là đa thức bất kì trên F và giả sử K là trường phân rã của $p(X)$ trên F . Khi đó, theo Nhận xét 3.4.3 dễ dàng thấy được $f(X)$ chẻ trên $K = F(u_1, u_2, \dots, u_n) = F$. $\square$

Định nghĩa 3.5.2.

- a) Trường F được gọi là trường đóng đại số nếu nó thỏa các điều kiện tương đương của Mệnh đề 3.5.1.
- b) Trường K được gọi là bao đóng đại số của F nếu K là trường đóng đại số và là mở rộng đại số của F .

Mệnh đề 3.5.3. Cho K là một mở rộng trường của F . Khi đó, K là trường đóng đại số nếu K là mở rộng đại số của F và mọi đa thức $f(X) \in F[X]$ chẻ trên K .

Chứng minh. Giả sử $f(X) \in K[X]$ là đa thức khác hằng, ta cần chỉ ra f có một nghiệm thuộc K . Thật vậy, theo Định lý 3.4.4 tồn tại trường K' là mở rộng trường của K làm cho f có nghiệm, giả sử nghiệm đó là $\alpha \in K'$. Đặt $f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$, ta xét tháp các trường sau:

$$F \subset F(a_0, a_1, \dots, a_n) \subset F(a_0, a_1, \dots, a_n, \alpha).$$

Theo giả thuyết ta có a_i đại số trên F và rõ ràng α đại số trên $F(a_0, a_1, \dots, a_n)$, theo Định lý 3.3.4 suy ra $F(a_0, a_1, \dots, a_n)$ là mở rộng bậc hữu hạn của F , điều này dẫn đến $F(a_0, a_1, \dots, a_n)$ là mở rộng đại số của F theo Định lý 3.3.2. Do đó, ta có α đại số trên F , gọi $p(X) \in F[X]$ là đa thức tối thiểu của α trên F , theo giả thuyết suy ra $p(X)$ chẻ trên K , hay nói cách khác $\alpha \in K$. $\square$

Định lý 3.5.4. Luôn tồn tại bao đóng đại số của một trường F bất kì.

Chứng minh của Emil Artin. Xét vành đa thức $F[\dots, x_f, \dots]$ trong đó mỗi biến x_f được gán nhãn bởi đa thức đơn khởi $f \in F[X]$. Gọi I là ideal sinh bởi tất cả các đa thức $f(x_f) \in F[\dots, x_f, \dots]$, nếu $1 \in I$ thì tồn tại $g_1, \dots, g_n \in F[\dots, x_f, \dots]$ sao cho

$$g_1 f_1(x_{f_1}) + \dots + g_n f_n(x_{f_n}) = 1,$$

với $f_i \in F[X]$ là đa thức đơn khởi. Theo Định lý 3.4.4, tồn tại trường E chứa nghiệm α_i của f_i với mọi $i \in \{1, \dots, n\}$. Xét F -đồng cấu $F[\dots, x_f, \dots] \rightarrow E$ xác định bởi

$$\begin{cases} x_{f_i} \mapsto \alpha_i \\ x_f \mapsto 0 \text{ với } f \notin \{f_1, \dots, f_n\}. \end{cases}$$

Từ đây suy ra $0 = 1$ (Vô lí). Do đó I là một ideal thật sự của $F[\dots, x_f, \dots]$, theo bổ đề Zorn, tồn tại ideal tối đại M của $F[\dots, x_f, \dots]$ chứa I . Khi đó, $E_1 = F[\dots, x_f, \dots]/M$ là một trường chứa (bản sao của) F mà mọi đa thức khác hằng $f \in F[X]$ đều có một nghiệm. Lập luận quá trình trên khi thay F bởi E_1 , ta có mở rộng E_2 của E_1 . Tiếp tục như vậy ta có một chuỗi các mở rộng trường $F \subset E_0 \subset E_1 \subset \dots$ và đặt $E = \cup E_i$. Khi đó, E là trường đóng đại số vì với mọi $f \in E[X]$ thì tồn tại i sao cho $f \in E_i$ và f sẽ có nghiệm trong E_{i+1} . Gọi K là tập các phần tử của E đại số trên F , theo Định lý 3.3.2, Định lý 3.3.4 và Hệ quả 3.3.7, trường K là bao đóng đại số của F . $\square$

[dự là trình bày thêm hai cách của Jacobson và Grothendieck]

Mệnh đề 3.5.5. Cho K là một mở rộng đại số của F , E là một trường đóng đại số và $\sigma: F \rightarrow E$ là một đơn cấu. Khi đó, tồn tại đơn cấu $\tau: K \rightarrow E$ là mở rộng của σ . Hơn nữa, nếu K là bao đóng đại số của F và E là mở rộng đại số của $\sigma(F)$ thì τ là đẳng cấu.

Chứng minh. Gọi S là tập tất cả các cặp (L, δ) , trong đó $F \subset L \subset K$ và đơn cấu $\delta: L \rightarrow E$ là một mở rộng của σ . Ta xét quan hệ $\preceq$ trên S như sau:

$$(L, \delta) \preceq (L_1, \delta_1) \Leftrightarrow L \subset L_1 \text{ và } \delta_1|_L = \delta.$$

$S \neq \emptyset$ vì $(F, \sigma) \in S$. Dễ dàng kiểm tra được $\preceq$ là một quan hệ thứ tự trên S . Giả sử $\{(L_i, \delta_i)\}$ là một dây chuyền nào đó trong S . Đặt $L = \bigcup_i L_i$ và δ thỏa mãn $\delta|_{L_i} = \delta_i$ với mọi i . Khi đó, L là một chặn trên của dây chuyền $\{(L_i, \delta_i)\}$. Theo Bổ đề Zorn, tồn tại một phần tử tối đại (L_0, τ) . Ta sẽ chứng minh $L_0 = K$, thật vậy, giả sử tồn tại $u \in K \setminus L_0$. Rõ ràng L_0 là mở rộng đại số của F nên ta gọi $p(X)$ là đa thức tối thiểu của u trên L_0 và v là một nghiệm của $\tau p(X) \in \tau(L_0)[x]$ trên E . Xét đẳng cấu $\alpha: L_0 \rightarrow \tau(L_0) \subset E$ xác định bởi $\alpha = \tau$, theo Hệ quả 3.2.7, α được mở rộng thành đẳng cấu $\beta: L_0(u) \rightarrow \tau(L_0)(v) \subset E$, do đó β cũng là mở rộng của τ . Xét phép nhúng $\iota: \tau(L_0)(v) \rightarrow E$, khi đó $\theta = \iota\beta: L_0 \rightarrow E$ là một đơn cấu và cũng là mở rộng của τ . Để dàng kiểm tra được $(L_0, \tau) \preceq (L_0(u), \theta)$ nhưng $L_0 \neq L_0(u)$, điều này mâu thuẫn với tính tối đại của (L_0, τ) . Như vậy, $L_0 = K$.

Nếu K là bao đóng đại số của F thì $\tau(K) \subset E$ là trường đóng đại số. Mặt khác, E là mở rộng đại số của $\sigma(F)$ nên nó cũng là mở rộng đại số của $\tau(K)$, nhưng do $\tau(K)$ đóng đại số nên theo định nghĩa $E = \tau(K)$, do đó τ là đẳng cấu. $\square$

Hệ quả 3.5.6. Hai bao đóng đại số của cùng một trường F thì F -đẳng cấu.

Chứng minh. Giả sử K và E là bao đóng đại số của F và $\text{id}: F \rightarrow E$ là một đơn cấu. Dễ dàng thấy được E là mở rộng đại số của $\text{id}(F) = F$, do đó tồn tại F -đẳng cấu $\tau: K \rightarrow E$ theo Mệnh đề 3.5.5. $\square$

3.6 Mở rộng tách được

Cho F là một trường và $f(X) \in F[X]$. Cho $u \in F$ là một nghiệm của f , u được gọi là nghiệm bội m nếu $(X - u)^m$ là ước của $f(X)$ nhưng $(X - u)^{m+1}$ không là ước của $f(X)$. Nếu $m = 1$ thì u còn được gọi là nghiệm đơn và nếu $m = 2$ thì u còn được gọi là nghiệm kép.

Định nghĩa 3.6.1. Cho K là mở rộng đại số của F , $f(X) \in F[X]$ là đa thức bậc n và $u \in K$

- (i) Ta nói $f(X)$ là tách được nếu f có n nghiệm phân biệt trong trường phân rã của nó.
- (ii) Phần tử u được gọi là tách được trên F nếu đa thức tối thiểu của nó tách được trên F .
- (iii) K được gọi là mở rộng tách được của F nếu mọi phần tử của K đều tách được trên F .

Định nghĩa 3.6.2. Cho $f(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ là một đa thức trên trường F . Khi đó, đa thức $f'(X) = a_1 + 2a_2X + \dots + na_nX^{n-1}$ được gọi là một đạo hàm hình thức của $f(X)$.

Nhận xét 3.6.3. Cho $f(X), g(X)$ là hai đa thức trên trường F . Khi đó, tổng và tích của nó có tính chất như sau:

- a) $(f + g)'(X) = f'(X) + g'(X)$,
- b) $(fg)'(X) = f'(X)g(X) + f(X)g'(X)$.

Mệnh đề 3.6.4. Cho K là một mở rộng trường bất kì của F và $p(X), q(X) \in F[X]$. Khi đó, $p(X)$ và $q(X)$ nguyên tố cùng nhau trong $F[X]$ khi và chỉ khi $p(X)$ và $q(X)$ nguyên tố cùng nhau trong $K[X]$.

Chứng minh. Giả sử $p(X), q(X)$ nguyên tố cùng nhau trong $F[X]$, theo Định lý Bezout tồn tại $a(X), b(X) \in F[X]$ sao cho $a(X)p(X) + b(X)q(X) = 1$. Điều này cũng xảy ra trong $K[X]$ nên $p(X), q(X)$ nguyên tố cùng nhau trong $K[X]$.

Ngược lại, giả sử $p(X), q(X)$ nguyên tố cùng nhau trong $K[X]$, đặt $d(X)$ là ước chung lớn nhất của $p(X), q(X)$ trong $F[X]$. Khi đó $d(X)$ cũng là ước chung lớn nhất của $p(X), q(X)$ trong $K[X]$, theo giả thuyết suy ra $d(X) | 1$ và do đó $p(X), q(X)$ nguyên tố cùng nhau trong $F[X]$. $\square$

Định lý 3.6.5. Cho K là một mở rộng trường của F . Khi đó, $u \in K$ là nghiệm bội của f khi và chỉ khi u là một nghiệm chung của f và f' .

Hệ quả 3.6.6. Cho F là một trường. Đa thức $f(X) \in F[X]$ là tách được nếu và chỉ nếu f và f' nguyên tố cùng nhau trong $F[X]$.

Chứng minh. Giả sử $f(X) \in F[X]$ tách được. Gọi K là trường phân rã của $f(X)f'(X)$ trên F và $d(X)$ là ước chung lớn nhất của $f(X)$ và $f'(X)$ trên K . Nếu $\deg(d(X)) \geq 1$ thì $d(X)$ có một nghiệm u , rõ ràng u là nghiệm chung của f và f' , theo Định lý 3.6.5 u là một nghiệm bội của f , điều này mâu thuẫn với tính tách được của f . Do đó $\deg(d(X)) = 0$, suy ra f và f' nguyên tố cùng nhau trong $K[X]$, điều này tương đương với f và f' nguyên tố cùng nhau trong $F[X]$.

Ngược lại, giả sử f và f' nguyên tố cùng nhau trong $F[X]$, suy ra f và f' nguyên tố cùng nhau trong $K[X]$. Gọi K là trường phân rã của $f(X)f'(X)$ trên F . Giả sử f không tách được, khi đó f có một nghiệm kép u , từ Định lý 3.6.5 suy ra u là nghiệm chung của f và f' , hay nói cách khác $X - u$ là ước chung của f và f' trong $K[X]$ (mâu thuẫn). Do đó, f tách được. $\square$

Mệnh đề 3.6.7. Cho $p(X)$ là đa thức bất khả quy trên F . Khi đó,

(i) Nếu $\text{char}(F) = 0$ thì $p(X)$ tách được.

(ii) Nếu $\text{char}(F) = p$ thì $p(X)$ không tách được nếu và chỉ nếu nó có dạng $p(X) = p_1(X^p) = a_0 + a_1X^p + \dots + a_nX^{np}$ với $p_1(X) = a_0 + X + a_1X + \dots + a_nX^n \in F[X]$ nào đó.

Chứng minh.

(i) Giả sử $p(X)$ có bậc n , suy ra $p'(X)$ có bậc là $n - 1$. Do tính bất khả quy của $p(X)$ nên $p(X)$ và $p'(X)$ nguyên tố cùng nhau, theo Hệ quả 3.6.6 suy ra $p(X)$ tách được.

(ii) Giả sử $p(X) = a_0 + a_1X^p + \dots + a_nX^{np}$ không tách được. Nếu $p'(X) \neq 0$ thì $p(X)$ và $p'(X)$ nguyên tố cùng nhau và do đó $p(X)$ là tách được (mâu thuẫn). Vậy $p'(X) = a_1 + 2a_2X + \dots + na_nX^{n-1} = 0$, suy ra $ia_i = 0$ với mọi $i \in \{1, 2, \dots, n\}$. Do đó, hoặc $p | i$ hoặc $a_i = 0$. Do đó, $p(X)$ có dạng $p(X) = a_0 + a_1X^p + \dots + a_nX^{np}$.

Ngược lại nếu $p(X)$ có dạng $p(X) = a_0 + a_1X^p + \dots + a_nX^{np}$ thì $p'(X) = 0$, điều này dẫn đến $\gcd(p(X), p'(X)) = p(X) \neq 1$, do đó theo Hệ quả 3.6.6 suy ra $p(X)$ không tách được. $\square$

Định lý 3.6.8. Cho một tháp các trường $F \subset K \subset E$. Khi đó, nếu E là mở rộng tách được của F thì E là mở rộng tách được của K và K là mở rộng tách được của F .

Chứng minh. Lấy $u \in K$ bất kì, suy ra u tách được trên F vì $K \subset E$ và E là mở rộng tách được của F . Với mọi $u \in E$, gọi $p(X) \in K[X]$ là đa thức tối thiểu của u trên K và $q(X) \in F[X]$ là đa thức tối thiểu của u trên F . Rõ ràng $p(X) | q(X)$, mà $q(X)$ tách được trên F nên $p(X)$ cũng tách được trên $F \subset K$, suy ra E là mở rộng tách được của K . $\square$

Định lí 3.6.9 (Định lí về phần tử nguyên thủy). Cho K là một mở rộng hữu hạn sinh và tách được của F . Khi đó, K là mở rộng đơn của F .

Chứng minh. Theo giả thuyết $K = F(u_1, \dots, u_n)$ là mở rộng tách được của F . Để chỉ ra K là mở rộng đơn của F , ta chỉ cần chứng minh cho trường hợp $n = 2$ là đủ. Giả sử $K = F(u, v)$ là mở rộng tách được của F . Ta cần chứng minh K là mở rộng đơn của F .

Trường hợp 1. F là một trường hữu hạn, suy ra K cũng là trường hữu hạn, do đó $\text{char}(K) = p$ với p là số nguyên tố. Khi đó, theo Định lí 2.1.5, cấp của K là p^n với $n = [K : \mathbb{Z}_p]$ và K là trường phân rã của đa thức $X^{p^n} - X$ trên $\mathbb{Z}_p$. Mặt khác, do K là trường hữu hạn nên $K^* = K \setminus \{0\}$ cùng với phép nhân là một nhóm cyclic theo Hệ quả 2.1.6, giả sử nó được sinh bởi $w \in K^*$. Như vậy, dễ dàng thấy được rằng $K = F(w)$.

Trường hợp 2. F là một trường vô hạn. Gọi $p(X), q(X)$ lần lượt là đa thức tối thiểu của u, v trên F . Giả sử $u = u_1, u_2, \dots, u_n$ là các nghiệm phân biệt của $p(X)$ và $v = v_1, v_2, \dots, v_m$ là các nghiệm phân biệt của $q(X)$ trên trường L là trường phân rã của $p(X)q(X)$. Do F là trường vô hạn nên tồn tại $c \in F$ sao cho

$$c \neq \frac{u_i - u}{v - v_j} \text{ với mọi } 1 \leq i \leq n, 1 < j \leq m. \quad (*)$$

Đặt $w = u + cv \in F(u, v)$, ta sẽ chứng minh $K = F(w)$. Chọn $f(X) = p(w - cX) \in F(w)[X]$, dễ dàng thấy được v là một nghiệm của $f(X)$. Hơn nữa, v còn là nghiệm chung duy nhất của $f(X)$ và $q(X)$. Thật vậy, nếu v_j với $j \neq 1$ cũng là nghiệm của $f(X)$ thì tồn tại u_i sao cho

$$u_i = w - cv_j \Leftrightarrow u_i = u + cv - cv_j \Leftrightarrow c = \frac{u_i - u}{v - v_j}.$$

Điều này mâu thuẫn với (*). Gọi $r(X)$ là đa thức tối thiểu của v trong $F(w)[X]$, suy ra $r(X)$ có dạng $r(X) = a(X - v)(X - v_{j_2}) \dots (X - v_{j_{k_0}})$ với $a \in F(w)$, $v_{j_k} \in \{v_2, \dots, v_m\}$ và $k \in \{1, \dots, k_0\}$. Mặt khác, ta có $r(X) \mid f(X)$ nên $f(X)$ phải chứa mọi nghiệm của $r(X)$, theo lập luận ở trên $f(v_{j_k}) \neq 0$ với mọi $k \in \{1, \dots, k_0\}$, do đó $r(X)$ phải có dạng $r(X) = a(X - v) \in F(w)[X]$, suy ra $X - v \in F(w)[X]$ hay $v \in F(w)$. Từ đây ta cũng suy ra $u = w - cv \in F(w)$, do đó $F(u, v) \subset F(w)$. Mặt khác, $w \in F(u, v)$ nên $F(w) \subset F(u, v)$. Như vậy, $K = F(u, v) = F(w)$. $\square$

Bây giờ ta nghiên cứu cấu trúc của một đa thức bất khả quy không tách được trên trường F có đặc số p . Theo Mệnh đề 3.6.7, nếu $p(X)$ bất khả quy và không tách được thì tồn tại $p_1(X) \in F[X]$ sao cho $p(X) = p_1(X^p)$, nếu $p_1(X)$ không tách được thì sẽ tồn tại $p_2(X) \in F[X]$ sao cho $p_1(X) = p_2(X^p)$... Quá trình này sẽ dừng lại sau hữu hạn bước vì p có bậc hữu hạn, khi đó, ta tìm được duy nhất một đa thức $p_k(X) \in F[X]$ có đạo hàm hình thức khác 0 (tức $p_k(X)$ tách được) thỏa mãn $p(X) = p_k(X^{p^k})$. Rõ ràng $p_k(X)$ là bất khả quy vì mỗi nhân tử bất khả quy của $p_k(X)$ (sau khi thay x bởi X^{p^k}) sẽ ngay lập tức trở thành nhân tử của $p(X)$.

Mệnh đề 3.6.10. Cho F là một trường có đặc số p và $p(X) \in F[X]$ bất khả quy. Khi đó, tồn tại duy nhất số nguyên không âm $k \geq 0$ và đa thức bất khả quy tách được $p_{\text{sep}}(X) \in F[X]$ sao cho $p(X) = p_{\text{sep}}(X^{p^k})$.

Định nghĩa 3.6.11. Cho F là một trường có đặc số p và $p(X) \in F[X]$ bất khả quy. Bậc của đa thức $p_{\text{sep}}(X)$ được gọi là bậc tách được của $p(X)$, kí hiệu là $\deg_s p(X)$. Số nguyên p^k được gọi là bậc không tách được của $p(X)$, kí hiệu là $\deg_i p(X)$.

Nhận xét 3.6.12. Dễ dàng kiểm tra được đa thức bất khả quy $p(X)$ là tách được khi và chỉ khi $\deg_i p(X) = 1$. Hơn nữa, $\deg p(X) = \deg_s p(X) \deg_i p(X)$.

3.7 Mở rộng chuẩn tắc

Định nghĩa 3.7.1. Cho K là một mở rộng đại số của F . Khi đó, K được gọi là một mở rộng chuẩn tắc của F (hoặc chuẩn tắc trên F) nếu mọi đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ có một nghiệm trên K thì nó chẻ trên K .

Nhận xét 3.7.2. Trường K là một mở rộng chuẩn tắc của F nếu và chỉ nếu đa thức tối tiểu của mọi phần tử của K chẻ trên K .

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Hiển nhiên :), ta chứng minh chiều ($\Leftarrow$), nếu $p(X) \in F[X]$ là đa thức bất khả quy bất kì nhận $\alpha \in K$ làm nghiệm thì nó chính là đa thức tối tiểu của α , suy ra $p(X)$ phải chẻ, theo định nghĩa $K : F$ là mở rộng chuẩn tắc. $\square$

Mệnh đề 3.7.3. Cho $K : F$ là mở rộng đại số. $K : F$ là mở rộng chuẩn tắc và tách được khi và chỉ khi mọi đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ bất khả quy có một nghiệm trong K thì có $\deg p$ nghiệm trong K .

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Giả sử $K : F$ là mở rộng chuẩn tắc và tách được, theo định nghĩa, mọi đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ có một nghiệm trong K thì nó chẻ trên K , do đó nó có $\deg p$ nghiệm trong K (vì p lúc này là đa thức tối tiểu của một phần tử).

($\Leftarrow$) Giả sử mọi đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ có một nghiệm trong K thì có $\deg p$ nghiệm trong K . Khi đó, mọi đa thức bất khả quy $p(X) \in F[X]$ có một nghiệm trong K thì nó chẻ trên K , do đó $K : F$ là mở rộng chuẩn tắc. Mặt khác, với mọi $\alpha \in F$ thì đa thức tối tiểu của α là một đa thức bất khả quy $p(X)$ nhận α làm nghiệm nên nó tách được trên K theo giả thuyết, do đó $K : F$ là mở rộng tách được. $\square$

Từ định nghĩa mở rộng chuẩn tắc, ta thấy rằng việc kiểm tra một mở rộng đại số là một mở rộng chuẩn tắc là khó khăn. Bất ngờ thay, ta có định lý thú vị sau:


Định lý 3.7.4. Giả sử K là một mở rộng trường của F . Khi đó, K là mở rộng chuẩn tắc bậc hữu hạn của F nếu và chỉ nếu K là trường phân rã của $f(X)$ trên F .

Chứng minh. Giả sử K là mở rộng chuẩn tắc bậc hữu hạn của F , theo Định lý 3.3.2 và Hệ quả 3.3.5 suy ra $K = F(u_1, \dots, u_n)$ với u_i đại số trên F . Gọi $p_i(X)$ là đa thức tối tiểu của u_i và đặt $f(X) = p_1(X)p_2(X) \dots p_n(X)$. Theo giả thiết, $p_i(X)$ chẻ trên K với mọi i nên $f(X)$ cũng chẻ trên K , tức là K chứa mọi nghiệm của $f(X)$, suy ra $E_f \subset K$ với E_f là trường phân rã của f trên F . Mặt khác, $u_i \in K$ là đều nghiệm của $f(X)$ với mọi i nên $u_i \in E_f$, theo định nghĩa $K = F(u_1, \dots, u_n) \subset E_f$. Như vậy, $K = E_f$ hay K là trường phân rã của f trên F .

Ngược lại, giả sử K là trường phân rã của f trên F , suy ra K là mở rộng đại số của F . Lấy $\alpha \in K$ bất kì, gọi $p(X)$ là đa thức tối tiểu của α và E_p là trường phân rã của p trên K . Ta cần chứng minh $p(X)$ chẻ trên K , hay nói cách khác là chứng minh K chứa mọi nghiệm của $p(X)$ (Xem sơ đồ 3.1). Thật vậy, gọi β là một nghiệm bất kì của $p(X)$ trên E_p , rõ ràng α, β đại số trên F nên từ Hệ quả 3.2.7 suy ra tồn tại đẳng cấu $\sigma : F(\alpha) \rightarrow F(\beta)$ thỏa mãn $\sigma(c) = c$ với mọi $c \in F$. Mặt khác, $K = K(\alpha)$ và $K(\beta)$ lần lượt là trường phân rã của f trên $F(\alpha)$ và $F(\beta)$, theo Định lý 3.4.6, σ được mở rộng thành đẳng cấu $\sigma' : K \rightarrow K(\beta)$, do đó $[K : F] = [K(\beta) : F]$, điều này dẫn đến $[K(\beta) : K] = 1$, suy ra $K(\beta) = K$ hay $\beta \in K$ theo Mệnh đề 3.1.8. Đây là điều phải chứng minh. $\square$

Hệ quả 3.7.5. Cho một tháp các trường $F \subset K \subset E$. Khi đó, nếu E là mở rộng chuẩn tắc bậc hữu hạn của F thì E là mở rộng chuẩn tắc của K .

Chứng minh. Chú ý rằng nếu E là trường phân rã của f trên F thì E cũng là trường phân rã của f trên K . Theo Định lý 3.7.4 ta suy ra E là mở rộng chuẩn tắc của K . $\square$



Hình 3.1 Sơ đồ chỉ ra $K(\alpha) = K$ đẳng cấu với $K(\beta)$

Định lý 3.7.6. Cho K là một mở rộng bậc hữu hạn của F . Khi đó, tồn tại một mở rộng E của K thỏa mãn:

- (i) E là mở rộng chuẩn tắc bậc hữu hạn của F sao cho $K \subset E$.
- (ii) Nếu có một tháp các trường $F \subset K \subset L \subset E$ và L là mở rộng chuẩn tắc của F thì $L = E$.

Chứng minh. (i) Do K là mở rộng bậc hữu hạn của F nên theo Hệ quả 3.3.5 suy ra $K = F(u_1, \dots, u_n)$ với u_i đại số trên F . Gọi $p_i(X)$ là đa thức tối tiểu của u_i trên F và đặt $p(X) = p_1(X) \dots p_n(X)$. Theo Định lý 3.4.4, tồn tại trường phân rã E của $p(X)$ trên F , theo Định lý 3.7.4 suy ra E là mở rộng chuẩn tắc bậc hữu hạn của F . Mặt khác, do E chứa F và u_i nên $K \subset E$.

(ii) Do $F \subset K = F(u_1, \dots, u_n) \subset L$ nên $u_i \in L$ với mọi i . Mặt khác, do L là mở rộng chuẩn tắc của F nên đa thức tối tiểu của u_i là $p_i(X)$ đều chẻ trên L , hay nói cách khác L chứa mọi nghiệm của $p(X)$. Điều này dẫn đến $E \subset L$, suy ra $E = L$. $\square$

Định nghĩa 3.7.7. Cho K là mở rộng bậc hữu hạn của F . Trường E thỏa mãn các điều kiện ở Định lý 3.7.6 được gọi là bao đóng chuẩn tắc của K trên F .

CHƯƠNG 4 GALOIS

4.1 Nhóm các tự đẳng cấu của trường

Mệnh đề 4.1.1. Cho $E : F$ là mở rộng trường. Tập các F -tự đẳng cấu của E lập thành một nhóm cùng với phép hợp thành ánh xạ, ta kí hiệu nhóm này là $\text{Aut}(E : F)$.

Mệnh đề 4.1.2. Cho E là trường phân rã của một đa thức tách được $f \in F[X]$; khi đó $|\text{Aut}(E : F)| = [E : F]$.

Chứng minh. Do f là tách được, f có $\deg f$ nghiệm phân biệt trong E . Khi đó, Mệnh đề 3.4.8 chỉ ra rằng số lượng F -đồng cấu $E \rightarrow E$ là $[E : F]$. Mặt khác, E là mở rộng hữu hạn của F nên toàn bộ các đồng cấu trường chính là đẳng cấu. $\square$

Cho G là một nhóm các tự đẳng cấu của một trường E nào đó, đặt

$$E^G = \text{Inv}(G) = \{\alpha \in E \mid \sigma\alpha = \alpha, \forall \sigma \in G\}.$$

Mệnh đề 4.1.3. Cho E là một trường và G là nhóm các tự đẳng cấu của E . Khi đó, E^G được định nghĩa như trên là trường con của E .

Chứng minh. Thật vậy, với mọi $x, y \in E^G$ và $\sigma \in G$, ta có $x - y = \sigma(x) - \sigma(y) = \sigma(x - y)$ nên $x - y \in E^G$; nếu $y \neq 0$ thì $xy^{-1} = \sigma(x)\sigma(y)^{-1} = \sigma(xy^{-1})$ nên $xy^{-1} \in E^G$. $\square$

Định lí 4.1.4 (Artin). Cho G là nhóm hữu hạn các tự đẳng cấu của trường E . Khi đó

$$[E : E^G] \leq [G : 1] \quad ^1$$

Chứng minh. Ta có $G = \{\sigma_1 = \text{id}, \dots, \sigma_m\}$. Ta cần chỉ ra mọi tập $\{a_1, \dots, a_n\}$ bao gồm các phần tử của E với $n > m$ đều phụ thuộc tuyến tính trên E^G . Xét hệ phương trình tuyến tính thuần nhất:

$$\begin{cases} \sigma_1(a_1)X_1 + \dots + \sigma_1(a_n)X_n = 0 \\ \dots \\ \sigma_m(a_1)X_1 + \dots + \sigma_m(a_n)X_n = 0 \end{cases}$$

Do hệ có m phương trình nhưng $n > m$ ẩn nên tồn tại nghiệm không tầm thường trong E . Ta chọn nghiệm $(c_1, \dots, c_n)$ là nghiệm không tầm thường có ít phần tử khác 0 nhất. Lưu ý rằng ta có thể đổi chỗ các cột biến X_i của hệ, có nghĩa là ta có thể đổi chỗ các c_i trong $(c_1, \dots, c_n)$, vì vậy ta có thể giả sử $c_1 \neq 0$. Suy ra, $(1, c'_2, \dots, c'_n)$ cũng là một nghiệm có ít phần tử khác không nhất của hệ với $c'_i = c_i c_1^{-1}$, $2 \leq i \leq n$; dễ dàng thấy rằng $1 \in E^G$.

Bây giờ, ta xét phương trình đầu tiên của hệ và chỉ ra nó là phụ thuộc tuyến tính

$$a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n = 0$$

Nếu $c'_i \notin E^G$ thì tồn tại $\sigma_k(c'_i) \neq c'_i$ với $1 < k \leq m$ và $1 < i \leq n$. Ta tác động σ_k vào tất cả các phương trình của hệ, mà $\{\sigma_k \sigma_1, \dots, \sigma_k \sigma_m\} = \{\sigma_1, \dots, \sigma_m\}$ (tức là việc ta tác

¹Thật ra nó chỉ là $|G|$ hoặc $\#G$.

động σ_k vào hệ chỉ làm cho các phương trình đổi vị trí cho nhau theo hàng ngang) nên $(1, \sigma_k(c'_2), \dots, \sigma_k(c'_i), \dots)$ cũng là một nghiệm của của hệ. Ta lấy nghiệm này trừ đi nghiệm cũ thì ta sẽ thu được một nghiệm khác của hệ $(0, \dots, \sigma_k(c'_i) - c'_i, \dots)$, đây là nghiệm không tầm thường do $\sigma_k(c'_i) - c'_i \neq 0$ và có ít phần tử khác không hơn $(1, \dots, c'_n)$ (mâu thuẫn) ($\sigma_k(0) = 0$). Do đó, $c'_i \in E^G$ với mọi i . Như vậy, ta đã tìm được một nghiệm không tầm thường trong E^G làm cho $a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n = 0$, đây là điều phải chứng minh. $\square$

Hệ quả 4.1.5. Cho G là một nhóm hữu hạn các tự đẳng cấu của trường E ; khi đó

$$G = \text{Aut}(E : E^G)$$

Chứng minh. Ta có $G \subset \text{Aut}(E : E^G)$; khi đó, từ 3.4.10 và 4.1.4 suy ra $[E : E^G]$ hữu hạn và

$$[E : E^G] \leq [G : 1] \leq |\text{Aut}(E : E^G)| \leq [E : E^G]$$

Do đó, $[G : 1] = |\text{Aut}(E : E^G)|$ và do đó $G = \text{Aut}(E : E^G)$. $\square$

Định nghĩa 4.1.6. Một mở rộng $E : F$ được gọi là Galois nếu nó hữu hạn, chuẩn tắc và tách được. Trong trường hợp này, $\text{Aut}(E : F)$ được gọi là nhóm Galois của E trên F và được kí hiệu là $\text{Gal}(E : F)$.

Định lý 4.1.7. Cho $E : F$ là một mở rộng trường. Khi đó, các mệnh đề sau là tương đương:

- (i) E là mở rộng Galois trên F .
- (ii) E là trường phân rã của $f(X) \in F[X]$ tách được.
- (iii) E hữu hạn trên F và $F = E^{\text{Aut}(E:F)}$
- (iv) $F = E^G$ với G là nhóm hữu hạn các tự đẳng cấu của E .

Chứng minh.

(i) $\Rightarrow$ (ii) Do $E : F$ là mở rộng hữu hạn nên tồn tại $u_i \in E$ đại số trên F sao cho $E = F(u_1, \dots, u_n)$, gọi f_i là đa thức tối thiểu của u_i . Nếu v là nghiệm chung của f_k và f_l , do f_k và f_l là bất khả quy nên nó là những đa thức tối thiểu của v , do đó $f_k \mid f_l$ và $f_l \mid f_k$ và do đó $f_l = f_k$ vì f_l, f_k đơn khởi. Đặt $f = \prod_i f_i$, khi đó dễ dàng thấy được f là đa thức tách được trên F và E là trường phân rã của f .

(ii) $\Rightarrow$ (iii) Rõ ràng E hữu hạn trên F và $F \subset E^{\text{Aut}(E:F)} \subset E$. Chú ý rằng E cũng là trường phân rã của $f(X)$ trên $E^{\text{Aut}(E:F)}$ nên theo Mệnh đề 4.1.2 ta có $\text{Aut}(E : F)$ là nhóm hữu hạn và

$$|\text{Aut}(E : E^{\text{Aut}(E:F)})| = [E : E^{\text{Aut}(E:F)}] \leq [E : F] = |\text{Aut}(E : F)|$$

Mặt khác, theo Hệ quả 4.1.5 suy ra $\text{Aut}(E : F) = \text{Aut}(E : E^{\text{Aut}(E:F)})$, do đó $[E : E^{\text{Aut}(E:F)}] = [E : F]$, lại có $[E : F] = [E : E^{\text{Aut}(E:F)}][E^{\text{Aut}(E:F)} : F]$ nên $[E^{\text{Aut}(E:F)} : F] = 1$ hay $E^{\text{Aut}(E:F)} = F$.

(iii) $\Rightarrow$ (iv) Theo Hệ quả 3.4.10, $|\text{Aut}(E : F)| \leq [E : F]$ ² nên $\text{Aut}(E : F)$ là một nhóm hữu hạn.

(iv) $\Rightarrow$ (i) Theo Định lý 4.1.4 ta có $[E : F] = [E : E^G] \leq [G : 1]$ nên $E : F$ là mở rộng hữu hạn và do đó là mở rộng đại số. Cho $\alpha \in E$ và gọi $f(X) \in F[X]$ là đa thức tối thiểu của α ; ta chỉ ra f là tách được trên E . Thật vậy, Đặt $A = \{\sigma\alpha \mid \sigma \in G\} = \{\alpha_1 = \alpha, \dots, \alpha_m\}$ và đặt

$$g(X) = \prod_{i=1}^m (X - \alpha_i) = X^m + a_1X^{m-1} + \dots + a_m.$$

²Chú ý rằng mỗi F -đồng cấu $E \rightarrow E$ là một F -đẳng cấu vì do E là trường hữu hạn

Vì $\sigma \in G$ chỉ hoán vị các nghiệm α_i nên $\sigma a_i = a_i$ với mọi i , điều này có nghĩa là $a_i \in F = E^G$, do đó $g(X) \in F[X]$. Vì $g(X)$ đơn khởi và nhận α làm nghiệm nên $f(X) \mid g(X)$. Mặt khác, α_i đều là nghiệm của $f(X)$ nên $g(X) \mid f(X)$ vì g chứa tất cả các nghiệm của $f(X)$. Do cả f, g đơn khởi nên $f = g$ và do đó f tách được trên E . $\square$

Hệ quả 4.1.8 (Định lí Artin). Cho G là một nhóm hữu hạn các tự đẳng cấu của trường E . Khi đó, $E : E^G$ là mở rộng Galois và $[E : E^G] = [G : 1]$.

Chứng minh. Điều này dễ dàng suy ra được từ Định lí 4.1.7, Hệ quả 4.1.5, Mệnh đề 4.1.2. $\square$

Hệ quả 4.1.9. Mọi mở rộng hữu hạn và tách được E của F đều chứa trong một mở rộng Galois.

Chứng minh. Cho $E = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ và đặt f_i là đa thức tối thiểu của α_i . Khi đó, $f = \prod_i f_i$ là một đa thức tách được trong f và trường phân rã của f là mở rộng Galois của F chứa E . $\square$

Hệ quả 4.1.10. Cho một tháp các trường $F \subset M \subset E$. Nếu $E : F$ Galois thì $E : M$ Galois.

Chứng minh. Do $E : F$ Galois nên E là trường phân rã của $f \in F[X]$ tách được, ta xem f như là đa thức của $M[X]$ và suy ra điều phải chứng minh. $\square$

Nhận xét 4.1.11. Cho $E : F$ là mở rộng Galois với $G = \text{Gal}(E : F)$ và cho $\alpha \in E$. Các phần tử $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ là quỹ đạo của α dưới tác động của G được gọi là liên hợp của α . Từ chứng minh trên ta thấy rằng đa thức tối thiểu của α là $\prod_i (X - a\alpha_i)$, tức các liên hợp của α chính là nghiệm của đa thức tối thiểu của nó trong E .

Nhận xét 4.1.12. Từ Hệ quả 4.1.9, ta chứng minh được rằng: Mọi mở rộng hữu hạn sinh bởi các phần tử tách được là mở rộng tách được. Do đó, các phần tử đại số và tách được của mở rộng $E : F$ hình thành trường con E_{sep} của E chứa F và tách được trên F . Trường E_{sep} được gọi là bao đóng tách được của F trong E . Khi $[E : F]$ hữu hạn thì ta đặt $[E : F]_{\text{sep}} = [E_{\text{sep}} : F]$ và gọi là bậc tách được của E trên F .

Một mở rộng $E : F$ được gọi là mở rộng thuần không tách (purely inseparable) nếu các phần tử tách được của E trên F chỉ có là các phần tử của F . Nếu $E : F$ là hữu hạn thì $E : E_{\text{sep}}$ là mở rộng thuần không tách.

Định nghĩa 4.1.13. Một mở rộng $E : F$ được gọi là cyclic (tương ứng Abel, giải được,...) nếu $\text{Gal}(E : F)$ là cyclic (tương ứng Abel, giải được,...).

4.2 Định lí cơ bản của lý thuyết Galois

Định nghĩa 4.2.1. Cho tháp các trường $F \subset M \subset E$. Một mở rộng con của $E : F$ chính là mở rộng $M : F$, M được gọi là trường trung gian của mở rộng $E : F$.

Định lí 4.2.2 (Định lí cơ bản của lý thuyết Galois). Cho $E : F$ là Galois với $G = \text{Gal}(E : F)$. Định nghĩa hai ánh xạ như sau:

$$\begin{aligned} * : \{M \mid F \subset M \subset E\} &\rightarrow \{H \mid H \subset G\} \\ M &\mapsto M^* = \text{Gal}(E : M) \\ \dagger : \{H \mid H \subset G\} &\rightarrow \{M \mid F \subset M \subset E\} \\ H &\mapsto H^\dagger = E^H \end{aligned}$$

Khi đó, hai ánh xạ $*$ và $\dagger$ là nghịch đảo của nhau, tức là $M^{*\dagger} = M$ và $H^{\dagger*} = H$. Hơn nữa,

- (i) $H_1 \supset H_2 \Leftrightarrow E^{H_1} \subset E^{H_2}$,
 (ii) $[H_1 : H_2] = [E^{H_2} : E^{H_1}]$,
 (iii) $\sigma H \sigma^{-1} \leftrightarrow \sigma M$, tức là ta có

$$E^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(E^H) \text{ hay } (\sigma H \sigma^{-1})^\dagger = \sigma H^\dagger,$$

$$\text{Gal}(E : \sigma M) = \sigma \text{Gal}(E : M) \sigma^{-1} \text{ hay } (\sigma M)^* = \sigma M^* \sigma^{-1},$$

- (iv) $H \triangleleft G \Leftrightarrow E^H : F$ là mở rộng chuẩn tắc. Khi đó,

$$\text{Gal}(E^H : F) \cong G/H.$$

Chứng minh. Cho $H \leq G$ bất kì, theo Hệ quả 4.1.8 ta có $\text{Gal}(E : E^H) = H$, suy ra $H^\dagger = (E^H)^* = \text{Gal}(E : E^H) = H$. Ngược lại, Cho M là trường trung gian bất kì của $E : F$ thì $E : M$ là Galois nên theo Định lý 4.1.7 ta có $M = E^{\text{Gal}(E:M)}$ và do đó $M^{\dagger} = (\text{Gal}(E : M))^\dagger = E^{\text{Gal}(E:M)} = M$.

(i) Nếu $H_1 \supset H_2$ thì rõ ràng với mọi $x \in E^{H_1}$ ta có $\sigma(x) = x$ với mọi $\sigma \in H_1$, tức là $\tau(x) = x$ với $\tau \in H_2$, do đó $x \in E^{H_2}$. Ngược lại, nếu $E^{H_1} \subset E^{H_2}$ thì với mọi $\sigma \in H_2$, ta có $\sigma(x) = x$ với mọi $x \in E^{H_2}$, do đó với mọi $x \in E^{H_1}$ thì $\sigma(x) = x$ nên $\sigma \in H_1$ và do đó $H_1 \supset H_2$.

(ii) Cho $H \leq G$. Theo Hệ quả 4.1.8 ta có $[E^{\langle 1 \rangle} : E^H] = [E : E^H] = [H : 1]$; ta đã chứng minh được (ii) trong trường hợp $H_2 = \langle 1 \rangle$, với $\langle 1 \rangle \neq H_2 \leq H_1$ bất kì ta có

$$[H_1 : 1] = [H_1 : H_2][H_2 : 1]$$

và

$$[E : E^{H_1}] = [E : E^{H_2}][E^{H_2} : E^{H_1}].$$

Do đó, $[E : E^{H_2}][E^{H_2} : E^{H_1}] = [H_1 : H_2][H_2 : 1] = [H_1 : H_2][E : E^{H_2}]$, mà $[E : E^{H_2}] \neq 0$ nên $[H_1 : H_2] = [E^{H_2} : E^{H_1}]$.

- (iii) Cho $\sigma \in G$ bất kì, với mỗi $\tau \in G$ và $\alpha \in E$, ta có

$$\tau \alpha = \alpha \Leftrightarrow \sigma \tau \sigma^{-1}(\sigma \alpha) = \sigma \alpha.$$

Do đó, ta có $\tau M = M \Leftrightarrow \sigma \tau \sigma^{-1}(\sigma M) = \sigma M$ với M là trường trung gian của $E : F$, từ đây suy ra $\text{Gal}(E : \sigma M) = \sigma \text{Gal}(E : M) \sigma^{-1}$ vì $\sigma \tau \sigma^{-1} \in \sigma \text{Gal}(E : M) \sigma^{-1} \Leftrightarrow \tau \in \text{Gal}(E : M) \Leftrightarrow \sigma \tau \sigma^{-1} \in \text{Gal}(E : \sigma M)$; Ngoài ra từ điều trên ta còn suy ra được $E^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(E^H)$ vì $\sigma \alpha \in \sigma(E^H) \Leftrightarrow \alpha \in E^H \Leftrightarrow \sigma \alpha \in E^{\sigma H \sigma^{-1}}$.

(iv) Cho $H \triangleleft G$, suy ra $\sigma H \sigma^{-1} = H$ với mọi $\sigma \in G$, do đó $\sigma E^H = E^H$ với mọi $\sigma \in G$, từ đây ta có thể định nghĩa được đồng cấu

$$\sigma \mapsto \sigma|E^H : G \rightarrow \text{Aut}(E^H : F).$$

Dễ dàng thấy rằng nhân của đồng cấu này là H . Xét $x \in (E^H)^{G/H} \Leftrightarrow \tau x = x$ với mọi $\tau \in H$ và $\sigma H(x) = x$ với mọi $\sigma \in G$, điều này tương đương với $\sigma(x) = x$ với mọi $\sigma \in G$ hay $x \in E^G = F$, do đó $(E^H)^{G/H} = F$, theo Định lý 4.1.7 suy ra $E^H : F$ là Galois nên tất nhiên là chuẩn tắc và $G/H \cong \text{Gal}(E^H : F)$.

Ngược lại, giả sử $M : F$ chuẩn tắc, do $E : F$ là mở rộng hữu hạn nên $M : F$ cũng là mở rộng hữu hạn, khi đó tồn tại α_i đại số trên F sao cho $M = F(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$. Với mỗi $\sigma \in G$, $\sigma \alpha_i$ là nghiệm của đa thức tối thiểu của α_i trên F , do tính chuẩn tắc nên nó nằm trong M . Do đó, $\sigma M = M$ nên $\sigma M^* \sigma^{-1} = (\sigma M)^* = M^*$ (dùng (iii)) và do đó $M^* \triangleleft G$. $\square$

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] H. X. Sính, *Đại số đại cương*. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2015.