

Случайные события

Событие можно назвать достоверным ($p(A) = 1$), если в результате испытания оно обязательно произойдет. Невозможное событие не произойдет никогда ($p(A) = 0$).

Операции над случайными событиями:

- $A+B$ - наступило либо A либо B ($p(A \vee B)$)
- $A*B$ - наступило и A и B
- \overline{A} - событие A не наступило

Для случайного события есть понятие относительной частоты — это отношение количества состоявшихся событий к общему числу испытаний:

$$W(A) = m/n$$

- $W(A)$ — это относительная частота события A ;
- m — число состоявшихся событий A ;
- n — общее число испытаний.

При достаточно большом количестве испытаний n величина относительной частоты W будет стремиться к конкретному числу. Оно называется статистической вероятностью и обозначается как $P(A)$:

$$P(A) = m/n$$
$$p(A) \in [0;1]$$

Совместные события - могут произойти вместе, **несовместные** - не могут.
Совместные и несовместные события

Вероятности несовместных событий можно складывать:

$$P(A+B) = P(A) + P(B)$$

В случае совместных событий формула суммы событий другая: из суммы вероятностей отдельных событий вычитается вероятность их совместного появления.

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

Независимыми события называют, когда появление одного из них не влияет на появление другого. С зависимыми - наоборот.

Вероятность одновременного появления двух независимых событий вычисляется по формуле:

$$P(A*B)=P(A)*P(B)$$

Вероятность появления двух зависимых событий:

$$P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B)$$

Если событие A может наступить только при появлении событий B_1, B_2, \dots, B_n , образующих полную группу несовместных событий, то вероятность A вычисляется по формуле:

$$P(A) = P(B_1) \cdot P(A|B_1) + P(B_2) \cdot P(A|B_2) + \dots + P(B_n) \cdot P(A|B_n)$$

Формула Байеса: чтобы определить вероятность события B при условии, что событие A уже произошло, используют формулу Байеса:

$$P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B) / P(A)$$

Комбинаторика

Число сочетаний из n элементов по k элементов в каждом (в сочетаниях порядок не важен):

$$C(kn) = n! / (k!(n-k)!)$$

Определим **число размещений** из n элементов по k элементов в каждом. При размещении порядок важен, поэтому вариантов размещения может быть больше, чем сочетаний при заданных k и n.

$$A(kn) = n! / (n-k)!$$

Число перестановок из n элементов — при перестановках важен порядок, но отличие от размещений в том, что применяются все имеющиеся n элементов:

$$P(n) = n!$$

Случайная величина

Случайная величина — та, что в результате испытания принимает только одно возможное значение. Дискретные и непрерывные.

Закон распределения вероятностей — соответствие между возможными значениями и их вероятностями.

Биномиальное распределение

$$P_n(X = k) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

где p — это вероятность наступления события A в n независимых испытаниях, а $q = 1 - p$.

Матожидание:

$$M(X) = np$$

Дисперсия:

$$D(X) = npq$$

Распределение Пуассона

Вероятность того, что событие произойдет m раз в n испытаниях:

$$P_m \approx \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \quad \text{где } \lambda = np.$$

Описательная статистика

Генеральная совокупность — это множество, которое содержит данные обо всех объектах, соответствующих определённым характеристикам. **Выборка** — это случайным образом выбранная часть генеральной совокупности.

Мат ожидание

Это - среднее значение случайной величины (распределение вероятностей стационарной случайной величины), при стремлении количества выборок/измерений к бесконечности.

Оценка мат ожидания

$$M(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Квадратичное отклонение

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

ц

Дисперсия


$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Несмещенная оценка дисперсии

$$\sigma_{\text{несмещ.}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Интерквартильное расстояние — отрезок, равный разности третьей и первой квартили.

Гистограмма



Boxplot

