



	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DMER
	MATERIAL ESPECIFICADO DE RISCO	ANO DA EMISSÃO 2014
		DATA DA REVISÃO 10/2025
		Nº REVISÃO 13
		PÁGINA 1

DMER

MATERIAL ESPECIFICADO

DE RISCO

MER

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

SUMÁRIO

CONTROLE DE REVISÕES	3
1 INTRODUÇÃO	4
2 OBJETIVO	4
3 CAMPO DE APLICAÇÃO	5
4 RESPONSABILIDADES.....	5
5 TERMO DE COMPROMISSO	5
6 DEFINIÇÕES	6
7 FLUXOGRAMA DE PROCESSO	7
8 IDENTIFICAÇÃO UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E LOCAIS DE MANIPULAÇÃO.....	8
9 APROVEITAMENTO DE MER PARA CONSUMO HUMANO	8
10 RECEBIMENTO E ACOMODAÇÃO DOS ANIMAIS NOS CURRAIS	8
11 ABATE DE EMERGÊNCIA	8
12 CONDENAÇÃO DE VÍSCERAS E CABEÇAS	9
13 RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE MER	9
14 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	10
14.1 REMOÇÃO DE EXTRAVASAMENTO CEREBRAL	10
14.2 DESLOCAMENTO DA CABEÇA.....	11
14.3 REMOÇÃO DAS TONSILAS/AMÍGDALAS	11
14.4 REMOÇÃO DOS OLHOS	12
14.5 REMOÇÃO DO ENCÉFALO (CÉREBRO)	13
14.6 SERRAGEM DE 1/2 CARCAÇA	14
14.7 REMOÇÃO DE MEDULA ESPINHAL.....	15
14.8 MONITORAMENTO DA RETIRADA DE MEDULA ESPINHAL	16
14.9 REMOÇÃO DA PORÇÃO DISTAL DO ÍLEO (INTESTINO)	17
14.10 SEGREGAÇÃO DE MER DOS SETORES DE PRODUÇÃO	18
14.11 PESAGEM E INCINERAÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS DE RISCO.....	19
14.12 MONITORAMENTO DE RECEBIMENTO DE QUARTOS	20
14.13 REMOÇÃO DE MER EM CABEÇA CONDENADA.....	21
14.14 REMOÇÃO DE MER EM CARCAÇAS DO ABATEDOURO SANITÁRIO.....	22
15 TREINAMENTOS.....	23
16 ANEXOS	23
17 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	23

ORIGINAL

CONTROLE DE REVISÕES

DATA	REVISÃO	O QUÊ	JUSTIFICATIVA
Outubro/2025	13	Atualização da nomenclatura das planilhas de autocontrole.	Melhoria do Processo.
Agosto/2025	12	Revisão do Documento.	Melhoria do Processo.
Março/ 2024	11	Revisão do Documento.	Inclusão do sugador de cérebro, da serra copo na remoção do nervo ótico e da remoção do linfonodo.

O histórico das revisões anteriores não foi registrado.

ORIGINAL

1 INTRODUÇÃO

A Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecida popularmente em todo o mundo como “doença da vaca louca”, é uma doença degenerativa crônica que afeta o sistema nervoso central de bovinos e humanos, que são caracterizadas pela presença de vacúolos microscópicos e deposição de proteína amilóide (príon) na substância cinzenta do cérebro, causando degeneração esponjosa do cérebro com sintomas neurológicos severos e fatais.

A Encefalopatia Espongiforme Bovina é um risco potencial e merecedor de grande atenção por parte das autoridades brasileiras. A propagação da doença ocorre por meio da ingestão de alimento contaminado por tecidos de bovinos com EEB, em especial farinha de carne e osso (Horn S., 2001). A retirada de proteína de mamíferos da alimentação animal, em especial as farinhas de carne e osso, é o método indicado para profilaxia da EEB (COSTA; BORGES, 2004). A alimentação dos bovinos no Brasil é essencialmente baseada em pastagens naturais ou cultivadas. Os suplementos alimentares, quando utilizados, são de natureza vegetal. Ainda assim, o Governo Brasileiro proibiu em 1996 o uso na alimentação de ruminantes de proteína in natura e de farinhas de carne e ossos provenientes de ruminantes. Os rótulos e as etiquetas dos produtos destinados à alimentação de não ruminantes, que contenham qualquer fonte de proteínas e gorduras de origem animal, contém no painel principal e em destaque a seguinte expressão: “Uso Proibido na Alimentação de Ruminantes”. Os produtos destinados à alimentação de ruminantes estão sujeitos a análises de fiscalização para a identificação dos ingredientes utilizados como fonte de proteína (BRASIL, 2004).

O Brasil apresenta baixo risco de aparecimento da EEB, mas as medidas sanitárias adotadas são imprescindíveis para evitar a sua introdução no país, pois além dos sérios prejuízos para a pecuária nacional, o risco para a saúde humana atinge elevadas repercussões sociais (geradas pela gravidade da doença e pelo medo) e econômicas (COSTA; BORGES, 2004).

De acordo com o Certificado da OIE de 24/05/2012, o Brasil é considerado como de risco insignificante para BSE.

2 OBJETIVO

Estabelecer e divulgar entre os colaboradores industriais, os procedimentos e normas internas da empresa com relação ao manuseio, remoção, segregação e destinação dos Materiais Especificados de Risco (Olhos, Encéfalo, Amígdalas/Tonsilas, Medula e Porção Distal do Íleo do Intestino Delgado), assegurando assim que materiais considerados MER não “sejam introduzidos na cadeia alimentar dos ruminantes diretamente ou através de produtos derivados (farinhas e sebo) e assim evitar uma eventual disseminação da ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA no território nacional”.

O presente manual também tem o objetivo de estabelecer medidas mitigatórias de contaminação cruzada entre os produtos classificados como MER e não MER.

ORIGINAL

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

Áreas onde há manipulação de MER (Olhos, Encéfalo, Tonsilas/Amígdalas, Medula e Porção Distal do Íleo do Intestino Delgado).

São classificados como MER:

- Amígdalas (Tonsilas palatinas e linguais) e Íleo Distal (70 cm) de bovinos e bubalinos de qualquer idade.
- Encéfalo, Olhos e Medula Espinal de bovinos e bubalinos com idade igual ou superior a 30 meses.

4 RESPONSABILIDADES

- **GARANTIA DA QUALIDADE:** Divulgar as normas de MER entre os colaboradores, e demais departamentos envolvidos no processo.
- **GERENCIA:** Contribuir para a divulgação dos procedimentos, zelar continuamente pela qualidade nas diversas áreas, analisar não conformidades e encaminhar ao setor envolvido, ajudar na solução de problemas e fornecer condições para execução de procedimentos.
- **SUPERVISORES:** Controlar o fluxo de funcionários do seu setor, fiscalizar trabalhos exercidos pelos funcionários, determinar ordens de serviço, controlar fluxo de produção, treinar funcionários de acordo com os procedimentos operacionais.

5 TERMO DE COMPROMISSO

A alta direção da empresa se compromete a disponibilizar recursos financeiros, tecnológicos e humanos para manutenção e melhoria contínua de processo.



Álvaro FerrariDiretor
Diretor Administrativo

ORIGINAL

6 DEFINIÇÕES

MER: Materiais Especificados de Risco.


Representam materiais potencialmente de risco para a EEB, devido ao tropismo do PRION (seu agente etiológico) pelo sistema nervoso central. São eles: Amídalas e Íleo Distal (70 cm) de bovinos com qualquer idade; Encéfalo, Olhos e Medula Espinhal de bovinos com idade igual ou maior de 30 meses.

EEB: Encefalopatia Espongiforme Bovina.

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP): Conjunto de instruções escritas que visa garantir a uniformidade do desempenho de uma função ou normas específicas. É usado para descrever regras ou informações mais detalhadas das atividades para o gerenciamento do sistema da qualidade.

ORIGINAL

7 FLUXOGRAMA DE PROCESSO



ORIGINAL

8 IDENTIFICAÇÃO UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS, UNIFORMES E LOCAIS DE MANIPULAÇÃO

Todos os equipamentos e utensílios usados para remoção ou separação de MER são identificados com a cor verde, ou com a sigla MER e/ou tarja verde, sendo utilizados somente para esta finalidade.



A esterilização das facas, chairas, ganchos, serras e outros equipamentos é realizada em esterilizadores específicos para MER's, devidamente identificados pela cor verde, não havendo contato com outros tipos de materiais. Após o uso, são lavados e desinfetados separadamente dos demais materiais de uso diário.

Os locais onde há processamento, armazenamento ou descarte de MER são identificados no piso através de uma demarcação de cor verde, placas "MER" ou tarjas de cor verde.

Os funcionários que manipulam MER utilizam fita verde no capacete e uniforme/ colete identificado como MER.

9 APROVEITAMENTO DE MER PARA CONSUMO HUMANO

A medula espinhal de animais com idade menor que 30 meses (4 dentes) poderá ser aproveitada para consumo humano, uma vez que esta não é classificada como MER. Neste caso, estas serão segregadas na linha de abate, sendo acondicionadas em embalagem específica, para então ser enviada para processamento no setor de Miúdos, evitando contaminação cruzada com a Medula classificada como MER durante o processamento.

10 RECEBIMENTO E ACOMODAÇÃO DOS ANIMAIS NOS CURRAIS

Os animais são desembarcados, alojados nos currais e identificados de acordo com a procedência. O Serviço de Inspeção Federal, através das inspeções *ante mortem*, adotará as medidas cabíveis quanto ao recebimento e encaminhamento de quaisquer animais apresentando sintomas relacionados ao Sistema Nervoso Central, dificuldade de locomoção ou mortos, inclusive no que se refere à notificação à empresa e encaminhamento de amostras para análise de BSE.

Da mesma maneira, em caso de animal morto, com dificuldade de locomoção, apresentando sintomas nervosos ou ainda que venha a morrer nos currais, à Inspeção Federal é imediatamente comunicada, para avaliação e diagnóstico.

11 ABATE DE EMERGÊNCIA

Em caso de abate de emergência na sala de abate ou matadouro sanitário, os MER's são retirados, acondicionados em embalagem plástica de MER, pesados e enviados para incineração junto com o MER produzido no

ORIGINAL

dia.

12 CONDENÇÃO DE VÍSCERAS E CABEÇAS

O íleo distal das vísceras condenadas pela Inspeção Federal será removido na seção de subprodutos por funcionário devidamente treinado, sendo o material acondicionado em embalagem específica para ser pesado e incinerado com os demais MER.

As cabeças condenadas/descartadas pelo DIF são deixadas em um recipiente identificado com fita vermelha no DIF, onde são descaracterizadas identificando que estão condenadas pelo DIF, ao final da produção e/ou nas pausas as mesmas são enviadas ao rachador de cabeça evitando possível propagação de patógenos, em seguida são rachadas, o encéfalo/ cérebro é removido e colocado em saco identificado para posterior pesagem e incineração.

13 RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS DE MER

As áreas de remoção da medula, cérebro (miolo), amígdalas/tonsilas, olhos e da serragem da carcaça são regularmente atendidas pelo pessoal da limpeza, que com o auxílio de rodos e pás (devidamente identificados com fita verde), recolhem os MER's do piso e quaisquer resíduos nas canaletas, ralos/sifões e os depositam em bandejas específicas ou diretamente em sacos exclusivos para MER, sendo destinados posteriormente para pesagem e incineração.

A água utilizada para higienização do piso onde há remoção de MER é toda canalizada e encaminhada a uma peneira estática, separando os resíduos líquidos dos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos são recolhidos com uma pá e destinados para embalagem de MER, para posterior pesagem e incineração.

ORIGINAL

14 PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO**14.1 REMOÇÃO DE EXTRAVASAMENTO CEREBRAL**

RESPONSÁVEL: Supervisor do abate e funcionário treinado para executar a função.

FREQUÊNCIA: 100% dos animais abatidos.

PROCEDIMENTO

1. Verificar se durante o processo de insensibilização ocorreu o extravasamento cerebral na cabeça/pele do animal.
2. Em caso positivo, raspar a cabeça/pele com o auxílio de pá ou copo coletor específico.
3. Acondicionar o conteúdo removido em embalagem/bandeja específica para segregação de MER.

OBS: A operação poderá ser realizada na praia de vômito ou canaleta de sangria.

MONITORAMENTO

O quê?	Avaliar a execução do procedimento. Verificar a ausência de tecido cerebral na praia de vômito, canaleta de sangria e áreas próximas. Certificar-se de que os materiais recolhidos são encaminhados para embalagem/bandeja específica. Certificar-se de que não há excesso de resíduos na bandeja ou embalagem que possam extravasar.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente, no início e intervalo das operações e posteriormente em horário aleatório.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Solicitar ao colaborador da higienização para remoção do conteúdo cerebral extravasado no piso.
3. Caso necessário, solicitar a paralisação da norea, até que as condições sejam restabelecidas.
4. Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
5. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico/sanitários exigidos para a realização do procedimento.
6. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Providenciar para que a execução da operação seja acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
2. Manutenção adequada da pistola penetrativa e/ou concussão, de acordo com a frequência estabelecida no plano de manutenção industrial.
3. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
4. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela operação, caso necessário.
5. Realizar treinamento com os funcionários, prevenindo assim novos desvios.
6. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RPSO 010 - 001

ORIGINAL

14.2 DESLOCAMENTO DA CABEÇA

RESPONSÁVEL: Supervisor do abate e funcionário treinado para executar a função.

FREQUÊNCIA: 100% dos animais abatidos.

PROCEDIMENTO

Procedimento de deslocamento do conjunto cabeça/língua:

1ª OPERAÇÃO

1. FACA DE CABO BRANCO: Realizar um corte no sentido horizontal durante a separação da cabeça, cortando com a faca os músculos da nuca (pescoço) até encontrar o côndilo occipital.
2. Enxaguar e esterilizar a faca em água com temperatura $\geq 82,5^{\circ}\text{C}$ a cada animal.

2ª OPERAÇÃO

3. FACA DE CABO VERDE: Liberar o côndilo occipital da cabeça, deixando a mesma presa à carcaça pela musculatura do pescoço.
4. Enxaguar e esterilizar a faca em água com temperatura $\geq 82,5^{\circ}\text{C}$ a cada animal.

MONITORAMENTO

O quê?	Avaliar a execução do procedimento. Avaliar a ausência de fragmentos de medula espinhal nos tecidos adjacentes. Avaliar a utilização correta das facas de cabo de cores diferenciadas.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente, no início e intervalo das operações e posteriormente em horário aleatório.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Remover a porção do produto contaminada por MER, descartando o mesmo em embalagem plástica ou bandeja verde.
3. Solicitar imediatamente o restabelecimento dos padrões exigidos, através da retirada da porção contaminada.
4. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Providenciar para que a execução da operação seja realizada por dois colaboradores ou acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
2. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
3. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela operação de deslocamento da cabeça, caso necessário.
4. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento de deslocamento da cabeça, prevenindo assim novos desvios.
5. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RPSO 010 - 001

ORIGINAL

14.3 REMOÇÃO DAS TONSILAS/AMÍGDALAS

RESPONSÁVEL: Supervisor do abate e funcionário treinado para executar a função.



FREQUÊNCIA: 100% dos animais abatidos.

PROCEDIMENTO

As cabeças são destacadas das carcaças e direcionadas ao lavador de cabeça, em seguida alocadas na nórea de cabeça.

1. Com o auxílio de FACA DE CABO VERDE e gancho identificado, retirar as amígdalas (tonsilas linguais e palatinas) do conjunto cabeça/língua.
2. Acondicionar o conteúdo removido em embalagem/bandeja específica para segregação de MER.
3. Enxaguar e esterilizar a faca em água com temperatura $\geq 82,5^{\circ}\text{C}$.

OBS: Em caso de condenação da língua pelo SIF, as Tonsilas serão removidas antes do descarte da mesma. A língua condenada será cortada e poderá ser descartada em embalagem específica para MER juntamente com as Tonsilas.



MONITORAMENTO

O quê?	Avaliar a execução do procedimento. Verificar a ausência das Tonsilas no conjunto cabeça/língua. Certificar-se de que os materiais recolhidos são encaminhados ao recipiente específico. Certificar-se de que não há excesso de resíduos nos recipientes.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente, no início e intervalo das operações e posteriormente em horário aleatório.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Remover a porção do produto contaminada por MER, descartando o mesmo em embalagem plástica ou bandeja verde.
3. Solicitar imediatamente o restabelecimento dos padrões exigidos para a operação.
4. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Providenciar para que a execução da operação seja realizada por dois colaboradores ou acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
2. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
3. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela retirada das tonsilas, caso necessário.
4. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento, prevenindo assim novos desvios.
5. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RPSO 010 - 001

ORIGINAL

14.4 REMOÇÃO DOS OLHOS

RESPONSÁVEL: Supervisor do miúdos e funcionário treinado para executar a função.

FREQUÊNCIA: 100% dos animais abatidos.

PROCEDIMENTO

1. Na sala de cabeças, com o auxílio de FACA DE CABO VERDE e gancho, ou faca pneumática, remover os 2 olhos da cabeça.
2. Acondicionar os olhos em embalagem/bandeja específica para segregação de MER.
3. Enxaguar e esterilizar a faca/betche em água com temperatura $\geq 82,5^{\circ}\text{C}$ frequentemente.
4. Através de utensílio serra copo é realizada a remoção do nervo ótico, quando solicitado pelo país importador.

OBS: Em caso de condenação da cabeça, os olhos deverão ser removidos antes do descarte da mesma.

MONITORAMENTO

O quê?	Avaliar a execução do procedimento. Verificar a ausência dos olhos na cabeça. Certificar-se de que os materiais recolhidos são encaminhados ao recipiente específico. Certificar-se de que não há excesso de resíduos nos recipientes.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente, no início e intervalo das operações e posteriormente em horário aleatório.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Remover a porção do produto contaminada por MER, descartando o mesmo em embalagem plástica ou bandeja verde.
3. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos para a realização do procedimento.
4. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do Monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Providenciar para que a execução da operação seja realizada por dois colaboradores ou acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
2. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
3. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela operação de retirada dos olhos, caso necessário.
4. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento de remoção dos olhos, prevenindo assim novos desvios.
5. Outras medidas poderão ser adotadas, conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário (ausência de MER) necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RPSO 010 - 002

ORIGINAL

14.5 REMOÇÃO DO ENCÉFALO (CÉREBRO)

RESPONSÁVEL: Supervisor do miúdos e funcionário treinado para executar a função.

FREQUÊNCIA: 100% dos animais abatidos.

PROCEDIMENTO

1. Na sala de cabeça, promove-se a desarticulação da mandíbula.
2. Posteriormente, faz-se a retirada dos músculos da cabeça em mesa específica para esta operação;
3. Com o auxílio de serra fita ou rachador de cabeça, dividir a cabeça em duas partes, seguindo uma linha média imaginária;
4. Retirar os resíduos de encéfalo (cérebro) da caixa craniana de forma manual ou através de sugador;
5. Acondicionar o conteúdo removido em embalagem/bandeja específica para segregação de MER.

MONITORAMENTO

O quê?	Avaliar a execução do procedimento. Verificar a ausência de encéfalo na cabeça, antes do envio da mesma para descarte. Certificar-se de que os materiais recolhidos são encaminhados ao recipiente específico. Certificar-se de que não há excesso de resíduos nos recipientes.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente, no início e intervalo das operações e posteriormente em horário aleatório.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Caso alguma cabeça com MER seja destinada ao setor de descarte, solicitar imediatamente a segregação da cabeça e o restabelecimento dos padrões exigidos, através da retirada do encéfalo, encaminhando o material para embalagem específica. Informar imediatamente o desvio ao Supervisor do setor.
3. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos para a realização do procedimento.
4. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Providenciar para que a execução da operação seja realizada por dois colaboradores ou acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
2. Manutenção preventiva da serra fita e/ou rachador de cabeça.
3. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
4. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela operação de retirada do encéfalo, caso necessário.
5. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento de retirada do encéfalo, prevenindo assim novos desvios.
6. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RPSO 010 - 002

ORIGINAL

14.6 SERRAGEM DE 1/2 CARÇAÇA

RESPONSÁVEL: Supervisor do abate e funcionário treinado para executar a função.

FREQUÊNCIA: 100% dos animais abatidos.

PROCEDIMENTO

1. Com auxílio de Serra de meia-carçaça postada em plataforma própria, serrar a carçaça ao longo da coluna vertebral (no sentido de cima para baixo), de tal forma que somente a fita laminar entre em contato com a mesma originando duas meias-carçaças, propiciando a retirada da medula espinhal.
2. Enxaguar e esterilizar a serra em água com temperatura $\geq 82,5^{\circ}\text{C}$ a cada carçaça.

Obs.: Os fragmentos de medula espinhal misturados com o pó da serragem gerado pela serra são recolhidos em peneira e tubulação, sendo os mesmos removidos constantemente e acondicionados em embalagem/bandeja específica para MER.

MONITORAMENTO

O quê?	Certificar-se de que as carçaças estejam sendo serradas satisfatoriamente, expondo a medula espinhal. Certificar-se de que a mangueira coletora de resíduos do esterilizador da serra não esteja tocando na carçaça, não apresentem furos e estejam dispostas dentro da calha. Certificar-se de que não há excesso de resíduos nas calhas e recipientes. Certificar-se de que os materiais recolhidos são encaminhados ao recipiente específico.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente, no início e intervalo das operações e posteriormente em horário aleatório.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação.
2. Em caso de carçaças mal serradas, que impossibilitem a retirada da medula espinhal, a linha de abate será paralisada, para a abertura do canal vertebral com auxílio de serra makita ou machadinha.
3. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos para a realização do procedimento.
4. Outras medidas poderão ser adotadas, conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário (ausência de MER) necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Caso o colaborador de serragem de carçaças observe deficiência da lâmina da serra que dificulte a execução do procedimento, solicitando a substituição da fita ou do equipamento completo pela serra de ½ carçaça reserva.
2. Diminuir a velocidade da nórea, quando concluir que esteja dificultando a realização da operação.
3. Providenciar para que a execução da operação seja acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
4. Manutenção preventiva da serra de meia-carçaça.
5. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
6. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela serragem de carçaças, caso necessário.
7. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento de serragem de carçaças.
8. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RPSO 010 - 001

ORIGINAL

14.7 REMOÇÃO DE MEDULA ESPINHAL

RESPONSÁVEL: Supervisor do abate e funcionário treinado para executar a função.

FREQUÊNCIA: 100% dos animais abatidos.

PROCEDIMENTO

➤ PRODUÇÃO DE MEDULA (COMESTÍVEL)

1. FACA DE CABO BRANCO: Remover a medula da coluna vertebral, fazendo movimentos de cima para baixo e vice-versa.
2. Acondicionar a medula em embalagem transparente, para ser encaminhada aos Miúdos.
3. Enxaguar e esterilizar a faca em água com temperatura $\geq 82,5^{\circ}\text{C}$ frequentemente.

➤ RETIRADA DE MEDULA (MER)

1. EXTRATOR DE MEDULA OU FACA DE CABO VERDE: Remover a medula da coluna vertebral, fazendo movimentos de cima para baixo e vice-versa.
2. Acondicionar a medula em embalagem/bandeja verde, para ser encaminhada para incineração.
3. Enxaguar e esterilizar a faca em água com temperatura $\geq 82,5^{\circ}\text{C}$ frequentemente, em esterilizador específico.
 - a) Animais com carimbo de 0, 2 e 4: a medula é considerada COMESTÍVEL (não é MER).
 - b) Animais com carimbo de 6 ou 8: a medula é considerada MER, sendo proibido o seu aproveitamento como comestível.

OBS1: Caso não haja venda de medula comestível, esta será retirada e incinerada junto à medula MER.

OBS2: Carcaças desviadas para o DIF deverão ter a medula posteriormente removida, sendo incinerados junto aos demais.

MONITORAMENTO

O quê?	Avaliar a execução do procedimento, verificando a ausência de fragmentos de medula espinhal junto a coluna vertebral e tecidos adjacentes. Certificar-se de que o funcionário segrega a medula conforme classificação. Certificar-se de que não há excesso de resíduos no recipiente.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente, no início e intervalo das operações e posteriormente em horário aleatório.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Carcaças com deficiência na serragem que impeçam a retirada da medula terão seu canal medular abertos com auxílio de serra makita ou machadinho, liberando a medula para ser retirada em sua totalidade.
3. Providenciar o descarte da embalagem de medula comestível, caso detectado desvio no procedimento de classificação durante o abate, e proceder investigação para calcular a extensão do ocorrido.
4. Solicitar ao funcionário responsável pela remoção da medula espinhal a retirada da porção contaminada ou do resíduo de medula presente na carcaça, parando a nórea caso necessário.
5. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Providenciar para que a operação seja realizada por dois colaboradores ou acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
2. Diminuir a velocidade da nórea, quando concluir que esta esteja dificultando a operação.
3. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
4. Substituição do funcionário responsável pela operação de retirada da medula, caso necessário.
5. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento, prevenindo assim novos desvios.
6. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RPSO 010 - 001

ORIGINAL

14.8 MONITORAMENTO DA RETIRADA DE MEDULA ESPINHAL

RESPONSÁVEL: Garantia da Qualidade.

FREQUÊNCIA: Diariamente em horários aleatórios.

PROCEDIMENTO

1. Posicionar-se na linha de abate posteriormente ao ponto de remoção da medula espinhal.
2. Avaliar ao longo da coluna vertebral, inspecionando a ausência de resíduos de medula espinhal.
3. Registrar em planilha o número da carcaça e o resultado do monitoramento (C = Ausência / NC = Presença).

Nº de Animais abatidos	Amostra Nível II	Nº de Animais abatidos	Amostra Nível II
0 a 50	10 carcaças	151 a 280	32 carcaças
51 a 90	13 carcaças	281 a 500	50 carcaças
91 a 150	20 carcaças	501 a 1200	80 carcaças

OBS: O total de carcaças a ser verificado foi estabelecido baseado na Tabela NBR 5426 – Nível II, considerando a quantidade de animais abatidos. Porém, independente do total de abate, a verificação nunca deverá ser inferior a 10 carcaças/dia.

MONITORAMENTO

O quê?	Verificar a ausência de fragmentos de medula espinhal na coluna vertebral e tecidos adjacentes.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente em horários aleatórios atendendo a amostragem.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Remover a medula espinhal.
3. Carcaças com deficiência na serragem que impeçam a retirada da medula por faca ou raspador serão serradas com auxílio de serra makita ou abertas com machadinho no ponto específico da deficiência, liberando a medula para ser retirada em sua totalidade.
4. Solicitar ao funcionário responsável pela remoção da medula espinhal a retirada da porção contaminada ou do resíduo de medula presente na carcaça, parando a nórea caso necessário.
5. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos.
6. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Providenciar para que a operação seja realizada por dois colaboradores ou acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
2. Diminuir a velocidade da nórea, quando concluir que esta esteja dificultando a operação.
3. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
4. Substituição do funcionário responsável pela operação de retirada da medula, caso necessário.
5. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento, prevenindo assim novos desvios.
6. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RMER - 004.

ORIGINAL

14.9 REMOÇÃO DA PORÇÃO DISTAL DO ÍLEO (INTESTINO)

RESPONSÁVEL: Supervisor da triparia, supervisor de subprodutos e funcionário treinado para executar a função.

FREQUÊNCIA: 100% dos animais abatidos.

PROCEDIMENTO

REMOÇÃO DA PORÇÃO DO ÍLEO DISTAL (203,2 CM FINAL)

1. Realizar a inspeção na mesa de vísceras (linha D – Inspeção Federal) de todo o trato gastrointestinal. Posteriormente, o conjunto de intestinos segue por chute até o setor de triparia.
2. Identificar a porção distal do íleo, medindo os 70 cm finais através de um gabarito de fita verde presente na borda do tanque/mesa.
3. Com o auxílio de FACA DE CABO VERDE, remover o terço distal do íleo.
4. Acondicionar o conteúdo removido em embalagem específica para segregação de MER.

OBS.: Nos intestinos condenados pelo SIF, o terço distal do íleo será removido na área de subprodutos.

MONITORAMENTO

O quê?	Avaliar a execução do procedimento. Certificar-se de que os materiais recolhidos são encaminhados ao recipiente específico. Certificar-se de que não há excesso de resíduos nos recipientes.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Inspetor da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente, no início e intervalo das operações e posteriormente em horário aleatório.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Solicitar imediatamente o restabelecimento dos padrões exigidos, orientando o funcionário para que não “estique” o material a ser separado durante sua medição junto ao gabarito.
3. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos para a realização do procedimento.
4. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Providenciar para que a execução da operação seja acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
2. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela operação de remoção da porção distal do íleo, caso necessário.
3. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
4. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento de remoção da porção distal do íleo, prevenindo assim novos desvios.
5. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RPSO 010 - 004

ORIGINAL

14.10 SEGREGAÇÃO DE MER DOS SETORES DE PRODUÇÃO

RESPONSÁVEL: Supervisor do abate, miúdos, triparia e funcionário treinado para executar a função.

FREQUÊNCIA: Diariamente.

PROCEDIMENTO

SEGREGAÇÃO

1. Recolher todo o MER do piso e calhas (quando verificado), através de pá e rodos devidamente identificados com fita adesiva verde.
2. Acondicionar os produtos recolhidos em embalagem/bandeja específica para MER.
3. As embalagens com MER provenientes do abate são encaminhadas para o subsolo através de chutes específico para este fim, caindo em um tanque apropriado para o acondicionamento de MER, onde permanecem até a sua pesagem.
4. As embalagens com MER provenientes do setor de miúdos e triparia são retiradas manualmente e destinadas em tanque/ contentor apropriado para o acondicionamento de MER até a sua pesagem.
5. A água utilizada para higienização do piso onde há remoção de MER é toda canalizada e encaminhada a uma peneira estática, separando os resíduos líquidos dos resíduos sólidos. Os resíduos sólidos são recolhidos com uma pá e destinados para embalagem de MER, para posterior pesagem e incineração.

MONITORAMENTO

O quê?	Avaliar a execução do procedimento de segregação. Verificar se não está ocorrendo acúmulo de MER nos setores. Certificar-se de que os materiais estão sendo segregados e conduzidos para pesagem e incineração. Certificar-se de que não há extravasamento de resíduos durante o transporte.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente, no início e intervalo das operações e posteriormente em horário aleatório.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Solicitar imediatamente o restabelecimento dos padrões exigidos, através da coleta e/ou remoção imediata dos MER.
3. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos para a realização do procedimento.
4. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Providenciar para que a execução da operação seja acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
2. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela operação de segregação de MER, caso necessário.
3. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
4. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento de segregação de MER, prevenindo assim novos desvios.
5. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RPSO 010 - 001; RPSO 010 - 002; RPSO 010 - 004

ORIGINAL

14.11 PESAGEM E INCINERAÇÃO DE MATERIAIS ESPECIFICADOS DE RISCO

RESPONSÁVEL: Supervisor de caldeira e auxiliar treinado para a função.

FREQUÊNCIA: 100% dos animais abatidos.

PROCEDIMENTO

1. Remover as embalagens com MER do tanque/contentor de acondicionamento.
2. Pesar separadamente cada saco e anotar na planilha (de acordo com o MER).
3. Após a pesagem, encaminhar o material para incineração na caldeira.
4. Ao final da produção, somar todas as pesagens realizadas, registrando o total de MER gerado na produção.

Peso médio de MER por bovino	
Órgãos/Partes	Peso (gramas)
Encéfalo	300 g
Medula Espinhal	230 g
Olhos	150 g
Íleo Distal	150 g
Amídalas	100 g
Média/Animal	930 g

OBS: O peso médio de cada MER pode variar para mais ou para menos, de acordo com as características dos animais abatidos (sexo, peso, etc.).

MONITORAMENTO

O quê?	Certificar-se de que todo o material classificado como MER está sendo pesado e incinerado. Verificar se a cada nova pesagem é efetuada o registro na planilha específica. Certificar-se de que não há extravasamento de resíduos.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Inspetor da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Solicitar o restabelecimento dos padrões exigidos, através da pesagem e incineração dos MER.
3. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos para a realização do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Providenciar para que a execução da operação seja acompanhada por colaborador devidamente treinado, até que o funcionário com dificuldade na operação esteja apto.
2. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela operação de pesagem e incineração de MER, caso necessário.
3. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
4. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento de pesagem e incineração de MER, prevenindo assim novos desvios.
5. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RMER - 001.

ORIGINAL

14.12 MONITORAMENTO DE RECEBIMENTO DE QUARTOS

RESPONSÁVEL: Supervisor do quarteio e Garantia da Qualidade.

FREQUÊNCIA: 100% do recebimento de quartos de terceiros.

PROCEDIMENTO

TENDAL / QUARTEIO

1. Durante o desembarque dos quartos, observar se há presença de medula espinhal na linha da coluna vertebral.
2. Segregar as peças, caso seja identificado a presença de medula espinhal.
3. Com o auxílio de FACA DE CABO VERDE, retirar a porção de medula espinhal, direcionando o material para embalagem específica de MER.
4. Encaminhar a embalagem para o setor da caldeira, acondicionando os sacos em local apropriado para posterior pesagem e incineração.

OBS1: Caso seja identificada a presença de Medula durante a revisão na entrada de Desossa, paralisar a entrada de quartos e comunicar imediatamente a Garantia da Qualidade para adoção das medidas necessárias.

MONITORAMENTO

O quê?	Verificar a ausência de fragmentos de medula espinhal na coluna vertebral e tecidos adjacentes. Certificar-se de que os quartos estão sendo totalmente segregados para retirada de MER. Certificar-se de que o MER identificado está sendo removido antes do envio do quarto para a Desossa. Certificar-se de que o material foi posteriormente pesado e incinerado. Certificar-se de que não há extravasamento de resíduos no setor.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Inspetor da Garantia de Qualidade.
Quando?	A cada recebimento de quarto traseiro ou dianteiro.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Remover a medula espinhal dos quartos.
3. Solicitar imediatamente o restabelecimento dos padrões exigidos, através da incineração do MER.
4. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos para a realização do procedimento.
5. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do departamento comercial e qualidade no intuito de evitar que o desvio ocorra novamente.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Notificar ao fornecedor o problema identificado e adequação.
2. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do departamento comercial e qualidade no intuito de evitar que o desvio ocorra novamente.

REGISTRO

RPSO 010 - 014

ORIGINAL

14.13 REMOÇÃO DE MER EM CABEÇA CONDENADA

RESPONSÁVEL: Supervisor do abate e miúdos e funcionário treinado para executar a função.

FREQUÊNCIA: 100% das cabeças condenadas.

PROCEDIMENTO

1. As cabeças condenadas são identificadas pelo SIF e acondicionadas em uma Caixa identificada com fita vermelha aguardando até envio a sala de cabeças para remoção do MER.
2. Com o auxílio de FACA DE CABO VERDE e gancho, remover os 2 olhos e as amígdalas (tonsilas) da cabeça.
3. Proceder o descarte da língua condenada.
4. Acondicionar os MERs em embalagem/bandeja específica para segregação de MER.
5. Posteriormente, com o auxílio de serra fita ou rachador de cabeça, dividir a cabeça em duas partes, seguindo uma linha média imaginária.
6. Retirar os resíduos de encéfalo (cérebro) da caixa craniana.
7. Acondicionar o conteúdo removido em embalagem/bandeja específica para segregação de MER.

MONITORAMENTO

O quê?	Avaliar a execução do procedimento. Verificar a ausência dos olhos, tonsilas e cérebro na cabeça. Certificar-se de que os materiais recolhidos são encaminhados ao recipiente específico. Certificar-se de que não há excesso de resíduos nos recipientes.
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da Garantia de Qualidade.
Quando?	Diariamente, no início e intervalo das operações e posteriormente em horário aleatório.

MEDIDAS CORRETIVAS

1. Solicitar ao supervisor do setor a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
2. Solicitar o restabelecimento dos padrões exigidos, através da pesagem e incineração dos MER.
3. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos para a realização do procedimento.
4. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

1. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
2. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela operação de retirada do encéfalo, caso necessário.
3. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento de retirada do encéfalo, prevenindo assim novos desvios.
4. Outras medidas poderão ser adotadas, conforme julgamento do monitor de qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário (ausência de MER) necessário para a execução do procedimento.

REGISTRO

RPSO 010 - 002

ORIGINAL

14.14 REMOÇÃO DE MER EM CARÇAÇAS DO ABATEDOURO SANITÁRIO

RESPONSÁVEL: Supervisor do abate e funcionário treinado para executar a função.

FREQUÊNCIA: 100% das carcaças que passaram pelo abatedouro sanitário

PROCEDIMENTO

1. Após a análise da carcaça pela IF, o colaborador responsável pela abertura da carcaça e remoção das vísceras procede toda a remoção dos materiais de risco da carcaça.
2. Devem ser removidas as seguintes partes: Olhos, amígdalas, medula espinhal, cérebro e íleo distal. Os procedimentos de remoção seguem o descrito para as carcaças que seguem o curso normal de abate.
3. Acondicionar os MERs em embalagem/bandeja específica para segregação de MER ou direcionar de imediato ao forno crematório.

MONITORAMENTO

O quê?	Avaliar a execução do procedimento. Verificar a ausência dos olhos, tonsilas e cérebro na cabeça. Certificar-se de que os materiais recolhidos são encaminhados ao recipiente específico ou ao forno crematório
Como?	Inspeção visual.
Quem?	Monitor da Garantia de Qualidade ou Responsável pelo bem estar animal.
Quando?	Sempre que houver carcaça no abatedouro sanitário

MEDIDAS CORRETIVAS

5. Solicitar ao responsável a adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário.
6. Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários exigidos para a realização do procedimento.
7. Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento do avaliador, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

MEDIDAS PREVENTIVAS

4. Conversar com o funcionário no intuito de identificar as causas do desvio e solicitar adequação.
5. Providenciar a substituição do funcionário responsável pela operação, caso necessário.
6. Providenciar treinamento junto ao colaborador responsável pelo procedimento de retirada do encéfalo, prevenindo assim novos desvios.

REGISTRO

RMER003.

ORIGINAL

15 TREINAMENTOS

Os auxiliares de produção que atuam diretamente em funções correlacionados á manipulação de MER são orientados *in loco* pelo supervisor/líder do setor para o desempenho da função, passando por reciclagem anualmente, ou ainda sempre que necessário.

16 ANEXOS

RMER - 001 – Pesagem e Incineração De MER

RMER - 003 – Manipulação e Segregação De MER - Abatedouro Sanitário

RMER - 004 – Verificação da Medula

RPSO 010 – 001 - Procedimento Sanitário Operacional - Abate

RPSO 010 – 002 - Procedimento Sanitário Operacional - Setores de Miúdos, Bucharía e Mocotó 2ªfase

RPSO 010 – 004 - Procedimento Sanitário Operacional - Setores de Triparia, Bucharía e Mocotó 1ªfase

RPSO 010 – 014 - Procedimento Sanitário Operacional - Recebimento de Carne com Osso

17 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Decreto Nº 9013_9069 de 2017, RIISPOA – Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.
- Norma Interna DIPOA/SDA Nº01, de 08/03/2017.
- BRASIL. Ofício-Circular Nº29/2020 de 22/09/2020. Diretrizes sobre classificação e remoção de Materiais Especificados de Risco (MER).
- BRASIL. Instrução Normativa Nº 34, de 28/05/2008. Regulamento Técnico da Inspeção Higienico- Sanitária e Tecnológica do Processamento de Resíduos de Animais – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2008.
- FACHIN. D.; Controle da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) através dos materiais de Risco Específico em Estabelecimentos de abate de Bovinos – São José do Rio Preto – SP, 27 pg, Dezembro/2008.
- GOTEIPE, F. M. S.; Avaliação do Sistema de Vigilância da Encefalopatia Espongiforme Bovina no Brasil – Dissertação de Mestrado em Ciências Agrárias. Brasília – Distrito Federal, 114 pg, Março/2006.
- PUZZY, M. B., XAVIER, A., LIFTFALLA, F., POLIZER, K. A., ZAPPA, V.; Encefalopatia Espongiforme Bovina – Revista Científica Eletrônica de Medicina Veterinária, Ano VI – Nº 10 – periódico semestral, Janeiro/2008.
- VALLAT, B.; Situação Atual da Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) – XII Reunião Interamericana, a nível Ministerial, sobre Saúde e Agricultura – São Paulo, 22 pg., 02 a 04/05/20

ORIGINAL