



BEM-ESTAR ANIMAL			RBEA 018 - 002
PROCEDIMENTO OPERACIONAL			Revisão 04
ABATE			DATA: __/__/__

HORÁRIO		:	:	:	:
MONITORAMENTO	CRITÉRIOS	C NC NA	C NC NA	C NC NA	C NC NA
Box de atordoamento	Acomodação individual do animal Tempo máximo de contenção: 1 minuto	() () () _____	() () () _____	() () () _____	() () () _____
Pressão da pistola	Pistola Penetrativa: 160 a 210 Lbs/ 11,0 a 13,0 Bar	() () () _____	() () () _____	() () () _____	() () () _____
Insensibilização	Eficiência do processo no primeiro tiro. Posicionamento da pistola/tiro.	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
Monitoramento da eficiência de insensibilização	Queda imediata	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
	Ausência de reflexo nos olhos	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
	Ausência de vocalização	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
	Ausência de respiração rítmica	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
	Ausência de movimentos voluntários	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
Tempo entre Insensibilização e sangria	Máximo 1 minuto	() () () _____	() () () _____	() () () _____	() () () _____
Sangria	Fluxo de sangue abundante e contínuo	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()
Tempo de sangria	Mínimo de 3 minutos para o início da esfolagem	() () () _____	() () () _____	() () () _____	() () () _____
Tempo entre o fim da sangria ao início da evisceração	Quando identificadas fêmeas prenhas o tempo entre o fim da sangria ao início da evisceração deve ser de no mínimo 20 minutos	() () () _____	() () () _____	() () () _____	() () () _____
Abate Halal	Pistola sem penetração (impacto): 190 a 245 Lbs	() () ()	() () ()	() () ()	() () ()

Observações:
FREQUÊNCIA: Diariamente, no início das operações e posteriormente em intervalo máximo de até 3 horas. Verificar no mínimo 10 animais/monitoramento.
LEGENDA: C: Conforme; NC: Não Conforme; NA: Não Aplicável.