

Итак, каждый исход каждого условия
 совмещается с остальными
 исходами остальных условий,
 т.е. по правилу умножения. $(6 \cdot 2 + 2 \cdot 4) \cdot 6!$
 $8!$

$$6 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 6! = 24 \cdot 6! = N(C)$$

Поэтому $P(C) = \frac{24 \cdot 6!}{8!} = \frac{3}{7}$

а) A и B , стоящие рядом, - это
 одно место в очереди. Поэтому всего
 их семь. $C = \{A \text{ и } B \text{ рядом}\}$

Кол-во способов
 переставить семь
 людей в очередь:

$P_7 = 7!$ (1 человек
 входит в очередь 1 раз;
 используем всех
 семь человек;
 важен порядок)

Кол-во способов
 переставить A и B ,
 стоящих рядом:

$$P_2 = 2! = 2$$

(1 друг входит в
 очередь 1 раз;
 важен порядок
 использования
 друзей).

При этом, $\Omega = \{\text{все возможные перестановки людей в очереди}\}$

$N(\Omega) = P_8 = 8!$ (1 человек входит в очередь
 1 раз; берём всех людей; важен порядок).

$N(C) = 2 \cdot 7!$ (правильно умножение, т.к.

на первом испытании A и B
 независимо друг от друга

вероятности $P(A) = \frac{1}{2}$

$$P(B) = \frac{1}{2} \quad P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

Число, 25.

1) A, B и 2. вероятность $P(A \cap B)$

— это сумма вероятностей $P(A) + P(B)$

или $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

вероятности $P(A \cup B) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

или $P(A \cup B) = 1$ (вероятность 1)

$D = \{ \text{события } A \text{ и } B \text{ независимы} \}$

4. вероятность $P(A, B)$

и $P(B, A)$

или $P(A \cap B) = P(B \cap A)$

или $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ (вероятность, что

2-х событий A и B , если

вероятности $P(A) = \frac{1}{2}$ и $P(B) = \frac{1}{2}$)

или 2-х событий:

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \quad (\text{вероятность, что})$$

2. вероятность $P(A \cup B)$ (вероятность, что

A и B : $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$).

$$P(D) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16} \quad (\text{вероятность})$$

вероятности, m, n — вероятности

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16} \quad (\text{вероятность})$$

$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$ (вероятность)

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

или $P(A \cap B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

⑤
subps
⑥
subps
⑦
subps





5

subtype

10

perhaps

Copy





7

5/6