

У к а з а н и е. Изучить разность

$$\frac{1}{x} - y_n.$$

639.2. Для нахождения $y = \sqrt{x}$, где $x > 0$, применяется следующий процесс: $y_0 > 0$ — произвольно,

$$y_n = \frac{1}{2} \left(y_{n-1} + \frac{x}{y_{n-1}} \right) \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Доказать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \sqrt{x}.$$

У к а з а н и е. Использовать формулу

$$\frac{y_n - \sqrt{x}}{y_n + \sqrt{x}} = \left(\frac{y_{n-1} - \sqrt{x}}{y_{n-1} + \sqrt{x}} \right)^2 \quad (n \geq 1).$$

640. Для приближенного решения уравнения Кеплера

$$x - \varepsilon \sin x = m \quad (0 < \varepsilon < 1) \quad (1)$$

полагают

$$x_0 = m, \quad x_1 = m + \varepsilon \sin x_0, \quad \dots, \quad x_n = m + \varepsilon \sin x_{n-1}, \quad \dots$$

(метод последовательных приближений).

Доказать, что существует $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ и число ξ является единственным корнем уравнения (1).

641. Если $\omega_h[f]$ есть колебание функции $f(x)$ на сегменте $|x - \xi| \leq h$ ($h > 0$), то число

$$\omega_0[f] = \lim_{h \rightarrow 0} \omega_h[f]$$

называется *колебанием функции $f(x)$ в точке ξ* .

Определить колебание функции $f(x)$ в точке $x = 0$, если $f(0) = 0$ и при $x \neq 0$ имеем:

а) $f(x) = \sin \frac{1}{x}$; б) $f(x) = \frac{1}{x^2} \cos^2 \frac{1}{x}$;

в) $f(x) = x \left(2 + \sin \frac{1}{x} \right)$; г) $f(x) = \frac{1}{\pi} \operatorname{arctg} \frac{1}{x}$;

д) $f(x) = \frac{|\sin x|}{x}$; е) $f(x) = \frac{1}{1 + e^{1/x}}$;

ж) $f(x) = (1 + |x|)^{1/x}$.

642. Пусть $f(x) = \sin \frac{1}{x}$.