

то можно ли утверждать, что ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  также сходится?

Рассмотреть примеры

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{и} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \right].$$

2702. Пусть  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  — не абсолютно сходящийся ряд и

$$P_n = \sum_{i=1}^n \frac{|a_i| + a_i}{2}, \quad N_n = \sum_{i=1}^n \frac{|a_i| - a_i}{2}.$$

Доказать, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_n}{P_n} = 1.$$

2703. Доказать, что сумма ряда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$$

для каждого  $p > 0$  лежит между  $\frac{1}{2}$  и 1.

2703.1. Сколько членов ряда следует взять, чтобы получить его сумму с точностью до  $\varepsilon = 10^{-8}$ , если:

$$\text{а) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n^2 + 1}}; \quad \text{б) } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n^0}{\sqrt{n}}.$$

2704. Доказать, что если члены ряда

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots$$

переставить так, чтобы группу  $p$  последовательных положительных членов сменяла группа  $q$  последовательных отрицательных членов, то сумма нового ряда будет

$$\ln 2 + \frac{1}{2} \ln \frac{p}{q}.$$

2705. Доказать, что гармонический ряд

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$