

MIREN Rocks Frankenjura species identification booklet

Frankenjura

MIREN Rocks Frankenjura species identification booklet

Frankenjura

Version 1.5

March 2025

Authors: Thomas Deola, Katrin Schönhofer, Maja Lecher

Responsible: Prof. Dr. Anke Jentsch

Contact: anke.jentsch@uni-bayreuth.de

Species organised by plant family

Species	Family	Local name	Page
<i>Allium lusitanicum</i>	Amaryllidaceae	Berg-Lauch	8
<i>Allium oleraceum</i>	Amaryllidaceae	Gemüse-Lauch	8
<i>Bupleurum falcatum</i>	Apiaceae	Sichelblättriges Hasenohr	9
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Apiaceae	Gewöhnliche Kleine Bibernelle	9
<i>Seseli libanotis</i>	Apiaceae	Berg-Heilwurz	10
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Apocynaceae	Weisse Schwalbenwurz	10
<i>Hedera helix</i>	Araliaceae	Gewöhnlicher Efeu	11
<i>Anthericum ramosum</i>	Asparagaceae	Ästige Graslilie	11
<i>Asplenium ceterach</i>	Aspleniaceae	Milzfarn, Schriftfarn	12
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Aspleniaceae	Mauer-Streifenfarn, Mauerraute	12
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Aspleniaceae	Hirschzunge	13
<i>Asplenium septentrionale</i>	Aspleniaceae	Nordischer Streifenfarn	13
<i>Asplenium trichomanes</i>	Aspleniaceae	Braunstieler Streifenfarn	14
<i>Asplenium viride</i>	Aspleniaceae	Grünstieler Streifenfarn	14
<i>Artemisia campestris</i>	Asteraceae	Feld-Beifuß	15
<i>Artemisia vulgaris</i>	Asteraceae	Gemeiner Beifuß	15
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	Asteraceae	Weidenblatt-Rindsauge	16
<i>Carlina acaulis</i>	Asteraceae	Schmalblättrige Siberdistel	16
<i>Cota tinctoria</i>	Asteraceae	Färber-Hundskamille	17
<i>Erigeron acris ssp. acris</i>	Asteraceae	Scharfes Berufkraut	17
<i>Erigeron annuus ssp. annuus</i>	Asteraceae	Gewöhnliches Einjähriges Berufkraut	18
<i>Hieracium bifidum</i>	Asteraceae	Gabeliges Habichtskraut	18
<i>Hieracium bupleuroides</i>	Asteraceae	Hasenohr-Habichtskraut	19
<i>Hieracium calodon</i>	Asteraceae	Pannonicisches Mausohrhabichtskraut	19
<i>Hieracium franconicum</i>	Asteraceae	Fränkisches Habichtskraut	20
<i>Hieracium harzianum</i>	Asteraceae	Ehrenbürg-Habichtskraut	20
<i>Hieracium murorum agg.</i>	Asteraceae	Wald-Habichtskraut	21
<i>Hieracium pilosella</i>	Asteraceae	Mausohrhabichtskraut	21
<i>Hieracium schmidii</i>	Asteraceae	Bleiches Habichtskraut	22
<i>Hieracium schneidii</i>	Asteraceae	Schneid-Habichtskraut	22
<i>Lactuca perennis</i>	Asteraceae	Blauer Lattich	23
<i>Leontodon incanus</i>	Asteraceae	Grauer Löwenzahn	23
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Asteraceae	Wiesen-Margerite	24
<i>Mycelis muralis</i>	Asteraceae	Mauerlattich	24
<i>Taraxacum sp</i>	Asteraceae		25
<i>Impatiens parviflora</i>	Balsaminaceae	Kleines Springkraut	25

<i>Betula pendula</i>	Betulaceae	Gewöhnliche Birke	26
<i>Corylus avellana</i>	Betulaceae	Haselstrauch	26
<i>Asperugo procumbens</i>	Boraginaceae	Schlangenäuglein	27
<i>Echium vulgare</i>	Boraginaceae	Gemeiner Natternkopf	27
<i>Alyssum montanum</i>	Brassicaceae	Berg-Steinkraut	28
<i>Arabidopsis lyrata</i> subsp. <i>petraea</i>	Brassicaceae	<i>Arabis petraea</i>	28
<i>Arabis alpina</i>	Brassicaceae	Alpen Gänsekresse	29
<i>Arabis hirsuta</i>	Brassicaceae	Behaarte Gänsekresse	29
<i>Arabis turrita</i>	Brassicaceae	Turmgänsekresse	30
<i>Aurinia saxatilis</i>	Brassicaceae	Felsensteinkraut	30
<i>Cardamine flexuosa</i>	Brassicaceae	Wald-Schaumkraut	31
<i>Cardamine impatiens</i>	Brassicaceae	Spring-Schaumkraut	31
<i>Draba aizoides</i>	Brassicaceae	Immergrünes Felsenblümchen	32
<i>Erysimum crepidifolium</i>	Brassicaceae	Bleicher Schöterich	32
<i>Erysimum odoratum</i>	Brassicaceae	Duft-Schöterich	33
<i>Erysimum repandum</i>	Brassicaceae	Spreiz-Schöterich	33
<i>Lunaria rediviva</i>	Brassicaceae	Wilde Mondviole	34
<i>Noccaea montana</i>	Brassicaceae	Berg-Täschelkraut	34
<i>Sisymbrium austriacum</i>	Brassicaceae	Österreichische Rauke	35
<i>Campanula gentilis</i>	Campanulaceae	Edel-Glockenblume	35
<i>Campanula persicifolia</i>	Campanulaceae	Pfirsichblättrige Glockenblume	36
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanulaceae	Rundblättrige Glockenblume	36
<i>Campanula trachelium</i>	Campanulaceae	Nesselblättrige Glockenblume	37
<i>Lonicera xylosteum</i>	Caprifoliaceae	Rote Heckenkirsche	37
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Caryophyllaceae	Quendel-Sandkraut	38
<i>Cerastium arvense</i>	Caryophyllaceae	Acker-Hornkraut	38
<i>Cerastium tomentosum</i>	Caryophyllaceae	Filziges Hornkraut	39
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Caryophyllaceae	Gewöhnliche Kartäuser-Nelke	39
<i>Dianthus gratianopolitanus</i>	Caryophyllaceae	Grenobler Nelke	40
<i>Moehringia muscosa</i>	Caryophyllaceae	Moos-Nabelmiere	40
<i>Moehringia trinervia</i>	Caryophyllaceae	Dreinervige Nabelmiere	41
<i>Petrohragia prolifera</i>	Caryophyllaceae	Sprossende Felsennelke	41
<i>Petrohragia saxifraga</i>	Caryophyllaceae	Steinbrech-Felsennelke	42
<i>Silene nutans</i>	Caryophyllaceae	Nickendes Leimkraut	42
<i>Silene vulgaris</i>	Caryophyllaceae	Gewöhnliches Leimkraut	43
<i>Euonymus europaeus</i>	Celastraceae	Europäisches Pfaffenhütchen	43
<i>Hylotelephium maximum</i>	Crassulaceae	Große Waldfetthenne	44


<i>Hylotelephium telephium</i>	Crassulaceae	Große Waldfetthenne	44
<i>Sedum acre</i>	Crassulaceae	Scharfer Mauerpfleffer	45
<i>Sedum album</i>	Crassulaceae	Weißen Mauerpfleffer	45
<i>Sedum dasypodium</i>	Crassulaceae	Dickblättriger Mauerpfleffer, Buckel-Fetthenne	46
<i>Sedum rupestre</i>	Crassulaceae	Felsen-Fetthenne	46
<i>Sedum sexangulare</i>	Crassulaceae	Milder Mauerpfleffer	47
<i>Carex digitata</i>	Cyperaceae	Finger-Segge	47
<i>Carex flacca</i>	Cyperaceae	Blaugrüne Segge	48
<i>Carex flava</i>	Cyperaceae	Gelb-Segge	48
<i>Carex humilis</i>	Cyperaceae	Erd-Segge	49
<i>Carex montana</i>	Cyperaceae	Berg-Segge	49
<i>Cystopteris fragilis</i>	Cystopteridaceae	Zerbrechlicher Blasenfarn	50
<i>Knautia arvensis</i>	Dipsacaceae	Acker-Witwenblume	50
<i>Scabiosa columbaria</i>	Dipsacaceae	Tauben-Skabiose	51
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Dryopteridaceae	Gewöhnlicher Wurmfarn	51
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Ericaceae	Immergrüne Bärentraube	52
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbiaceae	Zypressen Wolfsmilch	52
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Fabaceae	Echter Wundklee	53
<i>Coronilla vaginalis</i>	Fabaceae	Scheiden-Kronwicke	53
<i>Cytisus nigricans</i>	Fabaceae	Schwarzwerdender Geißklee	54
<i>Hippocrepis comosa</i>	Fabaceae	Hufeisenklee	54
<i>Hippocrepis emerus</i>	Fabaceae	Strauchwicke	55
<i>Jacobaea vulgaris</i>	Fabaceae	Jakobs Greiskraut	55
<i>Lathyrus vernus</i>	Fabaceae	Gewöhnliche Frühlings-Platterbse	56
<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae	Gewöhnlicher Hornklee	56
<i>Medicago lupulina</i>	Fabaceae	Hopfenklee	57
<i>Fagus sylvatica</i>	Fagaceae	Rot-Buche	57
<i>Geranium robertianum</i>	Geraniaceae	Stinkender Storzschnabel	58
<i>Geranium sanguineum</i>	Geraniaceae	Blut-Storzschnabel	58
<i>Ribes alpinum</i>	Grossulariaceae	Alpen-Johannisbeere	59
<i>Ribes uva-crispa</i>	Grossulariaceae	Stachelbeere	59
<i>Hypericum perforatum</i>	Hypericaceae	Tüpfel-Hartheu	60
<i>Acinos arvensis</i>	Lamiaceae	Feld-Steinquendel	60
<i>Ajuga genevensis</i>	Lamiaceae	Genfer Günsel	61
<i>Galeobdolon luteum</i>	Lamiaceae	Echte Goldnessel	61
<i>Lamium maculatum</i>	Lamiaceae	Gefleckte Taubnessel	62
<i>Origanum vulgare</i>	Lamiaceae	Gewöhnlicher Dost	62
<i>Stachys sylvatica</i>	Lamiaceae	Wald-Ziest	63
<i>Teucrium botrys</i>	Lamiaceae	Trauben-Gamander	63

<i>Teucrium chamaedrys</i>	Lamiaceae	Edel-Gamander	64
<i>Teucrium montanum</i>	Lamiaceae	Berg-Gamander	64
<i>Thymus praecox</i> subsp. <i>praecox</i>	Lamiaceae	Frühblühender Thymian	65
<i>Thymus pulegioides</i>	Lamiaceae	Arznei-Thymian	65
<i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>carniolicus</i>	Lamiaceae		66
<i>Thymus pulegioides</i> subsp. <i>Pulegioides</i>	Lamiaceae	Arznei Thymian	66
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Lentibulariaceae	Gemeines Fettblatt, Echtes Fettblatt	67
<i>Linum catharticum</i>	Linaceae	Purgier-Lein	67
<i>Epilobium collinum</i>	Onagraceae	Hügel-Weidenröschen	68
<i>Epilobium montanum</i>	Onagraceae	Berg-Weidenröschen	68
<i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>rostkoviana</i>	Orobanchaceae	Gewöhnlicher Augentrost	69
<i>Odontites luteus</i>	Orobanchaceae	Gelber Zahntrost	69
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalidaceae	Wald-Sauerklee	70
<i>Chelidonium majus</i>	Papaveraceae	Schöllkraut	70
<i>Pseudo-fumaria alba</i>	Papaveraceae	Blassgelber Lerchensporn	71
<i>Picea abies</i>	Pinaceae	Gewöhnliche Fichte	71
<i>Pinus sylvestris</i>	Pinaceae	Wald-Föhre, Gewöhnliche Kiefer	72
<i>Globularia bisnagarica</i>	Plantaginaceae	Gewöhnliche Kugelblume	72
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	Spitz-Wegerich	73
<i>Veronica teucrium</i>	Plantaginaceae	Großer Ehrenpreis	73
<i>Agrostis capillaris</i>	Poaceae	Haarstraußgras	74
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Poaceae	Glatthafer	74
<i>Brachypodium pinnatum</i>	Poaceae	Fieder-Zwenke	75
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	Poaceae	Wald-Zwenke	75
<i>Bromus hordeaceus</i>	Poaceae	Weiche Trespe	76
<i>Bromus sterilis</i>	Poaceae	Trauben Trespe	76
<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Poaceae	Wald-Reitgras	77
<i>Festuca altissima</i>	Poaceae	Wald-Schwingel	77
<i>Festuca arundinacea</i>	Poaceae	Rohr-Schwingel	78
<i>Festuca ovina</i>	Poaceae	Schaf-Schwingel	78
<i>Festuca pallens</i>	Poaceae	Blasser Schaf-Schwingel	79
<i>Melica ciliata</i> agg.	Poaceae	Wimper-Perlgras	79
<i>Melica nutans</i>	Poaceae	Nickendes Perlgras	80
<i>Poa compressa</i>	Poaceae	Platthalm-Rispengras	80
<i>Poa nemoralis</i>	Poaceae	Hain-Rispengras	81
<i>Poa pratensis</i>	Poaceae	Wiesen-Rispengras	81
<i>Sesleria caerulea</i>	Poaceae	Kalk-Blaugras	82
<i>Polygala chamaebuxus</i>	Polygalaceae	Buchsblättrige Kreuzblume	82


Rumex acetosa	Polygonaceae	Wiesen-Sauerampfer	83
Rumex acetosella	Polygonaceae	Kleiner Sauerampfer	83
Polypodium vulgare	Polypodiaceae	Gemeiner Tüpfelfarn	84
Polypodium interjectum	Polypodiaceae	Gesägter Tüpfelfarn	84
Polystichum aculeatum	Polypodiaceae	Gelappter Schildfarn, Dorniger Schildfarn	85
Aconitum napellus	Ranunculaceae	Blauer Eisenhut	85
Actaea spicata	Ranunculaceae	Christophskraut	86
Aquilegia vulgaris	Ranunculaceae	Gewöhnliche Akelei	86
Thalictrum minus	Ranunculaceae	Kleine Wiesenraute	87
Rhamnus cathartica	Rhamnaceae	Purgier-Kreuzdorn	87
Crataegus laevigata	Rosaceae	Zweigriffliger Weißdorn	88
Crataegus monogyna	Rosaceae	Eingriffeliger Weißdorn	88
Cotoneaster integrifolius	Rosaceae	Kahle Steinmispel	89
Fragaria vesca	Rosaceae	Wald-Erdbeere	89
Karpatiosorbus franconica	Rosaceae		90
Potentilla verna	Rosaceae	Frühlings-Fingerkraut	90
Prunus avium	Rosaceae	Süßkirsche, Vogelkirsche	91
Rosa canina	Rosaceae	Hunds-Rose	91
Rosa micrantha	Rosaceae	Kleinblütige Rose	92
Rosa spinosissima	Rosaceae	Reichstachelige Rose, Pimpinell-Rose	92
Rubus idaeus	Rosaceae	Himbeere	93
Sanguisorba minor	Rosaceae	Kleiner Wiesenknopf	93
Sorbus aria	Rosaceae	Gewöhnliche Mehlbeere	94
Asperula cynanchica	Rubiaceae	Hügel-Waldmeister	94
Galium anisophyllum	Rubiaceae	Ungleichblättriges Labkraut	95
Galium glaucum	Rubiaceae	Blaugrünes Labkraut	95
Galium pumilum	Rubiaceae	Niedriges Labkraut	96
Galium saxatile	Rubiaceae	Harzer Labkraut	96
Galium sylvaticum	Rubiaceae	Wald-Labkraut	97
Galium valdepilosum	Rubiaceae	Mährisches Labkraut	97
Galium verum	Rubiaceae	Echtes Labkraut	98
Populus tremula	Salicaceae	Zitter-Pappel	98
Salix caprea	Salicaceae	Sal-Weide	99
Acer pseudoplatanus	Sapindaceae	Berg-Ahorn	99
Chrysosplenium alternifolium	Saxifragaceae	Wechselblättriges Milzkraut	100
Saxifraga rosacea	Saxifragaceae	Rosen-Steinbrech	100
Saxifraga tridactylites	Saxifragaceae	Dreifingeriger Steinbrech	101
Verbascum lychnitis	Scrophulariaceae	Mehlige Königskerze	101
Taxus baccata	Taxaceae	Gewöhnliche Eibe	102
Helianthemum nummularium ssp. obscurum	Thymelaeaceae	Gewöhnliches Sonnenröschen	102

<i>Urtica dioica</i>	Urticaceae	Große Brennessel	103
<i>Sambucus nigra</i>	Viburnaceae	Schwarzer Holunder	103
<i>Viburnum lantana</i>	Viburnaceae	Wolliger Schneeball	104
<i>Viola hirta</i>	Violaceae	Behaartes Veilchen	104
<i>Viola rupestris</i>	Violaceae	Sand-Veilchen	105
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	Woodsiaceae	Ruprechtsfarn	105
<i>Woodsia ilvensis</i>	Woodsiaceae	Rostroter Wimperfarn	106

Allium lusitanicum (Amaryllidaceae) Lam.



Allium oleraceum (Amaryllidaceae) L.




Bupleurum falcatum (Apiaceae) L.

Subsp. faclatum for left image




Pimpinella saxifraga (Apiaceae) L.



Seseli libanotis (Apiaceae) (L.) W. D. J. Koch



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Berg-Heilwurz – *Seseli libanotis* 0,60–1,20
© 7–8 (weiß od. rötlich)

Vincetoxicum hirundinaria (Apocynaceae) Medik.



Weiße Schwalbenwurz – *Vincetoxicum hirundinaria* 0,30–1,40 ♂ 5–8 (gelblichweiß)

Hedera helix (Araliaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnlicher Efeu – *Hedera helix*
0,10–20,00 ♂, 9–11 (gelbgrün. Fr schwarz)

Anthericum ramosum (Asparagaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Ästige G. – *A. ramosum* 0,30–0,80 ♀ 6–8
▽ (weiß)


Asplenium ceterach (Aspleniaceae) L.



Asplenium ruta-muraria (Aspleniaceae) L.




Asplenium scolopendrium (Aspleniaceae) (L.) Newman





Hirschzunge – *Asplenium scolopendrium*
0,15–0,50 ♂ 7–8 ▽ (Pfl immergrün)

Asplenium septentrionale (Aspleniaceae) (L.) Hoffm.





Nördlicher Streifenfarn – *Asplenium septentrionale* 0,08–0,15 ♂ 7–8

Asplenium trichomanes (Aspleniaceae) L.



**Braunstieler St. – *A. trichomanes* s. l.
0,05–0,30 ♂ 7–8 (BlStiel u. Bl-Spindel bis
zur Spitze braun)

Asplenium viride (Aspleniaceae) Huds.



Grünstieler Streifenfarn – *Asplenium*
viride 0,05–0,20 ♂ 7–8 (BlStiel nur am
Grund braun)

Artemisia campestris (Asteraceae) L.

Subsp. *camperstris* for left image



**Feld-B. – *A. campestris* 0,30–0,60 ♂
8–10 (gelb od. rötlch. Bl zuerst seidig
behaart, verahlend) ↗ S. 791

Artemisia vulgaris (Asteraceae) L.



Gewöhnlicher Beifuß – *A. vulgaris*
0,60–1,50 ♂ 7–11 (gelblich od. rotbraun)

Buphthalmum salicifolium (Asteraceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica / Haupt Verlag



Weidenblatt-Rindsauge – *Buphthalmum salicifolium* 0,15–0,70 ♂ 6–9 (goldgelb)


Carlina acaulis (Asteraceae) L.

Subsp. caulescens for right image



Schmalblättrige Silberdistel – *Carlina acaulis* subsp. *caulescens* (0,03–)0,20–0,60 ♂ 7–9 ▽

Cota tinctoria (Asteraceae) L.



Gewöhnliche Hasel – *Corylus avellana*
2,00–6,00 ♂, 2–4 (♀ grün, Narben rot,
♂ grünlichgelb)

Erigeron acris ssp. *acris* (Asteraceae) L.

Left image not subspecies




****Scharfes Bl. – *E. acris* subsp. *acris***
0,10–0,30 ♂ (5–)6–7 (rötlich od. bläulich,
RöhrenBl gelb) ↗ S. 790

Erigeron annuus ssp. annuus (Asteraceae) (L.) Desf.

Left image not subspecies



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




*Feinstrahl-Berufkraut – *Erigeron annuus*
0,50–1,00 ♂ 6–9 (weiß od. hellviolett,
RöhrenB gelb) ↗ S.790

Hieracium bifidum (Asteraceae)



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




*Gabel-Habichtskraut – *Hieracium bifidum* 0,10–0,40 ♂ 5–7 (goldgelb. Bl grün
bis blaugrün)

Hieracium bupleuroides (Asteraceae) C. C. Gmel.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Hebe Verlag



*Hasenohr-H. – *H. bupleuroides* 0,20–0,60
7–8 (gelb. Bl blaugrün)

Hieracium calodon (Asteraceae) Tausch



Hieracium franconicum (Asteraceae) (Griseb.) Zahn



Hieracium harzianum (Asteraceae) Zahn



"Vulgata" type.


- Sheets 0, sit 1-3
- Sheets 5-10(-20), blue. green, lancettl. to br lancel., coarsely 1-3-toothed, in the upper third completely margined.
- Overall inflorescence loosely panicled.
- Branches 5-10.
- Head peduncles scattered hairy, moderately hostile, up to abundant. flaky.
- Heads 10-30. bracts, blunt to pointed, hair and glands moderate, to richly flaky at the margins.

Hieracium murorum agg. (Asteraceae) L.




*Wald-H. – *H. murorum* 0,20–0,60 ♂ 5–8
(gelb od. goldgelb)

Hieracium pilosella (Asteraceae) L.



Kleines Mausohrhabichtskraut – *Pilosella officinale* 0,05–0,30 ♂ 5–10 (schwefel-gelb, RandB useits meist rotstreifig)

Hieracium schmidtii (Asteraceae) aggr.



*Bleiches Habichtskraut – *Hieracium schmidtii* 0,10–0,40 ♂ 5–7 (hellgelb. Bl blaugrün)

Hieracium schneidii (Asteraceae) Schack et Zahn



HERBARIUM MUSEI PARISIENSIS

Lactuca perennis (Asteraceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Blauer L. – *L. perennis* 0,30–0,50 ♂ 5–6
(blau od. blauviolett. Bl blaugrün)

Leontodon incanus (Asteraceae) (L.) Schrank




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Grauer L. – *L. incanus* 0,15–0,45 ♂ 5–6
(goldgelb)

Leucanthemum vulgare (Asteraceae) L.




*Wiesen-Margerite – *Leucanthemum ircutianum* 0,20–0,80 24 6(–10) (weiß, RöhrenB gelb) ✕ S.791

Mycelis muralis (Asteraceae) (L.) Dumort.



Gewöhnlicher Mauerlattich – *Mycelis muralis* 0,40–0,80 24 7–8 (hellgelb)

Taraxacum sp (Asteraceae) F.H. Wigg



Kleinblütiges S. – *I. parviflora* 0,30–0,60
○ 6–9 (gelb)


Betula pendula (Betulaceae) Roth



© K. Lauber



Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche B. – *B. pendula* Bis 25,00 ♂
4–5 (♂ hell bräunlichgelb, ♀ grün)

Corylus avellana (Betulaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche Hasel – *Corylus avellana*
2,00–6,00 ♂, 2–4 (♀ grün, Narben rot,
♂ grünlichgelb)

Asperugo procumbens (Boraginaceae) L.



Schlangenäuglein – *Asperugo procumbens* 0,20–0,50 ♂ ① 5–8 (erst violett, dann blau, Schlundschuppen weiß)

Echium vulgare (Boraginaceae) L.




Gewöhnlicher Natternkopf – *Echium vulgare* 0,25–0,80 ♂ 5–10 (erst rosa, dann leuchtendblau)

Alyssum montanum (Brassicaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Berg-St. – *A. montanum* 0,10–0,20 ♂
3–5 ▽ (goldgelb)

Arabidopsis lyrata subsp. *petraea* (Brassicaceae)
L.




Felsen-Sch. – *A. petraea* 0,10–0,25 ♂ 5–7
(weiß)

Arabis alpina (Brassicaceae) L.




Alpen-G. – *A. alpina* 0,05–0,40 ♂ 3–10
(weiß)

Arabis hirsuta (Brassicaceae) L.



Behaarte G. – *A. hirsuta* 0,10–0,80 ♂ 5–7 (weiß)

Arabis turrita (Brassicaceae) L.



Turmgänsekresse – *Pseudoturritis turrita*
0,10–0,70 ♂ 4–6 (gelblichweiß)

Aurinia saxatilis (Brassicaceae) (L.) Desv.


Images/Aurinia saxatilis_1.jpg

Images/Aurinia saxatilis_2.jpg

Cardamine flexuosa (Brassicaceae) *With.*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-Sch. – *C. flexuosa* 0,10–0,50 ♂ Ⓛ ♀ 4–10 (weiß)

Cardamine impatiens (Brassicaceae) *L.*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Spring-Schaumkraut – *Cardamine impatiens* 0,10–0,85 ♂ Ⓛ 5–7 (Kr weiß, oft fehlend)

Draba aizoides (Brassicaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt




Immergrünes F. – *D. aizoides* 0,03–0,10 2
4–8 ▽ (goldgelb)

Erysimum crepidifolium (Brassicaceae) Rchb.




Bleicher Sch. – *E. crepidifolium* 0,15–0,80
⊖ ⊖ 4–6 (hellgelb)

Erysimum odoratum (Brassicaceae) *Ehrh.*




Duft-Sch. – *E. odoratum* 0,20–0,90 ♂ ⊖
5–7 (sattgelb, duftend)

Erysimum repandum (Brassicaceae) *L.*




Spreiz-Sch. – *E. repandum* 0,15–0,35 ♂ ⊖
3–6 (hellgelb)


Lunaria rediviva (Brassicaceae) L.



Noccaea montana (Brassicaceae) (L.) F.K.Mey.



Sisymbrium austriacum (Brassicaceae) *Jacq.*



Österreichische R. – *S. austriacum*
0,30–0,60 ♂ ♀ 5–6 (goldgelb)

Campanula gentilis (Campanulaceae) *Kovanda*



Very similar to *C. rotundifolia*.

Differences:



- Most **stem leafs** mostly in **lower third of stem** (*rotundifolia*: all over)
- Upper leafs threadlike (*rotundifolia*: linealistic)
- Stem with **very few or 1 flower** (*rotundifolia*: several flowers)

Campanula persicifolia (Campanulaceae) L.



Pfirsichblättrige G. – *C. persicifolia*
0,30–0,80 ♂ 6–9 (hellblau, selten weiß)

Campanula rotundifolia (Campanulaceae) L.




*Rundblättrige G. – *C. rotundifolia*
0,10–0,30 ♂ 6–10 (blauviolett)

Campanula trachelium (Campanulaceae) L.



Nesselblättrige Glockenblume –
Campanula trachelium 0,60–1,00 ♂ 7–8
(hell blauviolett bis hellblau)

Lonicera xylosteum (Caprifoliaceae) L.



rote Heckenkirsche – *L. xylosteum*
1,00–2,00 ♂ 5–6 (gelblichweiß, später
mattgelb. Fr scharlachrot)

Arenaria serpyllifolia (Caryophyllaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Quendel-Sandkraut – *Arenaria serpyllifolia* 0,03–0,30 ♂ ⚡ 5–9 (weiß. Pfl graugrün) ↗ S.786

Cerastium arvense (Caryophyllaceae) L.

Subsp. Arvense



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Acker-H. – *C. arvense* 0,03–0,30 ♀ 4–8 (weiß. Pfl grauflaumig)

Cerastium tomentosum (Caryophyllaceae) L.



**Filziges H. – *C. tomentosum* 0,15–0,30 ♂
5–7 (weiß. Pfl dicht weißfilzig)**

Dianthus carthusianorum (Caryophyllaceae) L.

Subsp. *Carthusianorum*



**Kartäuser-N. – *D. carthusianorum*
0,15–0,45 ♂ 6–9 ♀ (dunkelpurpur bis
rosa, dunkler geadert)**

Dianthus gratianopolitanus (Caryophyllaceae)
Vill.



Pfingst-Nelke – *Dianthus gratianopolitanus*
0,10–0,25 ♂ 5–6 ▽ (hellpurpur, ohne
Zeichnung. Bl blaugrün)

Moehringia muscosa (Caryophyllaceae) L.



Moos-N. – *M. muscosa* 0,05–0,20 ♂ 5–9
(weiß)

Moehringia trinervia (Caryophyllaceae) (L.) Clairv.



Dreinervige Nabelmiere – *Moehringia trinervia* 0,10–0,30 ♂ ♀ 5–7 (weiß)

Petrorhagia prolifera (Caryophyllaceae) (L.) P.W.Ball & Heywood




Sprossendes Nelkenköpfchen – *Petrorhagia prolifera* 0,15–0,45 ♂ ♂ 6–10 (rosa)

Petrorhagia saxifraga (Caryophyllaceae) (L.) Link




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Felsennelke – *P. saxifraga* 0,10–0,35 ♀
6–9 (helllila bis sattrosa, dunkler geädert)

Silene nutans (Caryophyllaceae) L.




Nickendes L. – *S. nutans* 0,30–0,50 ♀ 5–8
(weiß, USeite oft grünlich od. rötlich, nur
nachts geöffnet)

Silene vulgaris (Caryophyllaceae) (Moench) Garcke



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Gewöhnliches Leimkraut – *S. vulgaris*
0,10–0,60 ⚡ 6–9 (weiß. K grünlichweiß od.
rötlich. Pfl blagrün)

Euonymus europaeus (Celastraceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Europäisches Pfaffenhütchen –
Euonymus europaeus 1,50–3,00 ⚡ 5–6
(hellgrün. Fr rosa, SaMantel orange)

Hylotelephium maximum (Crassulaceae) (L.) Kirsch.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Große W. – *H. maximum* 0,30–0,80 ⚱ 7–9 (grünlich, selten röthich). Ähnlich Purpur-F. – *H. telephium* (Bl rosa bis dunkelrot. Fr außen rinnig. Bl Grund keilförmig verschmälert, alle Bl wechselständig)

Hylotelephium telephium (Crassulaceae) (L.) H. Ohba.

Subsp. *telephium* for image 1




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Große W. – *H. maximum* 0,30–0,80 ⚱ 7–9 (grünlich, selten röthlich). Ähnlich Purpur-F. – *H. telephium* (Bl rosa bis dunkelrot. Fr außen rinnig. Bl Grund keilförmig verschmälert, alle Bl wechselständig)

Sedum acre (Crassulaceae) L.




Scharfer Mauerpfeffer – *Sedum acre*
0,03–0,15 ♂ 6–8 (gelb)

Sedum album (Crassulaceae) L.




**Weiße F. – *S. album* 0,08–0,20 ♂ 6–9
(weiß)**

Sedum dasyphyllum (Crassulaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Buckel-F. – *S. dasyphyllum* 0,03–0,10 24
6–8 (weiß, außen zuweilen rötlich)

Sedum rupestre (Crassulaceae) L.





© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



*Felsen-Fetthenne – *Sedum rupestre*
0,10–0,35 24 6–8 (gelb) ↗ S. 784

Sedum sexangulare (Crassulaceae) L.



Milder M. – *S. sexangulare* 0,05–0,15 2
6–7 (gelb)

Carex digitata (Cyperaceae) L.




Finger-S. – *C. digitata* 0,10–0,30 2 5
(Sp rotbraun, grün gekielt, weißrandig.
Pfl unten dunkelrot)

Carex flacca (Cyperaceae) Schreber




Blaugrüne S. – *C. flacca* 0,20–0,60 ♂ 5–7
(Sp schwarzbraun, Schläuche grün od. schwarz)

Carex flava (Cyperaceae) L. s. str.




Gelb-Segge – *Carex flava* 0,20–0,60 ♂ 5–9 (Sp gelb- bis rostbraun, grün gekielt,
Schläuche hellgelb, Pfl gelbgrün)

Carex humilis (Cyperaceae) Leyss.



Erd-S. – *C. humilis* 0,03–0,15 ♂ 4–5
(Sp braun, weißrandig. Pfl unten rot. Bl
graugrün)

Carex montana (Cyperaceae) L.



Berg-S. – *C. montana* 0,10–0,30 ♂ 3–5
(Sp braun, Schläuche grün, oben oft braun.
Pfl unten rot)

Cystopteris fragilis (Cystopteridaceae) (L.) Bernh.



Zerbrechlicher B. – *C. fragilis* 0,10–0,50 2l
7–9; (Spore unten: Runzelsporiger B. – *C. dickieana*) ▾ S. 781

Knautia arvensis (Dipsacaceae) (L.) Coult.




*Acker-Witwenblume – *Knautia arvensis*
0,30–0,80 2l 7–8 (bläulichrot bis violett)

Scabiosa columbaria (Dipsacaceae) L.



Tauben-S. – *S. columbaria* 0,25–0,60 2⁴
7–11 (blaulila, KBorsten schwärzlich)

Dryopteris filix-mas (Dryopteridaceae) (L.) Schott




Gewöhnlicher W. – *D. filix-mas* 0,30–1,20
2⁴ 7–9

Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) L.




©K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Echte Bärentraube – *Arctostaphylos uva-ursi* 0,20–0,60 h 3–7 ▽ (weiß bis rosa, KrZipfel rötlich. Fr rot)

Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae) L.



Zypressen-Wolfsmilch – *Euphorbia cyparissias* 0,15–0,30 d 4–5 (grünlichgelb, später rötend)

Anthyllis vulneraria (Fabaceae) L.




**Gewöhnlicher Wundklee – *Anthyllis vulneraria* 0,05–0,60(–0,90) ♂ 5–8 (gelb, weißlich od. rötlich)

Coronilla vaginalis (Fabaceae) Lam.



Scheiden-Kronwicke – *Coronilla vaginalis* 0,05–0,10 h, 5–7 (gelb)

Cytisus nigricans (Fabaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Schwarzwerdender Geißklee – *Cytisus nigricans* 0,30–1,20 h, h, 6–8 (gelb. Bl trocken schwarz)

Hippocrepis comosa (Fabaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hufeisenklee – *H. comosa* 0,08–0,25 2f h, 5–7 (gelb)


Hippocrepis emerus (Fabaceae) L.

Subsp. Lassen



Strauchwicke – *Hippocrepis emerus* 1,00–2,00 ♂; 5–7 (gelb)

Jacobaea vulgaris (Fabaceae) L.



**Jakobs-G. – *S. jacobaea* 0,30–1,00 ♂ ⊖ ⊙
♀ 7–9 (goldgelb) ✕ S. 790

Lathyrus vernus (Fabaceae) (L.) Bernh.

Subsp. Vernus




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Frühlings-P. – *L. vernus* 0,20–0,40 ♂ 4–5
(purpur, später blaugrün)

Lotus corniculatus (Fabaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




*Gewöhnlicher H. – *L. corniculatus*
0,20–0,30(–0,50) ♂ 6–8 (gelb, außen ± rot
gezeichnet, getrocknet grünlich) ↗ S. 785

Medicago lupulina (Fabaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hopfen-Luzerne – *Medicago lupulina*
0,15–0,60 ♂ bis ♀ 5–10 (gelb)

Fagus sylvatica (Fagaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Rot-Buche – *Fagus sylvatica* Bis 40,00 ♂
4–5 (rötlichbraun)

Geranium robertianum (Geraniaceae) L.

Subsp. Robertianum



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Stinkender St. – *G. robertianum*
0,20–0,40 ♂ ♂ 5–10 (hellpurpur)

Geranium sanguineum (Geraniaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Blut-Storchschnabel – *Geranium sanguineum* 0,15–0,50 ♀ 6–8 (purpurrot)

Ribes alpinum (Grossulariaceae) L.



Alpen-Johannisbeere – *Ribes alpinum*
0,80–1,50 ᅵ, 4–5 (grünlichgelb, unvollkommen
zweihäusig. Fr rot)

Ribes uva-crispa (Grossulariaceae) L.




Stachelbeere – *Ribes uva-crispa* 0,60–1,20
ሻ, 4–5 (grünlichgelb. Fr grün, gelb od.
purpurn)

Hypericum perforatum (Hypericaceae) L.

Subsp. Perforatum



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Tüpfel-H. – *H. perforatum* 0,15–0,80 ♂
6–8 (goldgelb, wie KBl schwarz punktiert)

Acinos arvensis (Lamiaceae)



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnlicher S. – *A. arvensis* 0,10–0,30
♂ ♀ 6–9 (bläsiglila)

Ajuga genevensis (Lamiaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Heide-G. – *A. genevensis* 0,07–0,30 ♂ 4–6
(meist dunkelblau)

Galeobdolon luteum (Lamiaceae) L.

Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. *galeobdolon*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Echte Goldnessel – *Galeobdolon luteum*
0,15–0,40 ♂ 5–7 (gelb)

Lamium maculatum (Lamiaceae) L.




Gefleckte T. – *L. maculatum* 0,15–0,60 ♂
4–9 (purpur)

Origanum vulgare (Lamiaceae) L.



**Gewöhnlicher Dost – *Origanum vulgare*
0,20–0,60 ♂ 7–9 (hellpurpur, selten weiß)
↗ S. 788

Stachys sylvatica (Lamiaceae) L.



Wald-Z. – *S. sylvatica* 0,30–1,00 ♀ 6–9
(dunkel braunrot)

Teucrium botrys (Lamiaceae) L.




Trauben-Gamander – *Teucrium botrys*
0,10–0,40 ♂ ♂? 7–9 (rötlich)

Teucrium chamaedrys (Lamiaceae) L.



Edel-Gamander – *Teucrium chamaedrys*
0,10–0,30 h 7–9 (hellpurpur)

Teucrium montanum (Lamiaceae) L.




Berg-G. – *T. montanum* 0,05–0,35 h 6–9
(hellgelb)

Thymus praecox subsp. *praecox* (Lamiaceae)




© K. Laubach - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Frühblühender Th. – *Th. praecox*
0,03–0,15 h 5–7 (hell- bis dunkelpurpur)
↗ S. 788

Thymus pulegioides (Lamiaceae) L.



*Arznei-Th. – *Th. pulegioides* 0,05–0,30 h
6–9 (hell- bis dunkelpurpur) ↗ S. 788

Thymus pulegioides subsp. *carniolicus* (Lamiaceae) P.A.Schmidt



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag

Thymus pulegioides subsp. *Pulegioides* (Lamiaceae) L.




*Arznei-Th. – *Th. pulegioides* 0,05–0,30 h
6–9 (hell- bis dunkelpurpur) ✚ S. 788

Pinguicula vulgaris (Lentibulariaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Echtes F. – *P. vulgaris* 0,05–0,15 ♀ 5–6 ▽
(violettblau)

Linum catharticum (Linaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Purgier-Lein – *Linum catharticum*
0,05–0,30 ♂ 6–7 (weiß, Grund gelb)

Epilobium collinum (Onagraceae) C. C. Gmel.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hügel-W. – *E. collinum* 0,10–0,40 ♂ 6–9
(rosa. Stg graugrün)

Epilobium montanum (Onagraceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Berg-W. – *E. montanum* 0,10–0,80 ♂ 6–9
(rosa. Stg grasgrün)


Euphrasia officinalis subsp.
(Orobanchaceae) (Hayne) F. Towns.

rostkoviana



Gewöhnlicher A. – *E. officinalis* 0,01–0,45
∅ 5–10 (weiß, bläulich od. gelb) ✕ S. 788

Odontites luteus (Orobanchaceae) (L.) Clairv.




Gelber Z. – *O. luteus* 0,15–0,60 ∅ 7–10
(gelb)

Oxalis acetosella (Oxalidaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-Sauerklee – *Oxalis acetosella*
0,05–0,12 ♂ 4–5 (weiß, purpur geaderd)

Chelidonium majus (Papaveraceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Schöllkraut – *Chelidonium majus*
0,30–0,70 ♂ 4–10 (gelb. Milchsaft orange)

Pseudo-fumaria alba (Papaveraceae) (Mill.) Lidén



Blassgelber S. – *P. alba* 0,10–0,40 ♀
6–10 (weißlich, Spitze dunkler, gelblich. Bl
beidseits blaugrün)

Picea abies (Pinaceae) (L.) H.Karst.




Gewöhnliche F. – *P. abies*
Bis 50,00 (~60,00) ♂ 4–6 (Nadeln allseits
dunkelgrün. Zapfen braun)

Pinus sylvestris (Pinaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




****Gewöhnliche Kiefer – *Pinus sylvestris***
Bis 30,00(–40,00) ♂ 5–6 (Zapfen matt grau-bräun. Stamm oben hell rotbraun)

Globularia bisnagarica (Plantaginaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Gewöhnliche K. – *G. bisnagarica*
0,05–0,30 ♀ 5–6 ▽ (blaulila)

Plantago lanceolata (Plantaginaceae) L.



Spitz-Wegerich – *Plantago lanceolata*
0,10–0,50 ♂ 5–9 (StaubBl blassgelb, Kr
bräunlich)

Veronica teucrium (Plantaginaceae) L.




Großer E. – *V. teucrium* 0,30–0,80 ♂ 6–7
(azurblau, dunkler geädert)

Agrostis capillaris (Poaceae) L.



© K. Lauber

Flora Helvetica - Haupt Verlag



Rotes Straußgras – *Agrostis capillaris*

0,20–0,80 ♂ 6–7 (variabel)

Arrhenatherum elatius (Poaceae) (L.) J. Presl & C. Presl



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Glatthafer – *Arrhenatherum elatius*

0,60–1,20 ♂ 6–7

***Brachypodium pinnatum* (Poaceae) (L.) P. Beauv.**



*Fieder-Zwenke – *Brachypodium pinnatum* 0,60–1,00 ♂ 6–7

***Brachypodium sylvaticum* (Poaceae) (Huds.) P. Beauv.**



Wald-Z. – *B. sylvaticum* 0,60–1,20 ♂ 7–8

© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag

Bromus hordeaceus (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Weiche T. – *B. hordeaceus* 0,05–0,80 ♂
thominei 0,05–0,15 ♂ ① ♂ 5–7 ✕ S. 783

Bromus sterilis (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Taube T. – *B. sterilis* 0,30–0,60 ♂ ① 5–6

Calamagrostis arundinacea (Poaceae) (L.) Roth



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Wald-R. - *C. arundinacea* 0,60–1,20 2 6–7

Festuca altissima (Poaceae) All.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-Sch. - *F. altissima* 0,60–1,20 2 6–7

Festuca arundinacea (Poaceae) Schreb.





© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Rohr-Sch. – *F. arundinacea* 0,60–1,80 ♂
6–7 (GrundBl Scheiden weißlich)

Festuca ovina (Poaceae) L. agg.





**Schaf-Sch. – *F. ovina* 0,20–0,70 ♂ 5–8

© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag

Festuca pallens (Poaceae) Host



Melica ciliata agg. (Poaceae) L.




**Wimper-P. – *M. ciliata* 0,20–0,70 ♂ 6
(Bl graugrün)

Melica nutans (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Nickendes P. – *M. nutans* 0,30–0,60 ♂ 5–6
(Hsp braunrot)

Poa compressa (Poaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Platthalm-R. – *P. compressa* 0,20–0,80
♀ 6–7

Poa nemoralis (Poaceae) L.




Poa pratensis (Poaceae) L.



Sesleria caerulea (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Kalk-B. – *S. caerulea* 0,10–0,45 ♂ 3–5

Polygala chamaebuxus (Polygalaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Zwergbüchs – *Polygala chamaebuxus*
0,10–0,25 ♂ 4–8 (gelb-weiß, selten röthlich
überlaufen)

Rumex acetosa (Polygonaceae) L.



Wiesen-Sauerampfer – *Rumex acetosa*
0,30–1,00 ♀ 5–7 (rötlichgrün)


Rumex acetosella (Polygonaceae) L.



**Kleiner S. – *R. acetosella* 0,10–0,30 ♀
5–7 (grünlich. Formenreich)

Polypodium vulgare (Polypodiaceae) L.


Leaf blade 3.5 - 5 times longer than broad, spores ripen July-august




Gewöhnlicher Tüpfelfarn – *Polypodium vulgare* 0,10–0,50 ♂ 8–9 (Sori schleierlos)

Polypodium interjectum (Polypodiaceae) Shivas

Leaf blade 1.5 - 2.5 (3) times longer than broad, spores ripen august-september





Images/Polypodium_interjectum_1.jpg



Images/Polypodium_interjectum_2.jpg

Polystichum aculeatum (Polypodiaceae) (L.) Roth



3 Dorniger Sch. – *P. aculeatum* 0,60–1,00 ♂
8–9 ▽ (Bl ledig, immergrün)

Aconitum napellus (Ranunculaceae) L.




Blauer E. – *A. napellus* subsp. *lusitanicum*
0,30–2,00 ♂ 6–8 ▽ (tiefblau bis
dunkelviolett) ↗ S. 783

Actaea spicata (Ranunculaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Christophskraut – *Actaea spicata*
0,30–0,60 ♂ 5–6 (weiß. Fr schwarz)

Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Gewöhnliche Akelei – *Aquilegia vulgaris*
0,40–0,80 ♀ 5–7 ▽ (blauviolett, selten rosa
od. weiß)

Thalictrum minus (Ranunculaceae) L.



**Kleine W. – *Th. minus* 0,15–1,20 ♂ 5–8
(gelblich)

Rhamnus cathartica (Rhamnaceae) L.




Purgier-K. – *Rh. cathartica* 1,00–3,00
♂ 5–6 (gelblichgrün. Fr von grün sofort
schwarz färbend)

Crataegus laevigata (Rosaceae) (Poir.) DC.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Zweigriffliger Weißdorn – *Crataegus laevigata* subsp. *laevigata* Bis 8,00 ₩, 5 (weiß. Fr dunkelrot. Auch Baum)

Crataegus monogyna (Rosaceae) Jacq.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Eingriffliger W. – *C. monogyna* Bis 12,00 ₩, 5–6 (weiß od. rot. Fr dunkelrot. BlUSeite bläulichgrün. Auch Strauch)

Cotoneaster integerrimus (Rosaceae) Medik.



© K. Lauber Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche Zwergmispel – *Cotoneaster integerrimus* 0,50–2,00 ♂, 4–5 △ (weiß od. rosa. Fr rot, selten weiß)

Fragaria vesca (Rosaceae) L.



© K. Lauber Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-E. – *F. vesca* 0,05–0,20 ♀ 5–6
(weiß. Spitzen der BlZähne hellrosa, grün gesäumt)


Karpatiosorbus franconica (Rosaceae) (Bornm.) Senikov & Kurtto



Potentilla verna (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Frühlings-K. – *P. vernalis* 0,05–0,30 ♀
4–6 ▽ (gelblichweiß, außen hellviolet
überlaufen)

Prunus avium (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




****Vogel-Kirsche, Süß-K. – *P. avium***
Bis 25,00 m 4–5 (weiß. Fr schwarzrot bis gelbrot)

Rosa canina (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hunds-R. – *R. canina* 1,00–3,50 m 5–7
(blassrosa od. weiß. Formenreich)

Rosa micrantha (Rosaceae) Borrer ex Sm.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Kleinblütige R. – *R. micrantha*
(1,00–)2,00–3,00 ₋ 6–7 (weiß od. blassrosa. Bl schwach nach Apfel duftend)

Rosa spinosissima (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Pimpinell-R. – *R. spinosissima* 0,20–1,20 ₋ 5–6 (weiß, gelblich, selten blassrosa. Fr schwarzbraun)

Rubus idaeus (Rosaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Himbeere – *R. idaeus* 0,60–2,00 ♂ 5–6
(weiß. Fr rot. Bl. Seite weißfilzig. Stacheln
violett)

Sanguisorba minor (Rosaceae) Scop.




****Kleiner Wiesenknopf** – *Sanguisorba minor* 0,15–0,50(–0,80) ♂ 5–8 (erst grünlich, dann rötlich)

Sorbus aria (Rosaceae) agg.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



***Gewöhnliche Mehlebeere** – *Sorbus aria*
Bis 10,00 m, 5–6 (weiß. Fr orange bis rot.
BluSeite weißfilzig)

Asperula cynanchica (Rubiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hügel-M. – *A. cynanchica* 0,05–0,30 m
6–9 (weiß, außen rosa überlaufen)

Galium anisophyllum (Rubiaceae) vill.



Galium glaucum (Rubiaceae) L.



Galium pumilum (Rubiaceae) Murray



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Heide-L. – *G. pumilum* 0,10–0,40 ♂ 6–8
(weiß)

Galium saxatile (Rubiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Harzer L. – *G. saxatile* 0,08–0,25 ♀ 6–8
(weiß, in der Knospe manchmal leicht rosa
getönt)

Galium sylvaticum (Rubiaceae) L.




Wald-L. – *G. sylvaticum* 0,30–1,00 ♂ 7–8
(weiß. Ganze Pfl blaugrün)

Galium valdepilosum (Rubiaceae) Heinr. Braun



Galium verum (Rubiaceae) L.

Subsp. verum



*Echtes Labkraut – *Galium verum*
0,20–0,70 ♂ 6–9 (zitronen- bis goldgelb)
↗ S. 787

Populus tremula (Salicaceae) L.



Zitter-P. – *P. tremula* Bis 25,00 ♂, 3–4
(♂ purpurgrau, ♀ rötlich, Narben purpur)

Salix caprea (Salicaceae) L.




Sal-Weide – *Salix caprea* 3,00–10,00 h; ♂ 3–4 (♂ goldgelb, ♀ grün. Zweige kahl, nur anfangs weißhaarig)

© K. Lauber - Flora Helvetica, Haupt Verlag

Acer pseudoplatanus (Sapindaceae) L.




Chrysosplenium alternifolium (Saxifragaceae) L.




Wechselblättriges Milzkraut –
Chrysosplenium alternifolium 0,15–0,20 ♂
4–6 (gelb. HochBl gelbgrün)

Saxifraga rosacea (Saxifragaceae) Moench



**Rasen-St. – *S. rosacea* 0,05–0,25 ♂ 5–7 ▽ (weiß. Bl weich. Dargestellt ist subsp.
rosacea.)

Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae) L.



Finger-Steinbrech – *Saxifraga tridactylites*
0,02–0,18 ♂ Ⓛ 4–6 (weiß)

Verbascum lychnitis (Scrophulariaceae) L.




Mehlige Königskerze – *Verbascum lychnitis* 0,60–1,20 ♂ Ⓛ 6–8 (hellgelb od.
weiß, Staubfäden weißwollig)

Taxus baccata (Taxaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche Eibe – *Taxus baccata*

Bis 15,00(–18,00) h 3–5 △ (Nadeln oseits dunkelgrün, useits heller. Samenmantel rot)

Helianthemum nummularium ssp. *obscureum* (Thymelaeaceae) (Cesak.) Holub



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Gewöhnliches Sonnenröschen –

Helianthemum nummularium 0,10–0,20 h
5–10 (gelb od. gelblichweiß)

Urtica dioica (Urticaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Große Brennnessel – *Urtica dioica* 0,30–1,50 ♂ 7–10 (grün. Pfl meist 2häusig, seltener 1häusig. Brennhaare u. kurze drüslose Haare. BlStiele flaumhaarig. BIOSeite dunkelgrün, matt od. kaum glänzend) ↗ S. 785

Sambucus nigra (Viburnaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Schwarzer Holunder – *Sambucus nigra* 3,00–7,00 ♂ 6–7 (weiß, Staubbeutel hellgelb. Fr über rötlichbraun reif schwarz. FrStiele oft rot überlaufen. StgMark weiß)

Viburnum lantana (Viburnaceae) L.



Wolliger Sch. – *V. lantana* 1,00–3,00 ♂
4–6 (schmutzigweiß. Fr erst rot, vollreif
schwarz)

Viola hirta (Violaceae) L.



Behaartes V. – *V. hirta* 0,05–0,25 ♀ 4–5
(blau, Sporn röthlichviolett)

Viola rupestris (Violaceae) F.W.Schmidt



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Sand-V. – *V. rupestris* 0,03–0,08 ♂ 5–6
(blauviolett, selten röthlich)

Gymnocarpium robertianum (Woodsiaceae) (Hoffm.) Newman





© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Ruprechtsfarn – *Gymnocarpium robertianum* 0,15–0,55 ♂ 7–8

Woodsia ilvensis (Woodsiaceae) (L.) R. Br.



Rostroter W. – *W. ilvensis* 0,10–0,20 ♀
7–8 ▽

Non-Vascular Plants

Bryophytes

Hornworts

- Thalloid body like some liverworts
- Reproductive structures: elongated and horn-like



Bryophytes

Liverworts

- Leafy like mosses, but flatter, more ribbon-like appearance, less obvious differentiation between stems and leaves
- Thalloid: flat and spread out like a thin crust.



Bryophytes

Mosses: Acrocarpous mosses

- Clearly differentiated stems and leaves
- Growth pattern: upright, tend to form dense clumps
- Reproductive placement: reproductive structures at the top of vertical stems
- Environmental preference: adaptive to varying moisture conditions, can survive drying



Bryophytes

Mosses: Pleurocarpous mosses

- Growth pattern: Pleurocarpous mosses spread out, forming mats
- Reproductive placement: along the sides of branches
- Environmental preference: consistently wet habitats



Lichens

Crustose

- Crust adhering tightly to the substrate
- Cannot be removed without damaging the substrate
- Most common morphotype in cliff plots!



Lichens

Foliose

- Leaf-like lichens
- Attached at some points: some parts lift away from the substrate.
- Flat, leafy appearance, distinct upper and lower surface



Lichens

Fruticose

- Bushy or hair-like
- Grow away from the substrate in all directions
- Often cylindrical or branched
- Do not have a distinct upper and lower surface.

