

MIREN Rocks Frankenjura

Species identification booklet

Frankenjura



MIREN Rocks Frankenjura

Species identification booklet

Frankenjura

March 2025

Principal Investigator: Prof. Dr. Anke Jentsch

Team:

Thomas Deola, Maja Lecher, Lukas Nietsch,
Katrín Schönhofer, Peter Wolff

Contact: anke.jentsch@uni-bayreuth.de
Disturbance Ecology and Vegetation Dynamics,
University of Bayreuth, Germany

Sources:

Plant photos by Flora Helvetica. 6th Edition

Plant Sketches by Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland, Atlasband, 12th Edition 2013,
Springer

Species list

Species	Family	Local name	Page
<i>Acer pseudoplatanus</i>	<i>Sapindaceae</i>	Berg-Ahorn	96
<i>Acinos arvensis</i>	<i>Lamiaceae</i>	Feld-Steinquendel	59
<i>Aconitum napellus</i>	<i>Ranunculaceae</i>	Blauer Eisenhut	83
<i>Actaea spicata</i>	<i>Ranunculaceae</i>	Christophskraut	83
<i>Agrostis capillaris</i>	<i>Poaceae</i>	Haarstraussgras	71
<i>Ajuga genevensis</i>	<i>Lamiaceae</i>	Genfer Günsel	59
<i>Allium lusitanicum</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	Berg-Lauch	7
<i>Allium oleraceum</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	Gemüse-Lauch	7
<i>Allium senescens</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	→ <i>Allium lusitanicum</i>	7
<i>Alyssum montanum</i>	<i>Brassicaceae</i>	Berg-Steinkraut	26
<i>Anthemis tinctoria</i>	<i>Asteraceae</i>	→ <i>Cota tinctoria</i>	16
<i>Anthericum ramosum</i>	<i>Asparagaceae</i>	Ästige Graslilie	10
<i>Anthyllis vulneraria</i>	<i>Fabaceae</i>	Echter Wundklee	51
<i>Aquilegia vulgaris</i>	<i>Ranunculaceae</i>	Gewöhnliche Akelei	84
<i>Arabidopsis lyrata subsp. <i>petraea</i></i>	<i>Brassicaceae</i>	Arabis petraea	27
<i>Arabis alpina</i>	<i>Brassicaceae</i>	Alpen Gänsekresse	27
<i>Arabis hirsuta</i>	<i>Brassicaceae</i>	Behaarte Gänsekresse	28
<i>Arabis turrita</i>	<i>Brassicaceae</i>	Turm-Gänsekresse	28
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	<i>Ericaceae</i>	Immergrüne Bärentraube	50
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	Quendel-Sandkraut	36
<i>Aria edulis</i>	<i>Rosaceae</i>	→ <i>Sorbus aria</i>	91
<i>Arrhenatherum elatius</i>	<i>Poaceae</i>	Glatthafer	72
<i>Artemisia campestris</i>	<i>Asteraceae</i>	Feld-Beifuß	14
<i>Artemisia vulgaris</i>	<i>Asteraceae</i>	Gemeiner Beifuß	14
<i>Asperugo procumbens</i>	<i>Boraginaceae</i>	Schlangenäuglein	25
<i>Asperula cynanchica</i>	<i>Rubiaceae</i>	Hügel-Waldmeister	92
<i>Asplenium ceterach</i>	<i>Aspleniaceae</i>	Milzfarn, Schriftfarn	11
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	<i>Aspleniaceae</i>	Mauer-Streifenfarn, Mauerraute	11
<i>Asplenium scolopendrium</i>	<i>Aspleniaceae</i>	Hirschzunge	12
<i>Asplenium septentrionale</i>	<i>Aspleniaceae</i>	Nordischer Streifenfarn	12
<i>Asplenium trichomanes</i>	<i>Aspleniaceae</i>	Braunstieler Streifenfarn	13
<i>Asplenium viride</i>	<i>Aspleniaceae</i>	Grünstieler Streifenfarn	13
<i>Aurinia saxatilis</i>	<i>Brassicaceae</i>	Felsensteinkraut	29
<i>Betula pendula</i>	<i>Betulaceae</i>	Gewöhnliche Birke	24
<i>Brachypodium pinnatum</i>	<i>Poaceae</i>	Fieder-Zwenke	72
<i>Brachypodium sylvaticum</i>	<i>Poaceae</i>	Wald-Zwenke	73
<i>Bromus hordeaceus</i>	<i>Poaceae</i>	Weiche Trespe	73
<i>Bromus sterilis</i>	<i>Poaceae</i>	Trauben Trespe	74
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	<i>Asteraceae</i>	Weidenblatt-Rindsauge	15
<i>Bupleurum falcatum</i>	<i>Apiaceae</i>	Sichelblättriges Hasenohr	8

<i>Calamagrostis arundinacea</i>	Poaceae	Wald-Reitgras	74
<i>Campanula gentilis</i>	Campanulaceae	Edel-Glockenblume	34
<i>Campanula persicifolia</i>	Campanulaceae	Pfirsichblättrige Glockenblume	34
<i>Campanula rotundifolia</i>	Campanulaceae	Rundblättrige Glockenblume	35
<i>Campanula trachelium</i>	Campanulaceae	Nesselblättrige Glockenblume	35
<i>Cardamine flexuosa</i>	Brassicaceae	Wald-Schaumkraut	29
<i>Cardamine impatiens</i>	Brassicaceae	Spring-Schaumkraut	30
<i>Cardaminopsis petraea</i>	Brassicaceae	→ <i>Arabidopsis lyrata</i> subsp. <i>petraea</i>	27
<i>Carex digitata</i>	Cyperaceae	Finger-Segge	46
<i>Carex flacca</i>	Cyperaceae	Blaugrüne Segge	46
<i>Carex flava</i>	Cyperaceae	Gelb-Segge	47
<i>Carex humilis</i>	Cyperaceae	Erd-Segge	47
<i>Carex montana</i>	Cyperaceae	Berg-Segge	48
<i>Carlina acaulis</i>	Asteraceae	Schmalblättrige Siberdistel	15
<i>Cerastium arvense</i>	Caryophyllaceae	Acker-Hornkraut	37
<i>Cerastium tomentosum</i>	Caryophyllaceae	Filziges Hornkraut	37
<i>Chelidonium majus</i>	Papaveraceae	Schöllkraut	68
<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	Saxifragaceae	Wechselblättriges Milzkraut	97
<i>Coronilla vaginalis</i>	Fabaceae	Scheiden-Kronwicke	52
<i>Corydalis alba</i> (Mill.) Mansf.	Papaveraceae	→ <i>Pseudo-fumaria alba</i>	68
<i>Corylus avellana</i>	Betulaceae	Haselstrauch	25
<i>Cota tinctoria</i>	Asteraceae	Färber-Hundskamille	16
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Rosaceae	Kahle Steinmispel	86
<i>Crataegus laevigata</i>	Rosaceae	Zweigriffliger Weißdorn	85
<i>Crataegus monogyna</i>	Rosaceae	Eingriffeliger Weißdorn	86
<i>Cystopteris fragilis</i>	Cystopteridaceae	Zerbrechlicher Blasenfarn	48
<i>Cytisus nigricans</i>	Fabaceae	Schwarzwerdender Geißklee	52
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Caryophyllaceae	Gewöhnliche Kartäuser-Nelke	38
<i>Dianthus gratianopolitanus</i>	Caryophyllaceae	Grenobler Nelke	38
<i>Draba aizoides</i>	Brassicaceae	Immergrünes Felsenblümchen	30
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Dryopteridaceae	Gewöhnlicher Wurmfarn	50
<i>Echium vulgare</i>	Boraginaceae	Gemeiner Natternkopf	26
<i>Epilobium collinum</i>	Onagraceae	Hügel-Weidenröschen	65
<i>Epilobium montanum</i>	Onagraceae	Berg-Weidenröschen	66
<i>Erigeron acris</i> ssp. <i>acris</i>	Asteraceae	Scharfes Berufkraut	16
<i>Erigeron annuus</i> ssp. <i>annuus</i>	Asteraceae	Gewöhnliches Einjähriges Berufkraut	17


<i>Erysimum crepidifolium</i>	Brassicaceae	Bleicher Schöterich	31
<i>Erysimum odoratum</i>	Brassicaceae	Duft-Schöterich	31
<i>Erysimum repandum</i>	Brassicaceae	Spreiz-Schöterich	32
<i>Euonymus europaeus</i>	Celastraceae	Europäisches Pfaffenbüschel	42
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euphorbiaceae	Zypressen Wolfsmilch	51
<i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>rostkoviana</i>	Orobanchaceae	Gewöhnlicher Augentrost	66
<i>Euphrasia rostkoviana</i>	Orobanchaceae	→ <i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>rostkoviana</i>	66
<i>Fagus sylvatica</i>	Fagaceae	Rot-Buche	56
<i>Festuca altissima</i>	Poaceae	Wald-Schwingel	75
<i>Festuca arundinacea</i>	Poaceae	Rohr-Schwingel	75
<i>Festuca ovina</i>	Poaceae	Schaf-Schwingel	76
<i>Festuca pallens</i>	Poaceae	Blasser Schaf-Schwingel	76
<i>Fragaria vesca</i>	Rosaceae	Wald-Erdbeere	87
<i>Galeobdolon luteum</i>	Lamiaceae	Echte Goldnessel	60
<i>Galium anisophyllum</i>	Rubiaceae	Ungleichblättriges Labkraut	92
<i>Galium glaucum</i>	Rubiaceae	Blaugrünes Labkraut	93
<i>Galium pumilum</i>	Rubiaceae	Niedriges Labkraut	93
<i>Galium saxatile</i>	Rubiaceae	Harzer Labkraut	94
<i>Galium sylvaticum</i>	Rubiaceae	Wald-Labkraut	94
<i>Galium verum</i>	Rubiaceae	Echtes Labkraut	95
<i>Geranium robertianum</i>	Geraniaceae	Stinkender Storzschnabel	56
<i>Geranium sanguineum</i>	Geraniaceae	Blut-Storzschnabel	57
<i>Globularia bisnagarica</i>	Plantaginaceae	Gewöhnliche Kugelblume	70
<i>Globularia punctata</i>	Plantaginaceae	→ <i>Globularia bisnagarica</i>	70
<i>Gymnocarpium robertianum</i>	Woodsiaceae	Ruprechtsfarn	102
<i>Hedera helix</i>	Araliaceae	Gewöhnlicher Efeu	10
<i>Helianthemum nummularium</i> ssp. <i>obscurum</i>	Thymelaeaceae	Gewöhnliches Sonnenröschen	99
<i>Hieracium bifidum</i>	Asteraceae	Gabeliges Habichtskraut	17
<i>Hieracium bupleuroides</i>	Asteraceae	Hasenohr-Habichtskraut	18
<i>Hieracium calodon</i>	Asteraceae	Pannonicisches Mausohrhabichtskraut	18
<i>Hieracium franconicum</i>	Asteraceae	Fränkisches Habichtskraut	19
<i>Hieracium harzianum</i>	Asteraceae	Ehrenbürg-Habichtskraut	19
<i>Hieracium murorum</i> agg.	Asteraceae	Wald-Habichtskraut	20
<i>Hieracium pilosella</i>	Asteraceae	Mausohrhabichtskraut	20
<i>Hieracium schmidtii</i>	Asteraceae	Bleiches Habichtskraut	21
<i>Hieracium schneidii</i>	Asteraceae	Schneid-Habichtskraut	21
<i>Hippocrepis comosa</i>	Fabaceae	Hufeisenklee	53

<i>Hippocratea emerus</i>	Fabaceae	Strauchwicke	53
<i>Hydrophyllum maximum</i>	Crassulaceae	Große Waldfetthenne	42
<i>Hydrophyllum telephium</i>	Crassulaceae	Große Waldfetthenne	43
<i>Hypericum perforatum</i>	Hypericaceae	Tüpfel-Hartheu	58
<i>Impatiens parviflora</i>	Balsaminaceae	Kleines Springkraut	24
<i>Jacobaea vulgaris</i>	Fabaceae	Jakobs Greiskraut	54
<i>Karpatisosorus francoonica</i>	Rosaceae		87
<i>Knautia arvensis</i>	Dipsacaceae	Acker-Witwenblume	49
<i>Lactuca perennis</i>	Asteraceae	Blauer Lattich	22
<i>Lamium galeobdolon</i>	Lamiaceae	→ <i>Galeobdolon luteum</i>	60
<i>Lamium maculatum</i>	Lamiaceae	Gefleckte Taubnessel	60
<i>Lathyrus vernus</i>	Fabaceae	Gewöhnliche Frühlings-Platterbse	54
<i>Leontodon incanus</i>	Asteraceae	Grauer Löwenzahn	22
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	Asteraceae	→ <i>Leucanthemum vulgare</i>	23
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Asteraceae	Wiesen-Margerite	23
<i>Libanotis pyrenaica</i>	Apiaceae	→ <i>Seseli libanotis</i>	9
<i>Linum catharticum</i>	Linaceae	Purgier-Lein	65
<i>Lonicera xylosteum</i>	Caprifoliaceae	Rote Heckenkirsche	36
<i>Lotus corniculatus</i>	Fabaceae	Gewöhnlicher Hornklee	55
<i>Lunaria rediviva</i>	Brassicaceae	Wilde Mondviole	32
<i>Medicago lupulina</i>	Fabaceae	Hopfenklee	55
<i>Melica ciliata agg.</i>	Poaceae	Wimper-Perlgras	77
<i>Melica nutans</i>	Poaceae	Nickendes Perlgras	77
<i>Moehringia muscosa</i>	Caryophyllaceae	Moos-Nabelmiere	39
<i>Moehringia trinervia</i>	Caryophyllaceae	Dreinervige Nabelmiere	39
<i>Mycelis muralis</i>	Asteraceae	Mauerlattich	23
<i>Noccaea montana</i>	Brassicaceae	Berg-Täschelkraut	33
<i>Odontites luteus</i>	Orobanchaceae	Gelber Zahntrost	67
<i>Origanum vulgare</i>	Lamiaceae	Gewöhnlicher Dost	61
<i>Oxalis acetosella</i>	Oxalidaceae	Wald-Sauerklee	67
<i>Petrorhagia prolifera</i>	Caryophyllaceae	Sprossende Felsennelke	40
<i>Petrorhagia saxifraga</i>	Caryophyllaceae	Steinbrech-Felsennelke	40
<i>Phyllitis scolopendrium</i>	Aspleniaceae	→ <i>Asplenium scolopendrium</i>	12
<i>Picea abies</i>	Pinaceae	Gewöhnliche Fichte	69
<i>Pilosella auriculoides</i>	Asteraceae	→ <i>Hieracium calodon</i>	18
<i>Pilosella officinarum</i>	Asteraceae	→ <i>Hieracium pilosella</i>	20
<i>Pimpinella saxifraga</i>	Apiaceae	Gewöhnliche Kleine Bibernelle	8
<i>Pinguicula vulgaris</i>	Lentibulariaceae	Gemeines Fettblatt, Echtes Fettblatt	64
<i>Pinus sylvestris</i>	Pinaceae	Wald-Föhre, Gewöhnliche Kiefer	69

<i>Plantago lanceolata</i>	<i>Plantaginaceae</i>	Spitz-Wegerich	70
<i>Poa compressa</i>	<i>Poaceae</i>	Platthalm-Rispengras	78
<i>Poa nemoralis</i>	<i>Poaceae</i>	Hain-Rispengras	78
<i>Poa pratensis</i>	<i>Poaceae</i>	Wiesen-Rispengras	79
<i>Polygala chamaebuxus</i>	<i>Polygalaceae</i>	Buchsblättrige Kreuzblume	80
<i>Polypodium interjectum</i>	<i>Polypodiaceae</i>	Gesägter Tüpfelfarn	82
<i>Polypodium vulgare</i>	<i>Polypodiaceae</i>	Gemeiner Tüpfelfarn	81
<i>Polystichum aculeatum</i>	<i>Polypodiaceae</i>	Gelappter Schildfarn, Dorniger Schildfarn	82
<i>Populus tremula</i>	<i>Salicaceae</i>	Zitter-Pappel	95
<i>Potentilla tabernaemontani</i>	<i>Rosaceae</i>	→ Potentilla verna	88
<i>Potentilla verna</i>	<i>Rosaceae</i>	Frühlings-Fingerkraut	88
<i>Prunus avium</i>	<i>Rosaceae</i>	Süsskirsche, Vogelkirsche	88
<i>Pseudo-fumaria alba</i>	<i>Papaveraceae</i>	Blassgelber Lerchensporn	68
<i>Pseudoturritis turrita</i>	<i>Brassicaceae</i>	→ Arabis turrita	28
<i>Rhamnus cathartica</i>	<i>Rhamnaceae</i>	Purgier-Kreuzdorn	85
<i>Ribes alpinum</i>	<i>Grossulariaceae</i>	Alpen-Johannisbeere	57
<i>Ribes uva-crispa</i>	<i>Grossulariaceae</i>	Stachelbeere	58
<i>Rosa canina</i>	<i>Rosaceae</i>	Hunds-Rose	89
<i>Rosa micrantha</i>	<i>Rosaceae</i>	Kleinblütige Rose	89
<i>Rosa spinosissima</i>	<i>Rosaceae</i>	Reichstachelige Rose, Pimpinell-Rose	90
<i>Rubus idaeus</i>	<i>Rosaceae</i>	Himbeere	90
<i>Rumex acetosa</i>	<i>Polygonaceae</i>	Wiesen-Sauerampfer	80
<i>Rumex acetosella</i>	<i>Polygonaceae</i>	Kleiner Sauerampfer	81
<i>Salix caprea</i>	<i>Salicaceae</i>	Sal-Weide	96
<i>Sambucus nigra</i>	<i>Viburnaceae</i>	Schwarzer Holunder	100
<i>Sanguisorba minor</i>	<i>Rosaceae</i>	Kleiner Wiesenknopf	91
<i>Saxifraga rosacea</i>	<i>Saxifragaceae</i>	Rosen-Steinbrech	97
<i>Saxifraga tridactylites</i>	<i>Saxifragaceae</i>	Dreifingeriger Steinbrech	98
<i>Scabiosa columbaria</i>	<i>Dipsacaceae</i>	Tauben-Skabiose	49
<i>Sedum acre</i>	<i>Crassulaceae</i>	Scharfer Mauerpfeffer	43
<i>Sedum album</i>	<i>Crassulaceae</i>	Weißer Mauerpfeffer	44
<i>Sedum dasyphyllum</i>	<i>Crassulaceae</i>	Dickblättriger Mauerpfeffer, Buckel-Fetthenne	44
<i>Sedum reflexum</i>	<i>Crassulaceae</i>	→ Sedum rupestre	45
<i>Sedum rupestre</i>	<i>Crassulaceae</i>	Felsen-Fetthenne	45
<i>Sedum sexangulare</i>	<i>Crassulaceae</i>	Milder Mauerpfeffer	45
<i>Sedum telephium subsp. maximum</i>	<i>Crassulaceae</i>	→ Hylotelephium maximum	42
<i>Sedum telephium, Sedum maximum</i>	<i>Crassulaceae</i>	→ Hylotelephium telephium	43
<i>Senecio jacobaea</i>	<i>Fabaceae</i>	→ Jacobaea vulgaris	54


<i>Seseli libanotis</i>	<i>Apiaceae</i>	Berg-Heilwurz	9
<i>Sesleria albicans</i>	<i>Poaceae</i>	→ <i>Sesleria caerulea</i>	79
<i>Sesleria caerulea</i>	<i>Poaceae</i>	Kalk-Blaugras	79
<i>Silene nutans</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	Nickendes Leimkraut	41
<i>Silene vulgaris</i>	<i>Caryophyllaceae</i>	Gewöhnliches Leimkraut	41
<i>Sisymbrium austriacum</i>	<i>Brassicaceae</i>	Österreichische Rauke	33
<i>Sorbus aria</i>	<i>Rosaceae</i>	Gewöhnliche Mehlbeere	91
<i>Sorbus francoica</i>	<i>Rosaceae</i>	→ Karpatiosorbus francoica	87
<i>Stachys sylvatica</i>	<i>Lamiaceae</i>	Wald-Ziest	61
<i>Taxus baccata</i>	<i>Taxaceae</i>	Gewöhnliche Eibe	99
<i>Teucrium botrys</i>	<i>Lamiaceae</i>	Trauben-Gamander	62
<i>Teucrium chamaedrys</i>	<i>Lamiaceae</i>	Edel-Gamander	62
<i>Teucrium montanum</i>	<i>Lamiaceae</i>	Berg-Gamander	63
<i>Thalictrum minus</i>	<i>Ranunculaceae</i>	Kleine Wiesenraute	84
<i>Thlaspi montanum</i>	<i>Brassicaceae</i>	→ <i>Noccea montana</i>	33
<i>Thymus praecox subsp. <i>praecox</i></i>	<i>Lamiaceae</i>	Frühblühender Thymian	63
<i>Thymus pulegioides</i>	<i>Lamiaceae</i>	Arznei-Thymian	64
<i>Urtica dioica</i>	<i>Urticaceae</i>	Große Brennessel	100
<i>Verbascum lychnitis</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	Mehlige Königsckerze	98
<i>Veronica teucrium</i>	<i>Plantaginaceae</i>	Großer Ehrenpreis	71
<i>Viburnum lantana</i>	<i>Viburnaceae</i>	Wolliger Schneeball	101
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	<i>Apocynaceae</i>	Weisse Schwalbenwurz	9
<i>Viola hirta</i>	<i>Violaceae</i>	Behaartes Veilchen	101
<i>Viola rupestris</i>	<i>Violaceae</i>	Sand-Veilchen	102
<i>Woodsia ilvensis</i>	<i>Woodsiaceae</i>	Rostroter Wimperfarn	103

Allium lusitanicum (Amaryllidaceae) Lam. *Allium senescens*



Berg-L. – *A. lusitanicum* 0,15–0,30 2 7–8
▽ (lilapurpur. Ohne Blathäutchen)

Allium oleraceum (Amaryllidaceae) L.



Gemüse-Lauch – *Allium oleraceum*
0,30–0,60 2 7–8 (lilapurpur. Ohne
Blathäutchen)


Bupleurum falcatum (Apiaceae) L.

Subsp. *faclatum* for left image



Sichel-H. – *B. falcatum* 0,20–1,00 ♂ 7–9
(gelb)

Pimpinella saxifraga (Apiaceae) L.




L: Kleine Pimpinelle – *Pimpinella saxifraga* 0,05–0,60 ♂ 7–9 (weiß od. gelblichweiß,
selten rosa bis purpur) R: Schwarze P. – *P. nigra* 0,40–0,80 ♂ 7–9 (weiß od. gelblich-
weiß)

Seseli libanotis (Apiaceae) (L.) W. D. J. Koch *Libanotis pyrenaica*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Berg-Heilwurz – *Seseli libanotis* 0,60–1,20
⊗ 7–8 (weiß od. rötlich)

Vincetoxicum hirundinaria (Apocynaceae) Medik.



Weiße Schwalbenwurz – *Vincetoxicum hirundinaria* 0,30–1,40 ♀ 5–8 (gelblichweiß)

Hedera helix (Araliaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnlicher Efeu – *Hedera helix*
0,10–20,00 ♂, 9–11 (gelbgrün. Fr schwarz)

Anthericum ramosum (Asparagaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Ästige G. – *A. ramosum* 0,30–0,80 ♀ 6–8
▽ (weiß)

Asplenium ceterach (Aspleniaceae) L.



Milzfarn – *Asplenium ceterach* 0,05–0,20
2 6–8 ▽

Asplenium ruta-muraria (Aspleniaceae) L.




Mauer-Streifenfarn, Mauerraute –
Asplenium ruta-muraria 0,03–0,15 2 7–9

Asplenium scolopendrium (Aspleniaceae) (L.) Newman *Phyllitis scolopendrium*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Hirschzunge – *Asplenium scolopendrium*
0,15–0,50 ♂ 7–8 ▽ (Pfl immergrün)

Asplenium septentrionale (Aspleniaceae) (L.) Hoffm.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Nördlicher Streifenfarn – *Asplenium*
septentrionale 0,08–0,15 ♂ 7–8

Asplenium trichomanes (Aspleniaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Braunstieler St. – *A. trichomanes* s. l.
0,05–0,30 ♂ 7–8 (BlStiel u. Bl-Spindel bis
zur Spitze braun)

Asplenium viride (Aspleniaceae) Huds.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Grünstieler Streifenfarn – *Asplenium*
viride 0,05–0,20 ♂ 7–8 (BlStiel nur am
Grund braun)

Artemisia campestris (Asteraceae) L.

Subsp. *camperstris* for left image



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Feld-B. – *A. campestris* 0,30–0,60 ♂
8–10 (gelb od. rötlich. Bl zuerst seidig
behaart, verkahlend) ↗ S. 791

Artemisia vulgaris (Asteraceae) L.



© K. Lauber



Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnlicher Beifuß – *A. vulgaris*
0,60–1,50 ♂ 7–11 (gelblich od. rotbraun)

Buphthalmum salicifolium (Asteraceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica / Haupt Verlag



Weidenblatt-Rindsauge – *Buphthalmum salicifolium* 0,15–0,70 ♂ 6–9 (goldgelb)

Carlina acaulis (Asteraceae) L.

Subsp. caulescens for right image



Schmalblättrige Silberdistel – *Carlina acaulis* subsp. caulescens (0,03–)0,20–0,60 ♂ 7–9 ▽

Cota tinctoria (Asteraceae) L. *Anthemis tinctoria*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Färber-Hundskamille – *Anthemis tinctoria*
0,30–0,60 ♂ 6–9 (goldgelb, RöhrenB
goldgelb)

Erigeron acris ssp. acris (Asteraceae) L.

Left image not subspecies




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Scharfes B. – *E. acris* subsp. *acris*
0,10–0,30 ♂ 5–6–7 (rötlich od. bläulich,
RöhrenB gelb) ✚ S. 790


Erigeron annuus ssp. *annuus* (Asteraceae) (L.) Desf.

Left image not subspecies



*Feinstrahl-Berufkraut – *Erigeron annuus*
0,50–1,00 ♂ 6–9 (weiß od. hellviolet.,
RöhrenB gelb) ↗ S. 790

Hieracium bifidum (Asteraceae)




*Gabel-Habichtskraut – *Hieracium*
bifidum 0,10–0,40 ♂ 5–7 (goldgelb. Bl grün
bis blaugrün)

Hieracium bupleuroides (Asteraceae) C. C. Gmel.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Hallwag Verlag



*Hasenohr-H. – *H. bupleuroides* 0,20–0,60
⌚ 7–8 (gelb. Bl blaugrün)

Hieracium calodon (Asteraceae) Tausch *Pilosella auriculoides*



Hieracium franconicum (Asteraceae) (Griseb.) Zahn



Hieracium harzianum (Asteraceae) Zahn



"Vulgare" type.


- Sheets 0, sit 1-3
- Sheets 5-10(-20), blue. green, lancettl. to br lancetly., coarsely 1-3-toothed, in the upper third completely margined.
- Overall inflorescence loosely panicled.
- Branches 5-10.
- Head peduncles scattered hairy, moderately hostile, up to abundant. flaky.
- Heads 10-30. bracts, blunt to pointed, hair and glands moderate, to richly flaky at the margins.

Hieracium murorum agg. (Asteraceae) L.



*Wald-H. – *H. murorum* 0,20–0,60 ♂ 5–8
(gelb od. goldgelb)

Hieracium pilosella (Asteraceae) L. *Pilosella officinarum*




Kleines Mausohrhabichtskraut – *Pilosella officinarum* 0,05–0,30 ♂ 5–10 (schwefel-gelb, RandB useits meist rotstreifig)

Hieracium schmidtii (Asteraceae) aggr.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



*Bleiches Habichtskraut – *Hieracium schmidtii* 0,10–0,40 ♀ 5–7 (hellgelb. Bl blaugrün)

Hieracium schneidii (Asteraceae) Schack et Zahn



HERBARIUM MUSEI PARISIENSIS

Lactuca perennis (Asteraceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Blauer L. – *L. perennis* 0,30–0,50 ♂ 5–6
(blau od. blauviolett. Bl blaugrün)

Leontodon incanus (Asteraceae) (L.) Schrank




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Grauer L. – *L. incanus* 0,15–0,45 ♂ 5–6
(goldgelb)

***Leucanthemum vulgare* (Asteraceae)** L. *Leucanthemum ircutianum*



*Wiesen-Margerite – *Leucanthemum ircutianum* 0,20–0,80 ♂ 6(–10) (weiß, RöhrenB gelb) ↗ S. 791

***Mycelis muralis* (Asteraceae)** (L.) Dumort.



Gewöhnlicher Mauerlattich – *Mycelis muralis* 0,40–0,80 ♂ 7–8 (hellgelb)

Impatiens parviflora (Balsaminaceae) DC.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Kleinblütiges S. – *I. parviflora* 0,30–0,60
© 6–9 (gelb)


Betula pendula (Betulaceae) Roth



© K. Lauber




Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche B. – *B. pendula* Bis 25,00 ♂
4–5 (♂ hell bräunlichgelb, ♀ grün)

Corylus avellana (Betulaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche Hasel – *Corylus avellana*
2,00–6,00 ♂, 2–4 (♀ grün, Narben rot,
♂ grünlichgelb)

Asperugo procumbens (Boraginaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Schlängenäuglein – *Asperugo procumbens* 0,20–0,50 ♂ ① 5–8 (erst violett, dann blau, Schlundschuppen weiß)

Echium vulgare (Boraginaceae) L.




Gewöhnlicher Natternkopf – *Echium vulgare* 0,25–0,80 ♂ 5–10 (erst rosa, dann leuchtendblau)

Alyssum montanum (Brassicaceae) L.




****Berg-St.** – *A. montanum* 0,10–0,20 ♀
3–5 ▽ (goldgelb)

Arabidopsis lyrata subsp. petraea (Brassicaceae) L. *Cardaminopsis petraea*



Felsen-Sch. – *A. petraea* 0,10–0,25 ♂ 5–7
(weiß)

Arabis alpina (Brassicaceae) L.



Alpen-G. – *A. alpina* 0,05–0,40 ♂ 3–10
(weiß)


Arabis hirsuta (Brassicaceae) L.



© K. Lauber



Flora Helvetica - Haupt Verlag




Behaarte G. – *A. hirsuta* 0,10–0,80 ♂ 2–5–7 (weiß)

Arabis turrita (Brassicaceae) L. *Pseudoturritis turrita*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Turmänekkresse – *Pseudoturritis turrita* 0,10–0,70 ♂ 4–6 (gelblichweiß)

Aurinia saxatilis (Brassicaceae) (L.) Desv.



© K. Lauber



Flora Helvetica - Haupt Verlag



Felsensteinkraut – *Aurinia saxatile*
0,15–0,35 h 4–5 ▽ (leuchtend gelb)

Cardamine flexuosa (Brassicaceae) With.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Wald-Sch. – *C. flexuosa* 0,10–0,50 ♂ ① 2
4–10 (weiß)

Cardamine impatiens (Brassicaceae) L.



Spring-Schaumkraut – *Cardamine impatiens*
0,10–0,85 ♂ ⊖ 5–7 (Kr weiß, oft fehlend)

Draba aizoides (Brassicaceae) L.




Immergrünes F. – *D. aizoides*
0,03–0,10 ♀
4–8 ▽ (goldgelb)

Erysimum crepidifolium (Brassicaceae) Rchb.



- Flower light yellow, ripe pods 0-40°, crown leafs 11-16 mm, stem **only** 2-parted hairs, leafs mostly 2-parted hairs
- Blüte hellgelb, reife Schoten 0-40°, Kronenblätter 11-16 mm, Stiel **nur** 2-teilig behaart, **Blätter meist 2-teilig behaart**




Bleicher Sch. – *E. crepidifolium* 0,15–0,80
⊗ ⊖ 4–6 (hellgelb)

Erysimum odoratum (Brassicaceae) Ehrh.




- Crown leafs 13-16 (20) mm, flower **dark yellow** with **strong scent**, pods 0-40°, stem mostly 2-parted but **few** 3-parted hairs, leafs mostly **3-parted hairs**
- Kronenblätter 13-16 (20) mm, Blüte **dunkelgelb mit starkem Duft**, Schoten 0-40°, Stängel meist 2-teilig, aber selten 3-teilig behaart, Blätter meist 3-teilig behaart



Duft-Sch. – *E. odoratum* 0,20–0,90 ① ⊗
5–7 (sattgelb, duftend)


Erysimum repandum (Brassicaceae) L.

- Flower light yellow, ripe pods **horizontal** (40-90°), annual, **crown leafs 6-8 mm**, leafs with mainly 3-parted and 2-parted hairs
- Blüten hellgelb, reife Schoten **waagerecht** (40-90°), einjährig, **Kronenblätter 6-8 mm**, Blätter mit überwiegend 3-teiligen und 2-teiligen Haaren




Spreiz-Sch. – *E. repandum* 0,15–0,35 ☺
3–6 (hellgelb)

Lunaria rediviva (Brassicaceae) L.




Ausdauerndes S. – *L. rediviva* 0,30–1,40
2 5–7 ▽ (hellviolett bis weißlich)

Noccaea montana (Brassicaceae) (L.) F.K.Mey. *Thlaspi montanum*



Berg-T. – *N. montana* 0,10–0,20 ♂ 4–5
(weiß, Staubbeutel gelb bleibend)

Sisymbrium austriacum (Brassicaceae) Jacq.



Österreichische R. – *S. austriacum*
0,30–0,60 ☿ 5–6 (goldgelb)

Campanula gentilis (Campanulaceae) Kovanda




Very similar to *C. rotundifolia*.

Differences:

- Most **stem leafs** mostly in **lower third of stem** (*rotundifolia*: all over)
- Upper leafs threadlike (*rotundifolia*: linealistic)
- Stem with **very few or 1 flower** (*rotundifolia*: several flowers)

Campanula persicifolia (Campanulaceae) L.




Pfirsichblättrige G. – *C. persicifolia*
0,30–0,80 ♂ 6–9 (hellblau, selten weiß)

Campanula rotundifolia (Campanulaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



*Rundblättrige G. – *C. rotundifolia*
0,10–0,30 ♂ 6–10 (blauviolett)

Campanula trachelium (Campanulaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Nesselblättrige Glockenblume –
Campanula trachelium 0,60–1,00 ♂ 7–8
(hell blauviolett bis hellblau)

Lonicera xylosteum (Caprifoliaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Rote Heckenkirsche – *L. xylosteum*
1,00–2,00 ♂ 5–6 (gelblichweiß, später
mattgelb). Fr scharlachrot

Arenaria serpyllifolia (Caryophyllaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



****Quendel-Sandkraut – *Arenaria*
*serpyllifolia*** 0,03–0,30 ♂ ♂ 5–9 (weiß. Pfl
graugrün) ↗ S. 786


Cerastium arvense (Caryophyllaceae) L.

Subsp. Arvense



**Acker-H. – *C. arvense* 0,03–0,30 ♂ 4–8
(weiß. Pfl grauflaumig)

Cerastium tomentosum (Caryophyllaceae) L.



Filziges H. – *C. tomentosum* 0,15–0,30 ♂
5–7 (weiß. Pfl dicht weißfilzig)

Dianthus carthusianorum (Caryophyllaceae) L.

Subsp. *Carthusianorum*



© K. Lauber



Flora Helvetica - Haupt Verlag




Kartäuser-N. – *D. carthusianorum*
0,15–0,45 2l 6–9 ▽ (dunkelpurpur bis
rosa, dunkler geadert)

Dianthus gratianopolitanus (Caryophyllaceae) Vill.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Pfingst-Nelke – *Dianthus gratianopolitanus*
0,10–0,25 2l 5–6 ▽ (hellpurpur, ohne
Zeichnung. Bl blaugrün)

Moehringia muscosa (Caryophyllaceae) L.




Moos-N. – *M. muscosa* 0,05–0,20 ♂ 5–9
(weiß)

Moehringia trinervia (Caryophyllaceae) (L.) Clairv.





Dreinervige Nabelmiere – *Moehringia trinervia* 0,10–0,30 ♂ 5–7 (weiß)


Petrorhagia prolifera (Caryophyllaceae) (L.) P.W.Ball & Heywood



Petrorhagia saxifraga (Caryophyllaceae) (L.) Link




Silene nutans (Caryophyllaceae) L.



**Nickendes L. – *S. nutans* 0,30–0,50 ♂ 5–8
(weiß, USeite oft grünlich od. rötlich, nur
nachts geöffnet)**

Silene vulgaris (Caryophyllaceae) (Moench) Gärcke



***Gewöhnliches Leimkraut – *S. vulgaris*
0,10–0,60 ♂ 6–9 (weiß, K grünlichweiß od.
rötlich. Pfl blaugrün)**

Euonymus europaeus (Celastraceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Europäisches Pfaffenhütchen –
Euonymus europaeus 1,50–3,00 ♂ 5–6
(hellgrün. Fr rosa, SaMantel orange)

Hylotelephium maximum (Crassulaceae) (L.) Kirschl. *Sedum telephium* subsp. *maximum*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Große W. – *H. maximum* 0,30–0,80 ♂ 7–9 (grünlich, selten röthlich). Ähnlich **Purpur-F.** –
H. telephium (B rosa bis dunkelrot. Fr außen rinnig. Bl Grund keilförmig verschmälert, alle
Bl wechselständig)

***Hylotelephium telephium* (Crassulaceae)** (L.) H. Ohba. *Sedum telephium*, *Sedum maximum*


Subsp. *telephium* for image 1



© K. Lauber



Flora Helvetica - Haupt Verlag




Große W. – H. maximum 0,30–0,80 ♂ 7–9 (grünlich, selten rötlich). Ähnlich Purpur-F. –
H. telephium (B rosa bis dunkelrot. Fr außen rinnig. Bl Grund keilförmig verschmälert, alle
 Bl wechselständig)

***Sedum acre* (Crassulaceae) L.**



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Scharfer Mauerpfeffer – *Sedum acre*
 0,03–0,15 ♂ 6–8 (gelb)

Sedum album (Crassulaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Weiße F. – *S. album* 0,08–0,20 ♂ 6–9
(weiß)

Sedum dasyphyllum (Crassulaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Buckel-F. – *S. dasyphyllum* 0,03–0,10 ♂
6–8 (weiß, außen zuweilen rötlich)

Sedum rupestre (Crassulaceae) L. *Sedum reflexum*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




*Felsen-Fetthenne – *Sedum rupestre*
0,10–0,35 ♂ 6–8 (gelb) ✕ S. 784

Sedum sexangulare (Crassulaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Milder M. – *S. sexangulare* 0,05–0,15 ♂
6–7 (gelb)

Carex digitata (Cyperaceae) L.



Finger-S. – *C. digitata* 0,10–0,30 ♂ 5
(Sp rotbraun, grün gekielt, weißrandig.
Pfl unten dunkelrot)

Carex flacca (Cyperaceae) Schreber




Blaugrüne S. – *C. flacca* 0,20–0,60 ♂ 5–7
(Sp schwarzbraun, Schläuche grün od.
schwarz)

Carex flava (Cyperaceae) L. s. str.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Gelb-Segge – *Carex flava* 0,20–0,60 ♂ 5–9 (Sp gelb- bis rostbraun, grün gekiekt, Schläuche hellgelb. Pfl gelbgrün)

Carex humilis (Cyperaceae) Leyss.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Erd-S. – *C. humilis* 0,03–0,15 ♂ 4–5
(Sp braun, weißbrandig. Pfl unten rot. Bl graugrün)


Carex montana (Cyperaceae) L.



© K. Lauber



Flora Helvetica - Haupt Verlag



Berg-S. – *C. montana* 0,10–0,30 ♂ 3–5
(Sp braun, Schläuche grün, oben oft braun.
Pfl unten rot)

Cystopteris fragilis (Cystopteridaceae) (L.) Bernh.



© K. Lauber

Flora Helvetica - Haupt Verlag



Zerbrechlicher B. – *C. fragilis* 0,10–0,50 ♂
7–9; (Spore unten: Runzelsporiger B. – *C. dickieana*) S. 781

Knautia arvensis (*Dipsacaceae*) (L.) Coult.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




*Acker-Witwenblume – *Knautia arvensis*
0,30–0,80 ♂ 7–8 (bläulichrot bis violett)

Scabiosa columbaria (*Dipsacaceae*) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Tauben-S. – *S. columbaria* 0,25–0,60 ♂
7–11 (blaulila, KBorsten schwärzlich)

Dryopteris filix-mas (*Dryopteridaceae*) (L.) Schott




Gewöhnlicher W. – *D. filix-mas* 0,30–1,20
2 7–9

Arctostaphylos uva-ursi (*Ericaceae*) L.




Echte Bärentraube – *Arctostaphylos uva-ursi* 0,20–0,60 h 3–7 ▽ (weiß bis rosa,
KrZipfel rötlich. Fr rot)

Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae) L.



Zypressen-Wolfsmilch – *Euphorbia cyparissias* 0,15–0,30 ♂ 4–5 (grünlichgelb, später rötend)

Anthyllis vulneraria (Fabaceae) L.



**Gewöhnlicher Wundklee – *Anthyllis vulneraria* 0,05–0,60(–0,90) ♂ 5–8 (gelb, weißlich od. rötlich)

Coronilla vaginalis (Fabaceae) Lam.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Scheiden-Kronwicke – *Coronilla vaginalis*
0,05–0,10 h 5–7 (gelb)

Cytisus nigricans (Fabaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Schwarzwerdender Geißklee – *Cytisus nigricans* 0,30–1,20 h, h, 6–8 (gelb, Bl.
trocken schwarz)

Hippocrepis comosa (Fabaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Hufeisenklee – *H. comosa* 0,08–0,25 ♂ h
5–7 (gelb)

Hippocrepis emerus (Fabaceae) L.
Subsp. Lassen




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Strauchwicke – *Hippocrepis emerus* 1,00–2,00 ♂ h 5–7 (gelb)

Jacobaea vulgaris (Fabaceae) L. *Senecio jacobaea*




Lathyrus vernus (Fabaceae) (L.) Bernh.

Subsp. *Vernus*



Lotus corniculatus (Fabaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




*Gewöhnlicher H. – *L. corniculatus*

0,20–0,30(–0,50) ♂ 6–8 (gelb, außen ± rot
gezeichnet, getrocknet grünlich) ↗ S. 785

Medicago lupulina (Fabaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hopfen-Luzerne – *Medicago lupulina*

0,15–0,60 ♂ bis ♀ 5–10 (gelb)

Fagus sylvatica (Fagaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Rot-Buche – *Fagus sylvatica* Bis 40,00 ♂
4–5 (rötlichbraun)

Geranium robertianum (Geraniaceae) L.

Subsp. *Robertianum*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



****Stinkender St.** – *G. robertianum*
0,20–0,40 ♂ ♂ 5–10 (hellpurpur)

Geranium sanguineum (Geraniaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Blut-Storchschnabel – *Geranium sanguineum* 0,15–0,50 m; 6–8 (purpurrot)

Ribes alpinum (Grossulariaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Alpen-Johannisbeere – *Ribes alpinum*
0,80–1,50 m; 4–5 (grünlichgelb, unvollkommen zweihäusig. Fr rot)

Ribes uva-crispa (Grossulariaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Stachelbeere – *Ribes uva-crispa* 0,60–1,20
H 4–5 (grünlichgelb. Fr grün, gelb od.
purpurn)

Hypericum perforatum (Hypericaceae) L.

Subsp. *Perforatum*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



****Tüpfel-H.** – *H. perforatum* 0,15–0,80 ♂
6–8 (goldgelb, wie KBI schwarz punktiert)

Acinos arvensis (Lamiaceae)



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnlicher S. – *A. arvensis* 0,10–0,30
○ ♂ 6–9 (blässlila)

Ajuga genevensis (Lamiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Heide-G. – *A. genevensis* 0,07–0,30 ♂ 4–6
(meist dunkelblau)

Galeobdolon luteum (Lamiaceae) L. *Lamium galeobdolon*

Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. *galeobdolon*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Echte Goldnessel – *Galeobdolon luteum*
0,15–0,40 ♂ 5–7 (gelb)

Lamium maculatum (Lamiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Gefleckte T. – *L. maculatum* 0,15–0,60 ♀
4–9 (purpurn)

Origanum vulgare (Lamiaceae) L.



**Gewöhnlicher Dost – *Origanum vulgare*
0,20–0,60 ♂ 7–9 (hellpurpurn, selten weiß)
↗ S. 788

Stachys sylvatica (Lamiaceae) L.



Wald-Z. – *S. sylvatica* 0,30–1,00 ♂ 6–9
(dunkel braunrot)

Teucrium botrys (Lamiaceae) L.



Trauben-Gamander – *Teucrium botrys*
0,10–0,40 ♂ ♂? 7–9 (rötlich)

Teucrium chamaedrys (Lamiaceae) L.



Edel-Gamander – *Teucrium chamaedrys*
0,10–0,30 ♂ 7–9 (hellpurpur)

Teucrium montanum (Lamiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Berg-G. – *T. montanum* 0,05–0,35 h 6–9
(hellgelb)

Thymus praecox subsp. *praecox* (Lamiaceae)




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Frühblühender Th. – *Th. praecox*
0,03–0,15 h 5–7 (hell- bis dunkelpurpur)
↗ S. 788

Thymus pulegioides (Lamiaceae) L.



*Arznei-Th. – *Th. pulegioides* 0,05–0,30 h
6–9 (hell- bis dunkelpurpur) ↗ S. 788

Pinguicula vulgaris (Lentibulariaceae) L.




Echtes F. – *P. vulgaris* 0,05–0,15 ♀ 5–6 ▽
(violettblau)

Linum catharticum (*Linaceae*) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Purgier-Lein – *Linum catharticum*
0,05–0,30 ♂ 6–7 (weiß, Grund gelb)

Epilobium collinum (*Onagraceae*) C. C. Gmel.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hügel-W. – *E. collinum* 0,10–0,40 ♀ 6–9
(rosa. Stg graugrün)

Epilobium montanum (Onagraceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Berg-W. – *E. montanum* 0,10–0,80 ♂ 6–9
(rosa. Stg grasgrün)

Euphrasia officinalis subsp. *rostkoviana* (Orobanchaceae) (Hayne) F. Towns. *Euphrasia rostkoviana*




Gewöhnlicher A. – *E. officinalis* 0,01–0,45
⌚ 5–10 (weiß, bläulich od. gelb) ✚ S. 788

Odontites luteus (Orobanchaceae) (L.) Clairv.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Gelber Z. – *O. luteus* 0,15–0,60 ♂ 7–10
(gelb)

Oxalis acetosella (Oxalidaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-Sauerklee – *Oxalis acetosella*
0,05–0,12 ♀ 4–5 (weiß, purpur geadert)

Chelidonium majus (Papaveraceae) L.



Schöllkraut – *Chelidonium majus*
0,30–0,70 ♂ 4–10 (gelb. Milchsaft orange)

Pseudo-fumaria alba (Papaveraceae) (Mill.) Lidén *Corydalis alba* (Mill.) Mansf.




Blassgelber S. – *P. alba* 0,10–0,40 ♂
6–10 (weißlich, Spitze dunkler, gelblich. Bl
beidseits blaugrün)

Picea abies (Pinaceae) (L.) H.Karst.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Gewöhnliche F. – *P. abies*

Bis 50,00 (~60,00) ₣ 4–6 (Nadeln allseits dunkelgrün. Zapfen braun)

Pinus sylvestris (Pinaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




****Gewöhnliche Kiefer – *Pinus sylvestris***

Bis 30,00 (~40,00) ₣ 5–6 (Zapfen matt graubraun. Stamm oben hell rotbraun)

Globularia bisnagarica (Plantaginaceae) L. *Globularia punctata*




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche K. – *G. bisnagarica*
0,05–0,30 ♂ 5–6 ▽ (blaulila)

Plantago lanceolata (Plantaginaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Spitz-Wegerich – *Plantago lanceolata*
0,10–0,50 ♂ 5–9 (StaubBl blässgelb, Kr
bräunlich)

Veronica teucrium (Plantaginaceae) L.



Agrostis capillaris (Poaceae) L.



Arrhenatherum elatius (Poaceae) (L.) J. Presl & C. Presl



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Glatthafer – *Arrhenatherum elatius*
0,60–1,20 ♂ 6–7

Brachypodium pinnatum (Poaceae) (L.) P. Beauv.



*Fieder-Zwenke – *Brachypodium pinnatum* 0,60–1,00 ♂ 6–7

Brachypodium sylvaticum (Poaceae) (Huds.) P. Beauv.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Wald-Z. - *B. sylvaticum* 0,60–1,20 2 7–8

Bromus hordeaceus (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Weiche T. - *B. hordeaceus* 0,05–0,80 ♂
thominei 0,05–0,15 ♂ ① ♂ 5–7 ✕ S. 783

Bromus sterilis (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Taube T. - *B. sterilis* 0,30–0,60 ♂ ① 5–6

Calamagrostis arundinacea (Poaceae) (L.) Roth



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Wald-R. - *C. arundinacea* 0,60–1,20 ♀ 6–7

Festuca altissima (Poaceae) All.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-Sch. – *F. altissima* 0,60–1,20 ♂ 6–7

Festuca arundinacea (Poaceae) Schreb.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Rohr-Sch. – *F. arundinacea* 0,60–1,80 ♂ 6–7 (GrundBl Scheiden weißlich)

Festuca ovina (Poaceae) L. agg.



**Schaf-Sch. – *F. ovina* 0,20–0,70 2 5–8


Festuca pallens (Poaceae) Host



Melica ciliata agg. (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Wimper-P. – *M. ciliata* 0,20–0,70 ♂ 6
(Bl graugrün)

Melica nutans (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Nickendes P. – *M. nutans* 0,30–0,60 ♂ 5–6
(Hsp braunrot)

Poa compressa (Poaceae) L.



Platthalm-R. – *P. compressa* 0,20–0,80
2 6–7

Poa nemoralis (Poaceae) L.



Hain-Rispengras – *Poa nemoralis*
0,30–0,80 2 6–7

Poa pratensis (Poaceae) L.



© K. Lauber



Flora Helvetica - Haupt Verlag




*Wiesen-R. – *P. pratensis* 0,20–0,90 2
5–6 ↗ S. 783

Sesleria caerulea (Poaceae) L. *Sesleria albicans*




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Kalk-B. – *S. caerulea* 0,10–0,45 2 3–5

Polygala chamaebuxus (Polygalaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Zwergbuchs – *Polygala chamaebuxus*
0,10–0,25 ♂ 4–8 (gelb-weiß, selten rötlich
überlaufen)

Rumex acetosa (Polygonaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wiesen-Sauerampfer – *Rumex acetosa*
0,30–1,00 ♀ 5–7 (rötlichgrün)


Rumex acetosella (Polygonaceae) L.



**Kleiner S. – *R. acetosella* 0,10–0,30 ♂
5–7 (grünlich. Formenreich)

Polypodium vulgare (Polypodiaceae) L.

Leaf blade 3.5 - 5 times longer than broad, spores ripen July-august



Gewöhnlicher Tüpfelfarn – *Polypodium vulgare* 0,10–0,50 ♂ 8–9 (Sori schleierlos)


Polypodium interjectum (Polypodiaceae) Shivas

Leaf blade 1.5 - 2.5 (3) times longer than broad, spores ripen august-september

Images/Polypodium_interjectum_1.jpg

Images/Polypodium_interjectum_2.jpg

Polystichum aculeatum (Polypodiaceae) (L.) Roth



3 Dorniger Sch. – *P. aculeatum* 0,60–1,00 2
8–9 ▽ (Bl ledig, immergrün)

Aconitum napellus (Ranunculaceae) L.




Blauer E. – *A. napellus* subsp. *lusitanicum*
0,30–2,00 ♂ 6–8 ▽ (tiefblau bis
dunkelviolett) ✕ S. 783

Actaea spicata (Ranunculaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag





Christophskraut – *Actaea spicata*
0,30–0,60 ♂ 5–6 (weiß. Fr schwarz)

Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae) L.



Gewöhnliche Akelei – *Aquilegia vulgaris*
0,40–0,80 ♂ 5–7 ▽ (blauviolett, selten rosa
od. weiß)

Thalictrum minus (Ranunculaceae) L.



****Kleine W. – *Th. minus* 0,15–1,20 ♂ 5–8**
(gelblich)

Rhamnus cathartica (Rhamnaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Purgier-K. – *Rh. cathartica* 1,00–3,00
t_h 5–6 (gelblichgrün. Fr von grün sofort schwarz färbend)

Crataegus laevigata (Rosaceae) (Poir.) DC.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Zweigriffliger Weißdorn – *Crataegus laevigata* subsp. *laevigata* Bis 8,00 t_h 5
(weiß. Fr dunkelrot. Auch Baum)

Crataegus monogyna (Rosaceae) Jacq.




Eingrifflicher W. – *C. monogyna* Bis 12,00
H. 5–6 (weiß od. rot. Fr dunkelrot. BlUS Seite
bläulichgrün. Auch Strauch)

Cotoneaster integerrimus (Rosaceae) Medik.



Gewöhnliche Zwergmispel – *Cotoneaster*
integerrimus 0,50–2,00 H. 4–5 ▽ (weiß od.
rosa. Fr rot, selten weiß)

Fragaria vesca (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-E. – *F. vesca* 0,05–0,20 ♀ 5–6
(weiß. Spitzen der BlZähne hellrosa, grün gesäumt)


Karpatiosorbus franconica (Rosaceae) (Bornm.) Sennikov & Kurtto *Sorbus franconica*



Potentilla verna (Rosaceae) L. *Potentilla tabernaemontani*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Frühlings-K. – *P. vernalis* 0,05–0,30 2|
4–6 ▽ (gelblichweiß, außen hellviolett
überlaufen)**

Prunus avium (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



****Vogel-Kirsche, Süß-K. – *P. avium*
Bis 25,00 ♂ 4–5 (weiß. Fr schwarzrot bis
gelbrot)**

Rosa canina (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hunds-R. – *R. canina* 1,00–3,50 ♂ 5–7
(blassrosa od. weiß. Formenreich)

Rosa micrantha (Rosaceae) Borrer ex Sm.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Kleinblütige R. – *R. micrantha*
(1,00–)2,00–3,00 ♂ 6–7 (weiß od. blass-rosa. Bl schwach nach Apfel duftend)

Rosa spinosissima (Rosaceae) L.




Pimpinell-R. – *R. spinosissima* 0,20–1,20
H 5–6 (weiß, gelblich, selten blassrosa. Fr schwarzbraun)

Rubus idaeus (Rosaceae) L.



Himbeere – *R. idaeus* 0,60–2,00 H 5–6
(weiß, Fr rot. Blattseite weißfilzig. Stacheln violett)

Sanguisorba minor (Rosaceae) Scop.




**Kleiner Wiesenknopf – *Sanguisorba minor* 0,15–0,50(–0,80) ♂ 5–8 (erst grünlich, dann rötlich)

Sorbus aria (Rosaceae) aggr. *Aria edulis*




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



*Gewöhnliche Mehlbeere – *Sorbus aria*
Bis 10,00 ♂ 5–6 (weiß. Fr orange bis rot.
BlÜSeite weißfilzig)

Asperula cynanchica (Rubiaceae) L.



Hügel-M. – *A. cynanchica* 0,05–0,30 ♀
6–9 (weiß, außen rosa überlaufen)

Galium anisophyllum (Rubiaceae) Vill.




*Ungleichblättriges L. – *G. anisophyllum*
0,05–0,15 ♀ 7–9 (gelblichweiß bis weiß)
↗ S. 787

Galium glaucum (Rubiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Blaugrünes Labkraut – *G. glaucum*
0,30–0,60 ♂ 5–7 (weiß. Bl u. Stg blaugrün
bis weißlichgrün)

Galium pumilum (Rubiaceae) Murray



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Heide-L. – *G. pumilum* 0,10–0,40 ♂ 6–8
(weiß)

Galium saxatile (Rubiaceae) L.




Galium sylvaticum (Rubiaceae) L.



Galium verum (Rubiaceae) L.

Subsp. verum



***Echtes Labkraut** – *Galium verum*
0,20–0,70 ♂ 6–9 (zitronen- bis goldgelb)
→ S.787

Populus tremula (Salicaceae) L.




Zitter-P. – *P. tremula* Bis 25,00 ♂ 3–4
(♂ purpurgrau, ♀ rötlich, Narben purpur)

Salix caprea (Salicaceae) L.




Acer pseudoplatanus (Sapindaceae) L.



Chrysosplenium alternifolium (Saxifragaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Wechselblättriges Milzkraut –
Chrysosplenium alternifolium 0,15–0,20 24
4–6 (gelb. HochBl gelbgrün)

Saxifraga rosacea (Saxifragaceae) Moench



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Rasen-St. – *S. rosacea* 0,05–0,25 24 5–7 ▽ (weiß. Bl. weich. Dargestellt ist subsp. rosacea.)

Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Finger-Steinbrech – *Saxifraga tridactylites*
0,02–0,18 ♂ ⊖ 4–6 (weiß)

Verbascum lychnitis (Scrophulariaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Mehlige Königskerze – *Verbascum lychnitis*
0,60–1,20 ♂ ⊖ 6–8 (hellgelb od.
weiß, Staubfäden weißwollig)

Taxus baccata (Taxaceae) L.



Gewöhnliche Eibe – *Taxus baccata*
Bis 15,00(–18,00) ♂ 3–5 ♀ (Nadeln oseits
dunkelgrün, useits heller. Samenmantel rot)

Helianthemum nummularium ssp. *obscurum* (Thymelaeaceae)
(Celak.) Holub




**Gewöhnliches Sonnenröschen –
Helianthemum nummularium 0,10–0,20 ♂
5–10 (gelb od. gelblichweiß)

Urtica dioica (Urticaceae) L.



© K. Lauber · Flora Helvetica · Haupt Verlag




**Große Brennnessel – *Urtica dioica* 0,30–1,50 ♂ 7–10 (grün). Pfl. meist 2häusig, selten 1 häusig. Brennhaare u. kurze drüsige Haare. Blätter flaumhafte. BIOSeite dunkelgrün, matt od. kaum glänzend) > S. 785

Sambucus nigra (Viburnaceae) L.




© K. Lauber · Flora Helvetica · Haupt Verlag



Schwarzer Holunder – *Sambucus nigra* 3,00–7,00 ♂ 6–7 (weiß, Staubbeutel hellgelb). Fr über rötlichbraun reif schwarz. FrSche oft rot überlaufen. SigMark weiß

Viburnum lantana (Viburnaceae) L.



Wolliger Sch. – *V. lantana* 1,00–3,00 ♂
4–6 (schmutzigweiß. Fr erst rot, vollreif
schwarz)

Viola hirta (Violaceae) L.





Behaartes V. – *V. hirta* 0,05–0,25 ♀ 4–5
(blau, Sporn rötlichviolett)

Viola rupestris (Violaceae) F.W.Schmidt





Sand-V. – *V. rupestris* 0,03–0,08 ♂ 5–6
(blauviolett, selten rötlich)

Gymnocarpium robertianum (Woodsiaceae) (Hoffm.) Newman



Ruprechtsfarn – *Gymnocarpium*
robertianum 0,15–0,55 ♀ 7–8

Woodsia ilvensis (Woodsiaceae) (L.) R. Br.



Rostroter W. – *W. ilvensis* 0,10–0,20 ♀
7–8 ▽

Non-Vascular Plants

Bryophytes

Hornworts

- Thalloid body like some liverworts
- Reproductive structures: elongated and horn-like



Bryophytes

Liverworts

- Leafy like mosses, but flatter, more ribbon-like appearance, less obvious differentiation between stems and leaves
- Thalloid: flat and spread out like a thin crust.



Bryophytes

Mosses: Acrocarpous mosses

- Clearly differentiated stems and leaves
- Growth pattern: upright, tend to form dense clumps
- Reproductive placement: reproductive structures at the top of vertical stems
- Environmental preference: adaptive to varying moisture conditions, can survive drying



Bryophytes

Mosses: Pleurocarpous mosses

- Growth pattern: Pleurocarpous mosses spread out, forming mats
- Reproductive placement: along the sides of branches
- Environmental preference: consistently wet habitats



Lichens

Crustose

- Crust adhering tightly to the substrate
- Cannot be removed without damaging the substrate
- Most common morphotype in cliff plots!



Lichens

Foliose

- Leaf-like lichens
- Attached at some points: some parts lift away from the substrate.
- Flat, leafy appearance, distinct upper and lower surface



Lichens

Fruticose

- Bushy or hair-like
- Grow away from the substrate in all directions
- Often cylindrical or branched
- Do not have a distinct upper and lower surface.

