

MIREN Rocks Frankenjura

Species identification booklet

Frankenjura



MIREN Rocks Frankenjura

Species identification booklet

Frankenjura

March 2025

Principal Investigator: Prof. Dr. Anke Jentsch

Team:

Thomas Deola, Maja Lecher, Lukas Nietsch,
Katrín Schönhofer, Peter Wolff

Contact: anke.jentsch@uni-bayreuth.de
Disturbance Ecology and Vegetation Dynamics,
University of Bayreuth, Germany

Sources:

Plant photos by Flora Helvetica. 6th Edition

Plant Sketches by Rothmaler Exkursionsflora von Deutschland, Atlasband, 12th Edition 2013,
Springer

Species list

| Species | Family | Local name | Page |
|--|------------------------|-----------------------------------|------|
| <i>Acer pseudoplatanus</i> | <i>Sapindaceae</i> | Berg-Ahorn | 98 |
| <i>Acinos arvensis</i> | <i>Lamiaceae</i> | Feld-Steinquendel | 59 |
| <i>Aconitum napellus</i> | <i>Ranunculaceae</i> | Blauer Eisenhut | 84 |
| <i>Actaea spicata</i> | <i>Ranunculaceae</i> | Christophskraut | 85 |
| <i>Agrostis capillaris</i> | <i>Poaceae</i> | Haarstraußgras | 73 |
| <i>Ajuga genevensis</i> | <i>Lamiaceae</i> | Genfer Günsel | 60 |
| <i>Allium lusitanicum</i> | <i>Amaryllidaceae</i> | Berg-Lauch | 7 |
| <i>Allium oleraceum</i> | <i>Amaryllidaceae</i> | Gemüse-Lauch | 7 |
| <i>Alyssum montanum</i> | <i>Brassicaceae</i> | Berg-Steinkraut | 27 |
| <i>Anthericum ramosum</i> | <i>Asparagaceae</i> | Ästige Graslilie | 10 |
| <i>Anthyllis vulneraria</i> | <i>Fabaceae</i> | Echter Wundklee | 52 |
| <i>Aquilegia vulgaris</i> | <i>Ranunculaceae</i> | Gewöhnliche Akelei | 85 |
| <i>Arabidopsis lyrata subsp. petraea</i> | <i>Brassicaceae</i> | Arabis petraea | 27 |
| <i>Arabis alpina</i> | <i>Brassicaceae</i> | Alpen Gänsekresse | 28 |
| <i>Arabis hirsuta</i> | <i>Brassicaceae</i> | Behaarte Gänsekresse | 28 |
| <i>Arabis turrita</i> | <i>Brassicaceae</i> | Turmgänsekresse | 29 |
| <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> | <i>Ericaceae</i> | Immergrüne Bärentraube | 51 |
| <i>Arenaria serpyllifolia</i> | <i>Caryophyllaceae</i> | Quendel-Sandkraut | 37 |
| <i>Arrhenatherum elatius</i> | <i>Poaceae</i> | Glatthafer | 73 |
| <i>Artemisia campestris</i> | <i>Asteraceae</i> | Feld-Beifuß | 14 |
| <i>Artemisia vulgaris</i> | <i>Asteraceae</i> | Gemeiner Beifuß | 14 |
| <i>Asperugo procumbens</i> | <i>Boraginaceae</i> | Schlangenäuglein | 26 |
| <i>Asperula cynanchica</i> | <i>Rubiaceae</i> | Hügel-Waldmeister | 93 |
| <i>Asplenium ceterach</i> | <i>Aspleniaceae</i> | Milzfarn, Schriftfarn | 11 |
| <i>Asplenium ruta-muraria</i> | <i>Aspleniaceae</i> | Mauer-Streifenfarn, Mauerraute | 11 |
| <i>Asplenium scolopendrium</i> | <i>Aspleniaceae</i> | Hirschzunge | 12 |
| <i>Asplenium septentrionale</i> | <i>Aspleniaceae</i> | Nordischer Streifenfarn | 12 |
| <i>Asplenium trichomanes</i> | <i>Aspleniaceae</i> | Braunstieler Streifenfarn | 13 |
| <i>Asplenium viride</i> | <i>Aspleniaceae</i> | Grünstieler Streifenfarn | 13 |
| <i>Aurinia saxatilis</i> | <i>Brassicaceae</i> | Felsensteinkraut | 29 |
| <i>Betula pendula</i> | <i>Betulaceae</i> | Gewöhnliche Birke | 25 |
| <i>Brachypodium pinnatum</i> | <i>Poaceae</i> | Fieder-Zwenke | 74 |
| <i>Brachypodium sylvaticum</i> | <i>Poaceae</i> | Wald-Zwenke | 74 |
| <i>Bromus hordeaceus</i> | <i>Poaceae</i> | Weiche Trespe | 75 |
| <i>Bromus sterilis</i> | <i>Poaceae</i> | Trauben Trespe | 75 |
| <i>Buphthalmum salicifolium</i> | <i>Asteraceae</i> | Weidenblatt-Rindsauge | 15 |
| <i>Bupleurum falcatum</i> | <i>Apiaceae</i> | Sichelblättriges Hasenohr | 8 |
| <i>Calamagrostis arundinacea</i> | <i>Poaceae</i> | Wald-Reitgras | 76 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|----|
| <i>Campanula gentilis</i> | <i>Campanulaceae</i> | Edel-Glockenblume | 34 |
| <i>Campanula persicifolia</i> | <i>Campanulaceae</i> | Pfirsichblättrige Glockenblume | 35 |
| <i>Campanula rotundifolia</i> | <i>Campanulaceae</i> | Rundblättrige Glockenblume | 35 |
| <i>Campanula trachelium</i> | <i>Campanulaceae</i> | Nesselblättrige Glockenblume | 36 |
| <i>Cardamine flexuosa</i> | <i>Brassicaceae</i> | Wald-Schaumkraut | 30 |
| <i>Cardamine impatiens</i> | <i>Brassicaceae</i> | Spring-Schaumkraut | 30 |
| <i>Carex digitata</i> | <i>Cyperaceae</i> | Finger-Segge | 46 |
| <i>Carex flacca</i> | <i>Cyperaceae</i> | Blaugrüne Segge | 47 |
| <i>Carex flava</i> | <i>Cyperaceae</i> | Gelb-Segge | 47 |
| <i>Carex humilis</i> | <i>Cyperaceae</i> | Erd-Segge | 48 |
| <i>Carex montana</i> | <i>Cyperaceae</i> | Berg-Segge | 48 |
| <i>Carlina acaulis</i> | <i>Asteraceae</i> | Schmalblättrige Siberdistel | 15 |
| <i>Cerastium arvense</i> | <i>Caryophyllaceae</i> | Acker-Hornkraut | 37 |
| <i>Cerastium tomentosum</i> | <i>Caryophyllaceae</i> | Filziges Hornkraut | 38 |
| <i>Chelidonium majus</i> | <i>Papaveraceae</i> | Schöllkraut | 69 |
| <i>Chrysosplenium alternifolium</i> | <i>Saxifragaceae</i> | Wechselblättriges Milzkraut | 99 |
| <i>Coronilla vaginalis</i> | <i>Fabaceae</i> | Scheiden-Kronwicke | 52 |
| <i>Corylus avellana</i> | <i>Betulaceae</i> | Haselstrauch | 25 |
| <i>Cota tinctoria</i> | <i>Asteraceae</i> | Färber-Hundskamille | 16 |
| <i>Cotoneaster integrifolius</i> | <i>Rosaceae</i> | Kahle Steinmispel | 88 |
| <i>Crataegus laevigata</i> | <i>Rosaceae</i> | Zweigriffliger Weißdorn | 87 |
| <i>Crataegus monogyna</i> | <i>Rosaceae</i> | Eingriffeliger Weißdorn | 87 |
| <i>Cystopteris fragilis</i> | <i>Cystopteridaceae</i> | Zerbrechlicher Blasenfarn | 49 |
| <i>Cytisus nigricans</i> | <i>Fabaceae</i> | Schwarzwerdender Geißklee | 53 |
| <i>Dianthus carthusianorum</i> | <i>Caryophyllaceae</i> | Gewöhnliche Kartäuser-Nelke | 38 |
| <i>Dianthus gratianopolitanus</i> | <i>Caryophyllaceae</i> | Grenobler Nelke | 39 |
| <i>Draba aizoides</i> | <i>Brassicaceae</i> | Immergrünes Felsenblümchen | 31 |
| <i>Dryopteris filix-mas</i> | <i>Dryopteridaceae</i> | Gewöhnlicher Wurmfarn | 50 |
| <i>Echium vulgare</i> | <i>Boraginaceae</i> | Gemeiner Natternkopf | 26 |
| <i>Epilobium collinum</i> | <i>Onagraceae</i> | Hügel-Weidenröschen | 67 |
| <i>Epilobium montanum</i> | <i>Onagraceae</i> | Berg-Weidenröschen | 67 |
| <i>Erigeron acris ssp. acris</i> | <i>Asteraceae</i> | Scharfes Berufkraut | 16 |
| <i>Erigeron annuus ssp. annuus</i> | <i>Asteraceae</i> | Gewöhnliches Einjähriges Berufkraut | 17 |
| <i>Erysimum crepidifolium</i> | <i>Brassicaceae</i> | Bleicher Schöterich | 31 |
| <i>Erysimum odoratum</i> | <i>Brassicaceae</i> | Duft-Schöterich | 32 |

| | | | |
|--|----------------|-------------------------------------|-----|
| <i>Erysimum repandum</i> | Brassicaceae | Spreiz-Schöterich | 32 |
| <i>Euonymus europaeus</i> | Celastraceae | Europäisches Pfaffenhütchen | 42 |
| <i>Euphorbia cyparissias</i> | Euphorbiaceae | Zypressen Wolfsmilch | 51 |
| <i>Euphrasia officinalis</i> subsp. <i>rostkoviana</i> | Orobanchaceae | Gewöhnlicher Augentrost | 68 |
| <i>Fagus sylvatica</i> | Fagaceae | Rot-Buche | 56 |
| <i>Festuca altissima</i> | Poaceae | Wald-Schwingel | 76 |
| <i>Festuca arundinacea</i> | Poaceae | Rohr-Schwingel | 77 |
| <i>Festuca ovina</i> | Poaceae | Schaf-Schwingel | 77 |
| <i>Festuca pallens</i> | Poaceae | Blasser Schaf-Schwingel | 78 |
| <i>Fragaria vesca</i> | Rosaceae | Wald-Erdbeere | 88 |
| <i>Galeobdolon luteum</i> | Lamiaceae | Echte Goldnessel | 60 |
| <i>Galium anisophyllum</i> | Rubiaceae | Ungleichblättriges Labkraut | 94 |
| <i>Galium glaucum</i> | Rubiaceae | Blaugrünes Labkraut | 94 |
| <i>Galium pumilum</i> | Rubiaceae | Niedriges Labkraut | 95 |
| <i>Galium saxatile</i> | Rubiaceae | Harzer Labkraut | 95 |
| <i>Galium sylvaticum</i> | Rubiaceae | Wald-Labkraut | 96 |
| <i>Galium valdepilosum</i> | Rubiaceae | Mährisches Labkraut | 96 |
| <i>Galium verum</i> | Rubiaceae | Echtes Labkraut | 97 |
| <i>Geranium robertianum</i> | Geraniaceae | Stinkender Storzschnabel | 57 |
| <i>Geranium sanguineum</i> | Geraniaceae | Blut-Storzschnabel | 57 |
| <i>Globularia bisnagarica</i> | Plantaginaceae | Gewöhnliche Kugelblume | 71 |
| <i>Gymnocarpium robertianum</i> | Woodsiaceae | Ruprechtsfarn | 104 |
| <i>Hedera helix</i> | Araliaceae | Gewöhnlicher Efeu | 10 |
| <i>Helianthemum nummularium</i> ssp. <i>obscurum</i> | Thymelaeaceae | Gewöhnliches Sonnenröschen | 101 |
| <i>Hieracium bifidum</i> | Asteraceae | Gabeliges Habichtskraut | 17 |
| <i>Hieracium bupleuroides</i> | Asteraceae | Hasenohr-Habichtskraut | 18 |
| <i>Hieracium calodon</i> | Asteraceae | Pannonicisches Mausohrhabichtskraut | 18 |
| <i>Hieracium franconicum</i> | Asteraceae | Fränkisches Habichtskraut | 19 |
| <i>Hieracium harzianum</i> | Asteraceae | Ehrenbürg-Habichtskraut | 19 |
| <i>Hieracium murorum</i> agg. | Asteraceae | Wald-Habichtskraut | 20 |
| <i>Hieracium pilosella</i> | Asteraceae | Mausohrhabichtskraut | 20 |
| <i>Hieracium schmidtii</i> | Asteraceae | Bleiches Habichtskraut | 21 |
| <i>Hieracium schneidii</i> | Asteraceae | Schneid-Habichtskraut | 21 |
| <i>Hippocrepis comosa</i> | Fabaceae | Hufeisenklee | 53 |
| <i>Hippocrepis emerus</i> | Fabaceae | Strauchwicke | 54 |
| <i>Hylotelephium maximum</i> | Crassulaceae | Große Waldfetthenne | 43 |
| <i>Hylotelephium telephium</i> | Crassulaceae | Große Waldfetthenne | 43 |


| | | | |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------------|----|
| <i>Hypericum perforatum</i> | Hypericaceae | Tüpfel-Hartheu | 59 |
| <i>Impatiens parviflora</i> | Balsaminaceae | Kleines Springkraut | 24 |
| <i>Jacobaea vulgaris</i> | Fabaceae | Jakobs Greiskraut | 54 |
| <i>Karpatiosorbus franconica</i> | Rosaceae | | 89 |
| <i>Knautia arvensis</i> | Dipsacaceae | Acker-Witwenblume | 49 |
| <i>Lactuca perennis</i> | Asteraceae | Blauer Lattich | 22 |
| <i>Lamium maculatum</i> | Lamiaceae | Gefleckte Taubnessel | 61 |
| <i>Lathyrus vernus</i> | Fabaceae | Gewöhnliche Frühlings-Platterbse | 55 |
| <i>Leontodon incanus</i> | Asteraceae | Grauer Löwenzahn | 22 |
| <i>Leucanthemum vulgare</i> | Asteraceae | Wiesen-Margerite | 23 |
| <i>Linum catharticum</i> | Linaceae | Purgier-Lein | 66 |
| <i>Lonicera xylosteum</i> | Caprifoliaceae | Rote Heckenkirsche | 36 |
| <i>Lotus corniculatus</i> | Fabaceae | Gewöhnlicher Hornklee | 55 |
| <i>Lunaria rediviva</i> | Brassicaceae | Wilde Mondviole | 33 |
| <i>Medicago lupulina</i> | Fabaceae | Hopfenklee | 56 |
| <i>Melica ciliata agg.</i> | Poaceae | Wimper-Perlgras | 78 |
| <i>Melica nutans</i> | Poaceae | Nickendes Perlgras | 79 |
| <i>Moehringia muscosa</i> | Caryophyllaceae | Moos-Nabelmiere | 39 |
| <i>Moehringia trinervia</i> | Caryophyllaceae | Dreinervige Nabelmiere | 40 |
| <i>Mycelis muralis</i> | Asteraceae | Mauerlattich | 23 |
| <i>Noccaea montana</i> | Brassicaceae | Berg-Täschelkraut | 33 |
| <i>Odontites luteus</i> | Orobanchaceae | Gelber Zahntrost | 68 |
| <i>Origanum vulgare</i> | Lamiaceae | Gewöhnlicher Dost | 61 |
| <i>Oxalis acetosella</i> | Oxalidaceae | Wald-Sauerklee | 69 |
| <i>Petrorhagia prolifera</i> | Caryophyllaceae | Sprossende Felsennelke | 40 |
| <i>Petrorhagia saxifraga</i> | Caryophyllaceae | Steinbrech-Felsennelke | 41 |
| <i>Picea abies</i> | Pinaceae | Gewöhnliche Fichte | 70 |
| <i>Pimpinella saxifraga</i> | Apiaceae | Gewöhnliche Kleine Bibernelle | 8 |
| <i>Pinguicula vulgaris</i> | Lentibulariaceae | Gemeines Fettblatt, Echtes Fettblatt | 66 |
| <i>Pinus sylvestris</i> | Pinaceae | Wald-Föhre, Gewöhnliche Kiefer | 71 |
| <i>Plantago lanceolata</i> | Plantaginaceae | Spitz-Wegerich | 72 |
| <i>Poa compressa</i> | Poaceae | Platthalm-Rispengras | 79 |
| <i>Poa nemoralis</i> | Poaceae | Hain-Rispengras | 80 |
| <i>Poa pratensis</i> | Poaceae | Wiesen-Rispengras | 80 |
| <i>Polygala chamaebuxus</i> | Polygalaceae | Buchsbärtige Kreuzblume | 81 |
| <i>Polypodium interjectum</i> | Polypodiaceae | Gesägter Tüpfelfarn | 83 |
| <i>Polypodium vulgare</i> | Polypodiaceae | Gemeiner Tüpfelfarn | 83 |

| | | | |
|---|------------------------|---|-----|
| <i>Polystichum aculeatum</i> | <i>Polypodiaceae</i> | Gelappter Schildfarn, Dorniger Schildfarn | 84 |
| <i>Populus tremula</i> | <i>Salicaceae</i> | Zitter-Pappel | 97 |
| <i>Potentilla verna</i> | <i>Rosaceae</i> | Frühlings-Fingerkraut | 89 |
| <i>Prunus avium</i> | <i>Rosaceae</i> | Süsskirsche, Vogelkirsche | 90 |
| <i>Pseudo-fumaria alba</i> | <i>Papaveraceae</i> | Blassgelber Lerchensporn | 70 |
| <i>Rhamnus cathartica</i> | <i>Rhamnaceae</i> | Purgier-Kreuzdorn | 86 |
| <i>Ribes alpinum</i> | <i>Grossulariaceae</i> | Alpen-Johannisbeere | 58 |
| <i>Ribes uva-crispa</i> | <i>Grossulariaceae</i> | Stachelbeere | 58 |
| <i>Rosa canina</i> | <i>Rosaceae</i> | Hunds-Rose | 90 |
| <i>Rosa micrantha</i> | <i>Rosaceae</i> | Kleinblütige Rose | 91 |
| <i>Rosa spinosissima</i> | <i>Rosaceae</i> | Reichstachelige Rose, Pimpinell-Rose | 91 |
| <i>Rubus idaeus</i> | <i>Rosaceae</i> | Himbeere | 92 |
| <i>Rumex acetosa</i> | <i>Polygonaceae</i> | Wiesen-Sauerampfer | 82 |
| <i>Rumex acetosella</i> | <i>Polygonaceae</i> | Kleiner Sauerampfer | 82 |
| <i>Salix caprea</i> | <i>Salicaceae</i> | Sal-Weide | 98 |
| <i>Sambucus nigra</i> | <i>Viburnaceae</i> | Schwarzer Holunder | 102 |
| <i>Sanguisorba minor</i> | <i>Rosaceae</i> | Kleiner Wiesenknopf | 92 |
| <i>Saxifraga rosacea</i> | <i>Saxifragaceae</i> | Rosen-Steinbrech | 99 |
| <i>Saxifraga tridactylites</i> | <i>Saxifragaceae</i> | Dreifingeriger Steinbrech | 100 |
| <i>Scabiosa columbaria</i> | <i>Dipsacaceae</i> | Tauben-Skabiose | 50 |
| <i>Sedum acre</i> | <i>Crassulaceae</i> | Scharfer Mauerpfeffer | 44 |
| <i>Sedum album</i> | <i>Crassulaceae</i> | Weißer Mauerpfeffer | 44 |
| <i>Sedum dasyphyllum</i> | <i>Crassulaceae</i> | Dickblättriger Mauerpfeffer, Buckel-Fetthenne | 45 |
| <i>Sedum rupestre</i> | <i>Crassulaceae</i> | Felsen-Fetthenne | 45 |
| <i>Sedum sexangulare</i> | <i>Crassulaceae</i> | Milder Mauerpfeffer | 46 |
| <i>Seseli libanotis</i> | <i>Apiaceae</i> | Berg-Heilwurz | 9 |
| <i>Sesleria caerulea</i> | <i>Poaceae</i> | Kalk-Blaugras | 81 |
| <i>Silene nutans</i> | <i>Caryophyllaceae</i> | Nickendes Leimkraut | 41 |
| <i>Silene vulgaris</i> | <i>Caryophyllaceae</i> | Gewöhnliches Leimkraut | 42 |
| <i>Sisymbrium austriacum</i> | <i>Brassicaceae</i> | Österreichische Rauke | 34 |
| <i>Sorbus aria</i> | <i>Rosaceae</i> | Gewöhnliche Mehlbeere | 93 |
| <i>Stachys sylvatica</i> | <i>Lamiaceae</i> | Wald-Ziest | 62 |
| <i>Taraxacum sp</i> | <i>Asteraceae</i> | | 24 |
| <i>Taxus baccata</i> | <i>Taxaceae</i> | Gewöhnliche Eibe | 101 |
| <i>Teucrium botrys</i> | <i>Lamiaceae</i> | Trauben-Gamander | 62 |
| <i>Teucrium chamaedrys</i> | <i>Lamiaceae</i> | Edel-Gamander | 63 |
| <i>Teucrium montanum</i> | <i>Lamiaceae</i> | Berg-Gamander | 63 |
| <i>Thalictrum minus</i> | <i>Ranunculaceae</i> | Kleine Wiesenraute | 86 |
| <i>Thymus praecox subsp. <i>praecox</i></i> | <i>Lamiaceae</i> | Frühblühender Thymian | 64 |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-----|
| <i>Thymus pulegioides</i> | <i>Lamiaceae</i> | Arznei-Thymian | 64 |
| <i>Thymus pulegioides subsp. carniolicus</i> | <i>Lamiaceae</i> | | 65 |
| <i>Thymus pulegioides subsp. Pulegioides</i> | <i>Lamiaceae</i> | Arznei Thymian | 65 |
| <i>Urtica dioica</i> | <i>Urticaceae</i> | Große Brennessel | 102 |
| <i>Verbascum lychnitis</i> | <i>Scrophulariaceae</i> | Mehlige Königskerze | 100 |
| <i>Veronica teucrium</i> | <i>Plantaginaceae</i> | Großer Ehrenpreis | 72 |
| <i>Viburnum lantana</i> | <i>Viburnaceae</i> | Wolliger Schneeball | 103 |
| <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> | <i>Apocynaceae</i> | Weisse Schwalbenwurz | 9 |
| <i>Viola hirta</i> | <i>Violaceae</i> | Behaartes Veilchen | 103 |
| <i>Viola rupestris</i> | <i>Violaceae</i> | Sand-Veilchen | 104 |
| <i>Woodsia ilvensis</i> | <i>Woodsiaceae</i> | Rostroter Wimperfarn | 105 |


Allium lusitanicum (Amaryllidaceae) Lam.

Allium senescens



Berg-L. – *A. lusitanicum* 0,15–0,30 ♂ 7–8
▽ (lilapurpur. Ohne Blatthäutchen)


Allium oleraceum (Amaryllidaceae) L.



Gemüse-Lauch – *Allium oleraceum*
0,30–0,60 ♂ 7–8 (lilapurpur. Ohne
Blatthäutchen)


Bupleurum falcatum (Apiaceae) L.

Subsp. *faclatum* for left image



Sichel-H. – *B. falcatum* 0,20–1,00 ♂ 7–9
(gelb)


Pimpinella saxifraga (Apiaceae) L.



L: Kleine Pimpinelle – *Pimpinella saxifraga* 0,05–0,60 ♂ 7–9 (weiß od. gelblich-weiß, selten rosa bis purpur) R: Schwarze P. – *P. nigra* 0,40–0,80 ♂ 7–9 (weiß od. gelblich-weiß)

Seseli libanotis (Apiaceae) (L.) W. D. J. Koch

Libanotis pyrenaica



Berg-Heilwurz – *Seseli libanotis* 0,60–1,20
⊗ 7–8 (weiß od. rötlich)

Vincetoxicum hirundinaria (Apocynaceae) Medik.



Weiße Schwalbenwurz – *Vincetoxicum hirundinaria* 0,30–1,40 ♀ 5–8 (gelblichweiß)

Hedera helix (Araliaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnlicher Efeu – *Hedera helix*
0,10–20,00 ♂ 9–11 (gelbgrün. Fr schwarz)

Anthericum ramosum (Asparagaceae) L.





© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Ästige G. – *A. ramosum* 0,30–0,80 ♀ 6–8
▽ (weiß)

Asplenium ceterach (Aspleniaceae) L.



Milzfarn – *Asplenium ceterach* 0,05–0,20
⌚ 6–8 ▽


Asplenium ruta-muraria (Aspleniaceae) L.




Mauer-Streifenfarn, Mauerraute –
Asplenium ruta-muraria 0,03–0,15 ⌚ 7–9

Asplenium scolopendrium (Aspleniaceae) (L.) Newman



Phyllitis scolopendrium



Asplenium septentrionale (Aspleniaceae) (L.) Hoffm.





Asplenium trichomanes (Aspleniaceae) L.



**Braunstieler St. – *A. trichomanes* s. l.
0,05–0,30 ♂ 7–8 (BlStiel u. Bl-Spindel bis
zur Spitze braun)

Asplenium viride (Aspleniaceae) Huds.



Grünstieler Streifenfarn – *Asplenium
viride* 0,05–0,20 ♂ 7–8 (BlStiel nur am
Grund braun)

Artemisia campestris (Asteraceae) L.

Subsp. *camperstris* for left image



**Feld-B. – *A. campestris* 0,30–0,60 ♂
8–10 (gelb od. rötlich. Bl zuerst seidig
behaart, verkahlend) ↗ S. 791

Artemisia vulgaris (Asteraceae) L.



Gewöhnlicher Beifuß – *A. vulgaris*
0,60–1,50 ♂ 7–11 (gelblich od. rotbraun)

Buphthalmum salicifolium (Asteraceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica / Haupt Verlag



Weidenblatt-Rindsauge – *Buphthalmum salicifolium* 0,15–0,70 ⌚ 6–9 (goldgelb)

Carlina acaulis (Asteraceae) L.

Subsp. *caulescens* for right image



Schmalblättrige Silberdistel – *Carlina acaulis* subsp. *caulescens* (0,03–)0,20–0,60 ⌚ 7–9 ▽

Cota tinctoria (Asteraceae) L.


Anthemis tinctoria



Färber-Hundskamille – *Anthemis tinctoria*
0,30–0,60 ♂ 6–9 (goldgelb, RöhrenB
goldgelb)

Erigeron acris ssp. acris (Asteraceae) L.


Left image not subspecies



**Scharfes B. – *E. acris* subsp. *acris*
0,10–0,30 ♂ (5–)6–7 (rötlich od. bläulich,
RöhrenB gelb) ↗ S. 790


Erigeron annuus ssp. annuus (Asteraceae) (L.) Desf.

Left image not subspecies




*Feinstrahl-Berufkraut – *Erigeron annuus* 0,50–1,00 ♂ 6–9 (weiß od. hellviolet, RöhrenB gelb) ✖ S. 790

Hieracium bifidum (Asteraceae)



*Gabel-Habichtskraut – *Hieracium bifidum* 0,10–0,40 ♀ 5–7 (goldgelb. Bl grün bis blaugrün)

Hieracium bupleuroides (Asteraceae) C. C. Gmel.



*Hasenohr-H. – *H. bupleuroides* 0,20–0,60
⌚ 7–8 (gelb. Bl blaugrün)

Hieracium calodon (Asteraceae) Tausch

Pilosella auriculoides



Hieracium franconicum (Asteraceae) (Griseb.) Zahn



Hieracium harzianum (Asteraceae) Zahn



"Vulgare" type.

- Sheets 0, sit 1-3
- Sheets 5-10(-20), blue. green, lancettl. to br lancetyl., coarsely 1-3-toothed, in the upper third completely margined.
- Overall inflorescence loosely panicled.
- Branches 5-10.
- Head peduncles scattered hairy, moderately hostile, up to abundant. flaky.
- Heads 10-30. bracts, blunt to pointed, hair and glands moderate, to richly flaky at the margins.

Hieracium murorum agg. (Asteraceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



*Wald-H. – *H. murorum* 0,20–0,60 ♂ 5–8
(gelb od. goldgelb)

Hieracium pilosella (Asteraceae) L.

Pilosella officinarum



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Kleines Mausohrhabichtskraut – *Pilosella officinarum* 0,05–0,30 ♂ 5–10 (schwefel-gelb, RandB useits meist rotstreifig)

Hieracium schmidtii (Asteraceae) aggr.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



*Bleiches Habichtskraut – *Hieracium schmidtii* 0,10–0,40 ♂ 5–7 (hellgelb. Bl blaugrün)

Hieracium schneidii (Asteraceae) Schack et Zahn



HERBARIUM MUSEI PARISIENSIS

Lactuca perennis (Asteraceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Blauer L. - *L. perennis* 0,30–0,50 ♂ 5–6
(blau od. blauviolett. Bl blaugrün)

Leontodon incanus (Asteraceae) (L.) Schrank




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Grauer L. - *L. incanus* 0,15–0,45 ♂ 5–6
(goldgelb)


Leucanthemum vulgare (Asteraceae) L.

Leucanthemum ircutianum



*Wiesen-Margerite – *Leucanthemum ircutianum* 0,20–0,80 ♂ 6(–10) (weiß, RöhrenB gelb) ↗ S. 791

Mycelis muralis (Asteraceae) (L.) Dumort.



Gewöhnlicher Mauerlattich – *Mycelis muralis* 0,40–0,80 ♂ 7–8 (hellgelb)

Taraxacum sp (Asteraceae) F.H. Wigg

Impatiens parviflora (Balsaminaceae) DC.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Kleinblütiges S. – *I. parviflora* 0,30–0,60
© 6–9 (gelb)


Betula pendula (Betulaceae) Roth



© K. Lauber




Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche B. – *B. pendula* Bis 25,00 m
4–5 (♂ hell bräunlichgelb, ♀ grün)

Corylus avellana (Betulaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche Hasel – *Corylus avellana*
2,00–6,00 m 2–4 (♀ grün, Narben rot,
 ♂ grünlichgelb)

Asperugo procumbens (Boraginaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Schlängenäuglein – *Asperugo procumbens* 0,20–0,50 ♂ ① 5–8 (erst violett, dann blau, Schlundschuppen weiß)

Echium vulgare (Boraginaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Gewöhnlicher Natternkopf – *Echium vulgare* 0,25–0,80 ♂ 5–10 (erst rosa, dann leuchtendblau)

Alyssum montanum (Brassicaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Berg-St. – *A. montanum* 0,10–0,20 ♂
3–5 ▽ (goldgelb)

Arabidopsis lyrata subsp. *petraea* (Brassicaceae) L.
Cardaminopsis petraea




Felsen-Sch. – *A. petraea* 0,10–0,25 ♂ 5–7
(weiß)

Arabis alpina (Brassicaceae) L.



Alpen-G. – *A. alpina* 0,05–0,40 ♂ 3–10
(weiß)

Arabis hirsuta (Brassicaceae) L.




Behaarte G. – *A. hirsuta* 0,10–0,80 ♂ 5–7 (weiß)

Arabis turrita (Brassicaceae) L.

Pseudoturritis turrita




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Turmgänsekresse – *Pseudoturritis turrita*
0,10–0,70 ♂ 4–6 (gelblichweiß)

Aurinia saxatilis (Brassicaceae) (L.) Desv.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Felsensteinkraut – *Aurinia saxatile*
0,15–0,35 h 4–5 ▽ (leuchtend gelb)

Cardamine flexuosa (Brassicaceae) With.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-Sch. – *C. flexuosa* 0,10–0,50 ♂ ① 24
4–10 (weiß)

Cardamine impatiens (Brassicaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Spring-Schaumkraut – *Cardamine impatiens* 0,10–0,85 ① ♂ 5–7 (Kr weiß, oft fehlend)

Draba aizoides (Brassicaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt V



Immergrünes F. – *D. aizoides* 0,03–0,10 2^c
4–8 ▽ (goldgelb)

Erysimum crepidifolium (Brassicaceae) Rchb.



- Flower light yellow,
ripe pods 0-40°,
crown leafs 11-16 mm,
stem **only** 2-parted hairs,
leafs mostly 2-parted hairs
- Blüte hellgelb, reife Schoten 0-40°,
Kronenblätter 11-16 mm, Stiel **nur**
2-teilig behaart, **Blätter meist 2-**
teilig behaart




Bleicher Sch. – *E. crepidifolium* 0,15–0,80
⊖ ⊕ 4–6 (hellgelb)

Erysimum odoratum (Brassicaceae) Ehrh.




- Crown leafs 13-16 (20) mm, flower **dark yellow** with **strong scent**, pods 0-40°, stem mostly 2-parted but **few 3-parted hairs**, leafs mostly **3-parted hairs**
- Kronenblätter 13-16 (20) mm, Blüte **dunkelgelb** mit **starkem Duft**, Schoten 0-40°, Stängel meist 2-teilig, aber **selten 3-teilig behaart**, Blätter meist **3-teilig behaart**



Duft-Sch. – *E. odoratum* 0,20–0,90 ♂ ⊕
5–7 (sattgelb, duftend)


Erysimum repandum (Brassicaceae) L.

- Flower light yellow, ripe pods **horizontal** (40-90°), annual, **crown leafs 6-8 mm**, leafs with mainly 3-parted and 2-parted hairs
- Blüten hellgelb, reife Schoten **waagerecht** (40-90°), einjährig, **Kronenblätter 6-8 mm**, Blätter mit überwiegend 3-teiligen und 2-teiligen Haaren



Spreiz-Sch. – *E. repandum* 0,15–0,35 ♂ ⊕
3–6 (hellgelb)


Lunaria rediviva (Brassicaceae) L.



Ausdauerndes S. – *L. rediviva* 0,30–1,40
♀ 5–7 ▽ (hellviolett bis weißlich)

Noccea montana (Brassicaceae) (L.) F.K.Mey.

Thlaspi montanum




Berg-T. – *N. montana* 0,10–0,20 ♀ 4–5
(weiß, Staubbeutel gelb bleibend)

Sisymbrium austriacum (Brassicaceae) Jacq.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Österreichische R. – *S. austriacum*
0,30–0,60 ♂ 2½ 5–6 (goldgelb)

Campanula gentilis (Campanulaceae) Kovanda



Very similar to *C. rotundifolia*.

Differences:

- Most **stem leafs** mostly in **lower third of stem** (*rotundifolia*: all over)
- Upper leafs threadlike (*rotundifolia*: linearistic)
- Stem with **very few or 1 flower** (*rotundifolia*: several flowers)

Campanula persicifolia (Campanulaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Pfirsichblättrige G. – *C. persicifolia*
0,30–0,80 ♂ 6–9 (hellblau, selten weiß)

Campanula rotundifolia (Campanulaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



*Rundblättrige G. – *C. rotundifolia*
0,10–0,30 ♂ 6–10 (blauviolett)

Campanula trachelium (Campanulaceae) L.



Lonicera xylosteum (Caprifoliaceae) L.



Arenaria serpyllifolia (Caryophyllaceae) L.



**Quendel-Sandkraut – *Arenaria serpyllifolia* 0,03–0,30 ♂ ⚡ 5–9 (weiß. Pfl graugrün) ↗ S. 786

Cerastium arvense (Caryophyllaceae) L.

Subsp. Arvense



**Acker-H. – *C. arvense* 0,03–0,30 ♀ 4–8 (weiß. Pfl grauflaumig)

Cerastium tomentosum (Caryophyllaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Filziges H. – *C. tomentosum* 0,15–0,30 ♀
5–7 (weiß. Pfl dicht weißfilzig)

Dianthus carthusianorum (Caryophyllaceae) L.

Subsp. *Carthusianorum*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Kartäuser-N. – *D. carthusianorum*
0,15–0,45 ♀ 6–9 ▽ (dunkelpurpur bis
rosa, dunkler geadert)

Dianthus gratianopolitanus (Caryophyllaceae) vill.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Pfingst-Nelke – *Dianthus gratianopolitanus*
0,10–0,25 ♂ 5–6 ▽ (hellpurpur, ohne
Zeichnung. Bl blaugrün)

Moehringia muscosa (Caryophyllaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Moos-N. – *M. muscosa* 0,05–0,20 ♂ 5–9
(weiß)

***Moehringia trinervia* (Caryophyllaceae) (L.) Clairv.**



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Dreinervige Nabelmiere – *Moehringia trinervia* 0,10–0,30 ♂ ♀ 5–7 (weiß)

***Petrorhagia prolifera* (Caryophyllaceae) (L.) P.W.Ball & Heywood**




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Sprossendes Nelkenköpfchen – *Petrorhagia prolifera* 0,15–0,45 ♂ ♂ 6–10 (rosa)

Petrorhagia saxifraga (Caryophyllaceae) (L.) Link




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag.




Felsenkelke – *P. saxifraga* 0,10–0,35 ♂
6–9 (helllila bis sattrosa, dunkler geadert)

Silene nutans (Caryophyllaceae) L.



Nickendes L. – *S. nutans* 0,30–0,50 ♂ 5–8
(weiß, USeite oft grünlich od. rötlich, nur
nachts geöffnet)

Silene vulgaris (Caryophyllaceae) (Moench) Garcke




**Gewöhnliches Leimkraut – *S. vulgaris*
0,10–0,60 ♂ 6–9 (weiß. K grünlichweiß od.
rötlich. Pfl blaugrün)

Euonymus europaeus (Celastraceae) L.



Europäisches Pfaffenhütchen –
Euonymus europaeus 1,50–3,00 ♂ 5–6
(hellgrün. Fr rosa, SaMantel orange)



***Hylotelephium maximum* (Crassulaceae) (L.) Kirsch.**
Sedum telephium subsp. *maximum*



Große W. – *H. maximum* 0,30–0,80 ⚒ 7–9 (grünlich, selten röthlich). Ähnlich **Purpur**
H. telephium (B rosa bis dunkelrot. Fr außen rinnig. BlGrund keilförmig verschmäler.
 Bl wechselständig)

***Hylotelephium telephium* (Crassulaceae) (L.) H. Ohba.**

Sedum telephium, *Sedum maximum*
 Subsp. *telephium* for image 1




Große W. – *H. maximum* 0,30–0,80 ⚒ 7–9 (grünlich, selten röthlich). Ähnlich **Purpur**
H. telephium (B rosa bis dunkelrot. Fr außen rinnig. BlGrund keilförmig verschmäler.
 Bl wechselständig)

Sedum acre (Crassulaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Scharfer Mauerpfeffer – *Sedum acre*
0,03–0,15 ♂ 6–8 (gelb)

Sedum album (Crassulaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Weiße F. – *S. album* 0,08–0,20 ♂ 6–9
(weiß)

Sedum dasypHYLLUM (Crassulaceae) L.



© K. Laubér - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Buckel-F. – *S. dasypHYLLUM* 0,03–0,10 ♀
6–8 (weiß, außen zuweilen rötlich)

Sedum rupestre (Crassulaceae) L.

Sedum reflexum



© K. Laubér - Flora Helvetica - Haupt Verlag




*Felsen-Fetthenne – *Sedum rupestre*
0,10–0,35 ♀ 6–8 (gelb) ✕ S. 784

Sedum sexangulare (Crassulaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Milder M. – *S. sexangulare* 0,05–0,15 2|
6–7 (gelb)

Carex digitata (Cyperaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Finger-S. – *C. digitata* 0,10–0,30 2| 5
(Sp rotbraun, grün gekieft, weißrandig.
Pfl unten dunkelrot)

Carex flacca (Cyperaceae) Schreber



© K. Lauber



Flora Helvetica - Haupt Verlag




Blaugrüne S. – *C. flacca* 0,20–0,60 ♂ 5–7
(Sp schwarzbraun, Schläuche grün od.
schwarz)

Carex flava (Cyperaceae) L. s. str.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Gelb-Segge – *Carex flava* 0,20–0,60 ♂ 5–9 (Sp gelb- bis rostbraun, grün gekielt,
Schläuche hellgelb, Pfl gelbgrün)

Carex humilis (Cyperaceae) Leyss.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Erd-S. – *C. humilis* 0,03–0,15 ♂ 4–5
(Sp braun, weißrandig. Pfl unten rot. Bl
graugrün)

Carex montana (Cyperaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Berg-S. – *C. montana* 0,10–0,30 ♂ 3–5
(Sp braun, Schläuche grün, oben oft braun.
Pfl unten rot)

Cystopteris fragilis (Cystopteridaceae) (L.) Bernh.



Zerbrechlicher B. – *C. fragilis* 0,10–0,50 ♂
7–9; (Spore unten: Runzelsporiger B. – *C. dickieana*) ✕ S. 781

Knautia arvensis (Dipsacaceae) (L.) Coult.




*Acker-Witwenblume – *Knautia arvensis*
0,30–0,80 ♂ 7–8 (bläulichrot bis violett)

Scabiosa columbaria (Dipsacaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Tauben-S. – *S. columbaria* 0,25–0,60 ♂
7–11 (blaulila, KBorsten schwärzlich)

Dryopteris filix-mas (Dryopteridaceae) (L.) Schott





© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Gewöhnlicher W. – *D. filix-mas* 0,30–1,20
♂ 7–9

Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) L.




Echte Bärentraube – *Arctostaphylos uva-ursi* 0,20–0,60 h 3–7 ▽ (weiß bis rosa, KrZipfel rötlich. Fr rot)

Euphorbia cyparissias (Euphorbiaceae) L.



Zypressen-Wolfsmilch – *Euphorbia cyparissias* 0,15–0,30 2 4–5 (grünlichgelb, später rötend)

Anthyllis vulneraria (Fabaceae) L.




**Gewöhnlicher Wundklee – *Anthyllis vulneraria* 0,05–0,60(–0,90) ♂ 5–8 (gelb, weißlich od. rötlich)

Coronilla vaginalis (Fabaceae) Lam.




Scheiden-Kronwicke – *Coronilla vaginalis* 0,05–0,10 h 5–7 (gelb)

Cytisus nigricans (Fabaceae) L.



Schwarzwerdender Geißklee – *Cytisus nigricans* 0,30–1,20 h, h, 6–8 (gelb. Bl. trocken schwarz)


Hippocrepis comosa (Fabaceae) L.



Hufeisenklee – *H. comosa* 0,08–0,25 ♀ h
5–7 (gelb)

Hippocrepis emerus (Fabaceae) L.


Subsp. Lassen



Strauchwicke – *Hippocrepis emerus* 1,00–2,00 ♂ 5–7 (gelb)

Jacobaea vulgaris (Fabaceae) L.

Senecio jacobaea




**Jakobs-G. – *S. jacobaea* 0,30–1,00 ♂ ☿ ☺
⌚ 7–9 (goldgelb) ✕ S. 790

Lathyrus vernus (*Fabaceae*) (L.) Bernh.

Subsp. *Vernus*



Lotus corniculatus (*Fabaceae*) L.



Medicago lupulina (Fabaceae) L.



Hopfen-Luzerne – *Medicago lupulina*
0,15–0,60 ♂ bis ♀ 5–10 (gelb)

Fagus sylvatica (Fagaceae) L.



**Rot-Buche – *Fagus sylvatica* Bis 40,00 ♂
4–5 (rötlichbraun)**

Geranium robertianum (Geraniaceae) L.

Subsp. Robertianum



**Stinkender St. – *G. robertianum*
0,20–0,40 ♂ Ⓛ 5–10 (hellpurpur)

Geranium sanguineum (Geraniaceae) L.



Blut-Storchschnabel – *Geranium sanguineum* 0,15–0,50 ♂ 6–8 (purpurrot)

Ribes alpinum (Grossulariaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Alpen-Johannisbeere – *Ribes alpinum*
0,80–1,50 ḥ, 4–5 (grünlichgelb, unvollkommen zweihäusig. Fr rot)

Ribes uva-crispa (Grossulariaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Stachelbeere – *Ribes uva-crispa* 0,60–1,20
ḥ, 4–5 (grünlichgelb. Fr grün, gelb od.
purpurn)

Hypericum perforatum (*Hypericaceae*) L.

Subsp. *Perforatum*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Tüpfel-H. – *H. perforatum* 0,15–0,80 2|
6–8 (goldgelb, wie KBl schwarz punktiert)

Acinos arvensis (*Lamiaceae*)



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnlicher S. – *A. arvensis* 0,10–0,30
♂ ♂ 6–9 (blässlila)

Ajuga genevensis (Lamiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Heide-G. – *A. genevensis* 0,07–0,30 ♂ 4–6
(meist dunkelblau)**

Galeobdolon luteum (Lamiaceae) L.

Lamium galeobdolon

Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. *galeobdolon*



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Echte Goldnessel – *Galeobdolon luteum*
0,15–0,40 ♂ 5–7 (gelb)**

Lamium maculatum (Lamiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gefleckte T. – *L. maculatum* 0,15–0,60 ♂
4–9 (purpur)

Origanum vulgare (Lamiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Gewöhnlicher Dost – *Origanum vulgare*
0,20–0,60 ♂ 7–9 (hellpurpur, selten weiß)
↗ S. 788

Stachys sylvatica (Lamiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-Z. – *S. sylvatica* 0,30–1,00 ♂ 6–9
(dunkel braunrot)

Teucrium botrys (Lamiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Trauben-Gamander – *Teucrium botrys*
0,10–0,40 ♂ ♂? 7–9 (rötlich)

Teucrium chamaedrys (Lamiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Edel-Gamander – *Teucrium chamaedrys*
0,10–0,30 h 7–9 (hellpurpur)

Teucrium montanum (Lamiaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Berg-G. – *T. montanum* 0,05–0,35 h 6–9
(hellgelb)

Thymus praecox subsp. *praecox* (Lamiaceae)



**Frühblühender Th. – *Th. praecox*
0,03–0,15 h 5–7 (hell- bis dunkelpurpur)
↗ S. 788

Thymus pulegioides (Lamiaceae) L.



*Arznei-Th. – *Th. pulegioides* 0,05–0,30 h
6–9 (hell- bis dunkelpurpur) ↗ S. 788

Thymus pulegioides subsp. *carniolicus* (Lamiaceae) P.A.Schmidt




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag

Thymus pulegioides subsp. *Pulegioides* (Lamiaceae) L.



*Arznei-Th. – *Th. pulegioides* 0,05–0,30 h
6–9 (hell- bis dunkelpurpur) ↗ S. 788

Pinguicula vulgaris (Lentibulariaceae) L.



Echtes F. – *P. vulgaris* 0,05–0,15 ♂ 5–6 ▽
(violettblau)

Linum catharticum (Linaceae) L.




Purgier-Lein – *Linum catharticum*
0,05–0,30 ♂ 6–7 (weiß, Grund gelb)

Epilobium collinum (Onagraceae) C. C. Gmel.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hügel-W. – *E. collinum* 0,10–0,40 ♂ 6–9
(rosa. Stg graugrün)

Epilobium montanum (Onagraceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Berg-W. – *E. montanum* 0,10–0,80 ♂ 6–9
(rosa. Stg grasgrün)

***Euphrasia officinalis* subsp. *rostkoviana* (Orobanchaceae)** (Hayne) F. Towns.

Euphrasia rostkoviana




Gewöhnlicher A. – *E. officinalis* 0,01–0,45
∅ 5–10 (weiß, bläulich od. gelb) ↗ S. 788

***Odontites luteus* (Orobanchaceae)** (L.) Clairv.



© K. Lüder - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Gelber Z. – *O. luteus* 0,15–0,60 ∅ 7–10
(gelb)

Oxalis acetosella (Oxalidaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-Sauerklee – *Oxalis acetosella*
0,05–0,12 ♂ 4–5 (weiß, purpur geaderd)

Chelidonium majus (Papaveraceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Schöllkraut – *Chelidonium majus*
0,30–0,70 ♂ 4–10 (gelb. Milchsaft orange)

Pseudo-fumaria alba (Papaveraceae) (Mill.) Lidén

Corydalis alba (Mill.) Mansf.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Blassgelber S. – *P. alba* 0,10–0,40 2‡
6–10 (weißlich, Spitze dunkler, gelblich. Bl
beidseits blaugrün)**

Picea abies (Pinaceae) (L.) H.Karst.





© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Gewöhnliche F. – *P. abies*
Bis 50,00 (~60,00) 1‡ 4–6 (Nadeln allseits
dunkelgrün. Zapfen braun)**

Pinus sylvestris (Pinaceae) L.



**Gewöhnliche Kiefer – *Pinus sylvestris*
Bis 30,00(–40,00) ♂, 5–6 (Zapfen matt graubraun. Stamm oben hell rotbraun)

Globularia bisnagarica (Plantaginaceae) L.

Globularia punctata



Gewöhnliche K. – *G. bisnagarica*
0,05–0,30 ♀ 5–6 ▽ (blaulila)

Plantago lanceolata (Plantaginaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Spitz-Wegerich – *Plantago lanceolata*
0,10–0,50 ♂ 5–9 (StaubBl. blassgelb, Kr
bräunlich)

Veronica teucrium (Plantaginaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Großer E. – *V. teucrium* 0,30–0,80 ♂ 6–7
(azurblau, dunkler geadert)

Agrostis capillaris (Poaceae) L.



Arrhenatherum elatius (Poaceae) (L.) J. Presl & C. Presl



Brachypodium pinnatum (Poaceae) (L.) P. Beauv.



*Fieder-Zwenke – *Brachypodium pinnatum* 0,60–1,00 ♂ 6–7

Brachypodium sylvaticum (Poaceae) (Huds.) P. Beauv.




Wald-Z. – *B. sylvaticum* 0,60–1,20 ♂ 7–8

© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag

Bromus hordeaceus (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Weiche T. – *B. hordeaceus* 0,05–0,80 ♂
thominei 0,05–0,15 ♂ ① ② 5–7 ✕ S. 783

Bromus sterilis (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Taube T. – *B. sterilis* 0,30–0,60 ♂ ① 5–6

Calamagrostis arundinacea (Poaceae) (L.) Roth



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Wald-R. – *C. arundinacea* 0,60–1,20 2 6–7

Festuca altissima (Poaceae) All.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-Sch. – *F. altissima* 0,60–1,20 2 6–7

Festuca arundinacea (Poaceae) Schreb.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Rohr-Sch. – *F. arundinacea* 0,60–1,80 ♂
6–7 (GrundBl Scheiden weißlich)

Festuca ovina (Poaceae) L. agg.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Schaf-Sch. – *F. ovina* 0,20–0,70 ♂ 5–8


Festuca pallens (Poaceae) Host



Melica ciliata agg. (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Wimper-P. – *M. ciliata* 0,20–0,70 ♂ 6
(Bl graugrün)

Melica nutans (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Nickendes P. – *M. nutans* 0,30–0,60 ♂ 5–6
(Hsp braunrot)

Poa compressa (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Platthalm-R. – *P. compressa* 0,20–0,80
♂ 6–7

Poa nemoralis (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hain-Rispengras - *Poa nemoralis*
0,30–0,80 2 6–7

Poa pratensis (Poaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




*Wiesen-R. - *P. pratensis* 0,20–0,90 2
5–6 ✕ S. 783

Sesleria caerulea (Poaceae) L.

Sesleria albicans



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Kalk-B. – *S. caerulea* 0,10–0,45 ♂ 3–5

Polygala chamaebuxus (Polygalaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Zwergbüchs – *Polygala chamaebuxus*
0,10–0,25 ♂ 4–8 (gelb-weiß, selten röthlich
überlaufen)

Rumex acetosa (Polygonaceae) L.



Wiesen-Sauerampfer – *Rumex acetosa*
0,30–1,00 ♂ 5–7 (rötlichgrün)

Rumex acetosella (Polygonaceae) L.



Kleiner S. – *R. acetosella 0,10–0,30 ♀
5–7 (grünlich. Formenreich)

***Polypodium vulgare* (Polypodiaceae) L.**

Leaf blade 3.5 - 5 times longer than broad, spores ripen July-august



Gewöhnlicher Tüpfelfarn – *Polypodium vulgare* 0,10–0,50 ♂ 8–9 (Sori schleierlos)

***Polypodium interjectum* (Polypodiaceae) Shivas**

Leaf blade 1.5 - 2.5 (3) times longer than broad, spores ripen august-september

Images/Polypodium_interjectum_1.jpg

Images/Polypodium_interjectum_2.jpg


Polystichum aculeatum (*Polypodiaceae*) (L.) Roth



© K. Lauber



Flora Helvetica - Haupt Verlag



3 Dorniger Sch. – *P. aculeatum* 0,60–1,00 ♂
8–9 ▽ (Bl ledig, immergrün)

Aconitum napellus (*Ranunculaceae*) L.




Blauer E. – *A. napellus* subsp. *lusitanicum*
0,30–2,00 ♂ 6–8 ▽ (tiefblau bis
dunkelviolett) ↗ S. 783

Actaea spicata (Ranunculaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Christophskraut – *Actaea spicata*
0,30–0,60 ♂ 5–6 (weiß. Fr schwarz)

Aquilegia vulgaris (Ranunculaceae) L.





© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche Akelei – *Aquilegia vulgaris*
0,40–0,80 ♀ 5–7 ▽ (blauviolett, selten rosa
od. weiß)

Thalictrum minus (Ranunculaceae) L.



**Kleine W. – *Th. minus* 0,15–1,20 ♂ 5–8
(gelblich)

Rhamnus cathartica (Rhamnaceae) L.




Purgier-K. – *Rh. cathartica* 1,00–3,00
∅ 5–6 (gelblichgrün. Fr von grün sofort
schwarz färbend)

Crataegus laevigata (Rosaceae) (Poir.) DC.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Zweigriffliger Weißdorn – *Crataegus laevigata* subsp. *laevigata* Bis 8,00 ₋ (weiß. Fr dunkelrot. Auch Baum)

Crataegus monogyna (Rosaceae) Jacq.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Eingrifflicher W. – *C. monogyna* Bis 12,00 ₋ 5–6 (weiß od. rot. Fr dunkelrot. BlÜSeite bläulichgrün. Auch Strauch)

Cotoneaster integrerrimus (Rosaceae) Medik.



© K. Lauber




Flora Helvetica - Haupt Verlag



Gewöhnliche Zwergmispel – *Cotoneaster integrerrimus* 0,50–2,00 ♂ 4–5 ▽ (weiß od. rosa. Fr rot, selten weiß)

Fragaria vesca (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wald-E. – *F. vesca* 0,05–0,20 ♀ 5–6 (weiß. Spitzen der BlZähne hellrosa, grün gesäumt)

Karpatiosorbus franconica (Rosaceae) (Bornm.) Sennikov & Kurtto
Sorbus franconica




Potentilla verna (Rosaceae) L.

Potentilla tabernaemontani



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Frühlings-K. – *P. vernalis* 0,05–0,30 ♂
4–6 ♀ (gelblichweiß, außen hellviolett
überlaufen)

Prunus avium (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



**Vogel-Kirsche, Süß-K. – *P. avium*
Bis 25,00 ₣ 4–5 (weiß. Fr schwarzrot bis
gelbrot)

Rosa canina (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Hunds-R. – *R. canina* 1,00–3,50 ₣ 5–7
(blassrosa od. weiß. Formenreich)

Rosa micrantha (Rosaceae) Borrer ex Sm.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Kleinblütige R. – *R. micrantha*

(1,00–)2,00–3,00 ♂ 6–7 (weiß od. blassrosa. Bl schwach nach Apfel duftend)

Rosa spinosissima (Rosaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Pimpinell-R. – *R. spinosissima* 0,20–1,20
♂ 5–6 (weiß, gelblich, selten blassrosa. Fr schwarzbraun)

Rubus idaeus (Rosaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica 4 - Haupt Verlag



Himbeere – *R. idaeus* 0,60–2,00 ♂ 5–6
(weiß. Fr rot. BlüSeite weißfilzig. Stacheln violett)

Sanguisorba minor (Rosaceae) Scop.




****Kleiner Wiesenknopf** – *Sanguisorba minor* 0,15–0,50(–0,80) ♀ 5–8 (erst grünlich, dann rötlich)

Sorbus aria (Rosaceae) aggr.

Aria edulis



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



*Gewöhnliche Mehlbeere – *Sorbus aria*
Bis 10,00 ♂, 5–6 (weiß. Fr orange bis rot.
Bluseite weißfilzig)

Asperula cynanchica (Rubiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Hügel-M. – *A. cynanchica* 0,05–0,30 ♀
6–9 (weiß, außen rosa überlaufen)

Galium anisophyllum (Rubiaceae) Vill.



*Ungleichblättriges L. – *G. anisophyllum*
0,05–0,15 ♂ 7–9 (gelblichweiß bis weiß)
↗ S. 787

Galium glaucum (Rubiaceae) L.



Blaugrünes Labkraut – *G. glaucum*
0,30–0,60 ♂ 5–7 (weiß. Bl u. Stg blaugrün
bis weißlichgrün)

Galium pumilum (Rubiaceae) Murray




Galium saxatile (Rubiaceae) L.



Galium sylvaticum (Rubiaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Wald-L. – *G. sylvaticum* 0,30–1,00 ♂ 7–8
(weiß. Ganze Pfl blaugrün)

Galium valdepilosum (Rubiaceae) Heinr. Braun



Galium verum (Rubiaceae) L.

Subsp. *verum*



*Echtes Labkraut – *Galium verum*
0,20–0,70 ♂ 6–9 (zitronen- bis goldgelb)
↗ S. 787

Populus tremula (Salicaceae) L.




Zitter-P. – *P. tremula* Bis 25,00 ♂ 3–4
(♂ purpurgrau, ♀ rötlch, Narben purpur)

Salix caprea (Salicaceae) L.



Sal-Weide – *Salix caprea* 3,00–10,00 ♂ 3–4 (♂ goldgelb, ♀ grün. Zweige kahl, nur anfangs weißhaarig)


Acer pseudoplatanus (Sapindaceae) L.



Chrysosplenium alternifolium (Saxifragaceae) L.



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Wechselblättriges Milzkraut –
Chrysosplenium alternifolium 0,15–0,20 24
4–6 (gelb. HochBl gelbgrün)

Saxifraga rosacea (Saxifragaceae) Moench



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




**Rasen-St. – *S. rosacea* 0,05–0,25 24 5–7 ▽ (weiß. Bl weich. Dargestellt ist subsp. *rosacea*.)

Saxifraga tridactylites (Saxifragaceae) L.



© K. Lüther - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Finger-Steinbrech – *Saxifraga tridactylites*
0,02–0,18 ♂ ⊖ 4–6 (weiß)

Verbascum lychnitis (Scrophulariaceae) L.





© K. Lüther - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Mehlige Königskerze – *Verbascum lychnitis* 0,60–1,20 ⊖ ⊙ 6–8 (hellgelb od.
weiß, Staubfäden weißwollig)

Taxus baccata (Taxaceae) L.



Gewöhnliche Eibe – *Taxus baccata*
Bis 15,00(–18,00) ♂, 3–5 ▽ (Nadeln oseits dunkelgrün, useits heller. Samenmantel rot)

Helianthemum nummularium ssp. *obscurum* (Thymelaeaceae)
(Celak.) Holub




****Gewöhnliches Sonnenröschen – *Helianthemum nummularium*** 0,10–0,20 ♂
5–10 (gelb od. gelblichweiß)

Urtica dioica (Urticaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




****Große Brennnessel – *Urtica dioica*** 0,30–1,50 ♂ 7–10 (grün. Pfl meist 2häusig, seltener 1häusig. Brennhaare u. kurze drüslose Haare. BlStiele flaumhaarig. BIOSeite dunkelgrün, matt od. kaum glänzend) > S.785

Sambucus nigra (Viburnaceae) L.




© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Schwarzer Holunder – *Sambucus nigra* 3,00–7,00 ♂ 6–7 (weiß, Staubbeutel hellgelb. Fr über rötlichbraun reif schwarz. FrStiele oft rot überlaufen. StgMark weiß)

Viburnum lantana (Viburnaceae) L.



Wolliger Sch. – *V. lantana* 1,00–3,00 ♂
4–6 (schmutzigweiß. Fr erst rot, vollreif
schwarz)

Viola hirta (Violaceae) L.



Behaartes V. – *V. hirta* 0,05–0,25 ♀ 4–5
(blau, Sporn rötlichviolett)

Viola rupestris (Violaceae) F.W.Schmidt



© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag




Sand-V. – *V. rupestris* 0,03–0,08 ♂ 5–6
(blauviolett, selten rötlich)

Gymnocarpium robertianum (Woodsiaceae) (Hoffm.) Newman





© K. Lauber - Flora Helvetica - Haupt Verlag



Ruprechtsfarn – *Gymnocarpium robertianum* 0,15–0,55 ♂ 7–8

Woodsia ilvensis (Woodsiaceae) (L.) R. Br.



Rostroter W. – *W. ilvensis* 0,10–0,20 24
7–8 ▽

Non-Vascular Plants

Bryophytes

Hornworts

- Thalloid body like some liverworts
- Reproductive structures: elongated and horn-like



Bryophytes

Liverworts

- Leafy like mosses, but flatter, more ribbon-like appearance, less obvious differentiation between stems and leaves
- Thalloid: flat and spread out like a thin crust.



Bryophytes

Mosses: Acrocarpous mosses

- Clearly differentiated stems and leaves
- Growth pattern: upright, tend to form dense clumps
- Reproductive placement: reproductive structures at the top of vertical stems
- Environmental preference: adaptive to varying moisture conditions, can survive drying



Bryophytes

Mosses: Pleurocarpous mosses

- Growth pattern: Pleurocarpous mosses spread out, forming mats
- Reproductive placement: along the sides of branches
- Environmental preference: consistently wet habitats



Lichens

Crustose

- Crust adhering tightly to the substrate
- Cannot be removed without damaging the substrate
- Most common morphotype in cliff plots!



Lichens

Foliose

- Leaf-like lichens
- Attached at some points: some parts lift away from the substrate.
- Flat, leafy appearance, distinct upper and lower surface



Lichens

Fruticose

- Bushy or hair-like
- Grow away from the substrate in all directions
- Often cylindrical or branched
- Do not have a distinct upper and lower surface.

