

**ANALISIS PERBEDAAN DURASI WAKTU DOOMSCROLLING MEDIA
SOSIAL BERDASARKAN GENDER
DAN
ANALISIS PENGARUH DURASI MENONTON KONTEN VIDEO
PENDEK TERHADAP FREKUENSI FENOMENA EARWORM (LAGU
VIRAL YANG TERNGIANG-NGIANG) SAAT MENGIKUTI
PERKLULIAHAN**



INSTIKI
INSTITUT BISNIS DAN
TEKNOLOGI INDONESIA

Dosen Pengampu:

Dr. Hamid, M.Si

Oleh:

I PUTU EVO WIRA SAPUTRA

2401010250

I MADE JULI ASTAWA

2401010239

KELAS C

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
INSTITUT BISNIS DAN TEKNOLOGI INDONESIA
TAHUN 2026**

1. Project Uji Independent Sample T-Test

Analisis Perbedaan Durasi Waktu Doomscrolling Media Sosial Berdasarkan Gender

1. Topik Penelitian

Penelitian ini mengangkat topik mengenai perilaku doomscrolling, yaitu kebiasaan menggulir konten negatif atau berlebihan di media sosial dalam durasi yang lama. Fenomena ini semakin umum terjadi seiring tingginya penggunaan media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan durasi waktu doomscrolling antara kelompok laki-laki dan perempuan.

Variabel yang diukur adalah durasi doomscrolling (dalam satuan menit per hari), sedangkan variabel pembanding adalah gender (jenis kelamin).

2. Kelompok Pembanding

Penelitian membandingkan dua kelompok yang berdiri sendiri (independen), yaitu:

- Kelompok 1: Laki-laki (kode 1), sebanyak 25 responden.
- Kelompok 2: Perempuan (kode 2), sebanyak 25 responden.

Kedua kelompok bersifat saling bebas karena setiap responden hanya termasuk dalam satu kelompok, sehingga uji yang sesuai adalah Independent Sample T-Test.

3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan secara daring menggunakan Google Form. Responden mengisi estimasi durasi waktu yang dihabiskan untuk doomscrolling media sosial per hari. Total responden yang terkumpul sebanyak 50 orang, terbagi merata menjadi 25 laki-laki dan 25 perempuan. Seluruh data valid dan tidak terdapat data yang hilang (missing).

NO	Jenis Kelamin	Durasi Doomscrolling
1	Laki laki	175
2	Laki laki	120
3	Laki laki	120
4	Laki laki	180
5	Laki laki	120
6	Laki laki	200
7	Laki laki	250
8	Laki laki	180
9	Laki laki	50
10	Laki laki	150

11	Laki laki	120
12	Laki laki	120
13	Laki laki	180
14	Laki laki	180
15	Laki laki	130
16	Laki laki	180
17	Laki laki	30
18	Laki laki	322
19	Laki laki	180
20	Laki laki	120
21	Laki laki	232
22	Laki laki	90
23	Laki laki	120
24	Laki laki	120
25	Laki laki	60
26	Perempuan	240
27	Perempuan	270
28	Perempuan	90
29	Perempuan	60
30	Perempuan	75
31	Perempuan	30
32	Perempuan	300
33	Perempuan	300
34	Perempuan	360
35	Perempuan	150
36	Perempuan	150
37	Perempuan	40
38	Perempuan	160
39	Perempuan	180
40	Perempuan	300

41	Perempuan	180
42	Perempuan	160
43	Perempuan	120
44	Perempuan	240
45	Perempuan	120
46	Perempuan	150
47	Perempuan	300
48	Perempuan	150
49	Perempuan	55
50	Perempuan	150

Ringkasan statistik deskriptif kedua kelompok adalah sebagai berikut:

Group Statistics

	Gender	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Data	Laki	25	149.16	64.069	12.814
	Perempuan	25	173.20	93.071	18.614

Secara deskriptif, rata-rata durasi doomscrolling perempuan (173,20 menit) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (149,16 menit), dengan selisih 24,04 menit

4. Hasil Analisis

4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data setiap kelompok berdistribusi normal, sebagai syarat penggunaan uji parametrik. Karena jumlah sampel per kelompok kecil ($n = 25 < 50$), digunakan uji Shapiro-Wilk.

Tests of Normality

		Shapiro-Wilk		
	Gender	Statistic	df	Sig.
Data	Laki	.940	25	.145
	Perempuan	.941	25	.157

Dasar pengambilan keputusan: jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi normal. Kedua kelompok memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 (0,145 dan 0,157),

sehingga data dinyatakan berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

4.2 Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varians kedua kelompok sama (homogen). Uji ini menggunakan Levene's Test for Equality of Variances.

Levene's Test for Equality of Variances			
		F	Sig.
Data	Equal variances assumed	3.744	.059

Dasar pengambilan keputusan: jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka varians homogen. Nilai signifikansi Levene's Test sebesar 0,059 ($> 0,05$), sehingga varians kedua kelompok dinyatakan homogen. Dengan demikian, pembacaan hasil t-test menggunakan baris "Equal variances assumed".

4.3 Independent Sample T-Test

Karena kedua asumsi (normalitas dan homogenitas) telah terpenuhi, analisis dilanjutkan dengan Independent Sample T-Test untuk menguji perbedaan rata-rata durasi doomscrolling antara laki-laki dan perempuan.

Independent Samples Test									
		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means					
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference
Data	Equal variances assumed	3.744	.059	-1.064	48	.293	-24.040	22.598	-69.477 21.397
	Equal variances not assumed			-1.064	42.575	.293	-24.040	22.598	-69.627 21.547

Dalam membaca tabel di atas, terdapat tiga kolom utama yang menjadi fokus analisis:

- Kolom Levene's Test (F dan Sig.) dibaca terlebih dahulu untuk menentukan baris yang digunakan. Karena nilai Sig. Levene sebesar 0,059 ($> 0,05$), varians dinyatakan homogen, sehingga pembacaan menggunakan baris "Equal variances assumed".
- Kolom Sig. (2-tailed) merupakan kolom utama untuk pengambilan keputusan hipotesis. Apabila nilainya $> 0,05$ maka H_0 diterima, dan apabila $< 0,05$ maka H_0 ditolak. Pada penelitian ini nilainya sebesar 0,293.

- Kolom t dan df merupakan nilai pelengkap yang dilaporkan sebagai bukti statistik, yaitu $t(48) = -1,064$. Nilai ini tidak digunakan untuk mengambil keputusan, melainkan untuk pelaporan hasil.

Adapun kolom Mean Difference sebesar -24,040 hanya menunjukkan selisih rata-rata durasi doomscrolling antara kedua kelompok, dan bukan merupakan dasar pengambilan keputusan.

5. Penafsiran Hasil

Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

- H0: Tidak ada perbedaan durasi doomscrolling antara laki-laki dan perempuan.
- H1: Ada perbedaan durasi doomscrolling antara laki-laki dan perempuan.

Dasar pengambilan keputusan: jika nilai signifikansi (2-tailed) $> 0,05$ maka H0 diterima; jika $< 0,05$ maka H0 ditolak.

Hasil Independent Sample T-Test menunjukkan nilai $t = -1,064$ dengan $df = 48$ dan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,293. Karena nilai signifikansi (0,293) lebih besar dari taraf nyata 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada durasi doomscrolling antara kedua kelompok.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada durasi waktu doomscrolling media sosial antara kelompok laki-laki dan perempuan. Meskipun secara deskriptif rata-rata durasi doomscrolling perempuan (173,20 menit) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (149,16 menit), selisih sebesar 24,04 menit tersebut tidak bermakna secara statistik.

Temuan ini menunjukkan bahwa gender tidak terbukti memengaruhi durasi doomscrolling secara nyata pada sampel penelitian ini. Seluruh tahapan uji juga telah memenuhi asumsi parametrik, yaitu data berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen, sehingga penggunaan Independent Sample T-Test dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

2. Project Uji Regresi Linear

1. Judul Penelitian

Analisis Pengaruh Durasi Menonton Video Pendek (TikTok/Reels) terhadap Frekuensi Terjadinya Fenomena Earworm (Lagu Viral yang Terngiang-ngiang) saat Mengikuti Perkuliahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah durasi menonton video pendek berpengaruh terhadap frekuensi munculnya fenomena earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu viral terus terngiang di kepala, khususnya pada saat mahasiswa mengikuti perkuliahan.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas:

- Variabel bebas (X): Durasi menonton video pendek TikTok/Reels.
- Variabel terikat (Y): Frekuensi terjadinya fenomena earworm saat perkuliahan.

2. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H0: Tidak ada pengaruh durasi menonton video pendek (X) terhadap frekuensi earworm (Y).
- H1: Ada pengaruh durasi menonton video pendek (X) terhadap frekuensi earworm (Y).

3. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui kuesioner daring yang disebarakan menggunakan Google Form kepada mahasiswa. Responden mengisi pertanyaan terkait durasi menonton video pendek serta seberapa sering mereka mengalami earworm saat perkuliahan. Jumlah responden yang terkumpul sebanyak 50 orang, telah memenuhi syarat minimal 30 responden. Seluruh data bersifat numerik dan tidak terdapat data yang hilang (missing).

Variabel Independent X: Durasi menonton video pendek TikTok/Reels.

X1. Dalam sehari, saya menghabiskan waktu yang cukup lama (lebih dari 2 jam) untuk menonton video pendek di TikTok/Reels/Shorts.

X2. Saya sering lupa waktu ketika sedang melakukan scrolling video pendek.

X3. Menonton video pendek sudah menjadi aktivitas rutin saya sebelum tidur atau di sela-sela waktu luang.

X4. Saya tetap melanjutkan scrolling video pendek meskipun tahu masih ada tugas kuliah yang belum selesai.

X5. Dalam satu sesi membuka aplikasi, saya biasanya menonton puluhan video pendek sekaligus tanpa jeda.

Variable Dependent Y: Frekuensi terjadinya fenomena earworm saat perkuliahan.

Y1. Saya sering mendapati potongan lagu atau sound viral dari video pendek terngiang-ngiang di dalam pikiran secara berulang-ulang.

Y2. Fenomena lagu atau sound yang terngiang-ngiang tersebut sering muncul tiba-tiba saat saya sedang mengikuti perkuliahan di kelas.

Y3. Saya merasa konsentrasi belajar saya terganggu akibat adanya alunan sound viral yang terus berputar di kepala saya.

Y4. Saya sering secara tidak sadar menyanyikan atau menggumamkan sound viral tersebut saat sedang fokus mengerjakan tugas kuliah.

Y5. Butuh waktu yang cukup lama bagi saya untuk menghilangkan ingatan akan sound atau lagu viral tersebut dari pikiran saya.

Data:

NO	X1	X2	X3	X4	X5	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	X_TOTAL	Y_TOTAL
1	1	2	2	3	3	2	3	4	3	5	11	17
2	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	24	23
3	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	25	23
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	20	20
5	4	5	5	1	1	5	1	1	2	1	16	10
6	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	24	21
7	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	20	17
8	4	4	4	3	3	2	2	1	3	1	18	9
9	4	4	5	3	4	5	4	2	4	2	20	17
10	4	4	4	3	3	2	2	2	2	2	18	10
11	5	5	4	3	5	5	5	4	2	3	22	19
12	3	2	4	3	4	4	4	3	2	3	16	16
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25
14	1	2	2	3	2	2	2	1	3	4	10	12
15	4	3	4	3	3	4	4	2	2	1	17	13
16	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	19	18
17	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	18	19
18	2	4	4	4	3	4	4	2	4	3	17	17
19	2	2	4	2	2	4	4	1	4	1	12	14

20	4	4	4	2	2	3	3	3	4	3	16	16
21	5	5	5	5	5	5	5	3	4	4	25	21
22	4	4	4	3	3	3	2	3	3	2	18	13
23	4	4	4	3	2	3	2	2	3	2	17	12
24	2	4	4	4	4	5	2	1	4	1	18	13
25	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	25	24
26	4	3	5	3	4	4	4	1	3	2	19	14
27	5	5	3	2	5	5	5	1	5	5	20	21
28	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	25	23
29	5	5	5	4	4	5	4	4	3	2	23	18
30	5	5	5	4	3	4	3	2	3	4	22	16
31	5	5	5	5	5	5	3	1	2	1	25	12
32	3	4	5	5	4	5	5	3	5	3	21	21
33	5	2	4	5	5	2	1	1	1	2	21	7
34	5	4	4	2	4	3	3	3	4	3	19	16
35	5	5	5	3	5	5	4	4	5	5	23	23
36	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	17	18
37	5	5	5	2	4	5	3	2	3	1	21	14
38	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	25	23
39	5	4	4	3	2	4	4	2	3	4	18	17
40	5	5	5	2	5	4	3	2	4	3	22	16
41	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	17	16
42	3	2	2	2	4	4	4	3	5	4	13	20
43	2	3	4	3	2	4	4	3	2	2	14	15
44	5	3	5	3	5	5	3	3	1	1	21	13
45	4	3	4	2	2	5	2	2	2	2	15	13
46	4	2	4	1	3	4	2	2	4	4	14	16
47	2	2	4	2	2	2	2	2	4	2	12	12
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15	15
49	5	5	5	5	5	2	2	1	1	1	25	7
50	2	2	4	3	3	4	4	3	3	2	14	16

4. Uji Regresi Linear

Analisis menggunakan regresi linear sederhana dengan metode Enter, di mana variabel X (durasi menonton video pendek) diposisikan sebagai prediktor terhadap variabel Y (frekuensi earworm). Berikut ringkasan hasil pengolahan data:

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.426 ^a	.182	.165	4.033

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	173.320	1	173.320	10.654	.002 ^b
	Residual	780.860	48	16.268		
	Total	954.180	49			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.852	2.686		2.923	.005
	xxxxxxxx	.450	.138	.426	3.264	.002

5. Penjelasan Hasil

5.1 Persamaan Regresi

Berdasarkan tabel Coefficients, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,852 + 0,450X$$

Konstanta sebesar 7,852 berarti apabila durasi menonton video pendek (X) bernilai nol, maka frekuensi earworm (Y) diperkirakan sebesar 7,852. Koefisien X sebesar 0,450 menunjukkan bahwa setiap penambahan 1 satuan durasi menonton video pendek akan meningkatkan frekuensi earworm sebesar 0,450 satuan. Nilai koefisien yang positif menandakan arah pengaruh yang searah: semakin lama durasi menonton, semakin tinggi frekuensi earworm.

5.2 Nilai R Square

Nilai R Square sebesar 0,182 menunjukkan bahwa variabel durasi menonton video pendek (X) mampu menjelaskan 18,2% variasi frekuensi earworm (Y). Sisanya, yaitu 81,8%, dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa

meskipun pengaruhnya nyata, kekuatan pengaruh X terhadap Y tergolong lemah.

5.3 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y. Variabel durasi menonton video pendek memperoleh nilai $t = 3,264$ dengan signifikansi 0,002. Karena nilai signifikansi (0,002) lebih kecil dari 0,05, maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

5.4 Uji F (Kelayakan Model)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi layak digunakan. Hasil ANOVA menunjukkan nilai $F = 10,654$ dengan signifikansi 0,002. Karena nilai signifikansi (0,002) lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan dan layak digunakan untuk memprediksi pengaruh X terhadap Y.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, dapat disimpulkan bahwa durasi menonton video pendek (TikTok/Reels) berpengaruh positif dan signifikan terhadap frekuensi terjadinya fenomena earworm saat mengikuti perkuliahan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t dan uji F yang sama-sama sebesar 0,002 ($< 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Persamaan regresi $Y = 7,852 + 0,450X$ menunjukkan bahwa semakin lama durasi menonton video pendek, semakin tinggi pula frekuensi earworm yang dialami. Namun, nilai R Square sebesar 0,182 mengindikasikan bahwa pengaruh tersebut tergolong lemah, karena durasi menonton hanya menjelaskan 18,2% variasi frekuensi earworm, sedangkan 81,8% sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti preferensi musik, tingkat konsentrasi, atau karakteristik lagu viral itu sendiri.