

L'anatomie d'un grand café arabica

Quels critères définissent objectivement un café d'exception ?



Cours : Introduction au Traitement de Données
Formation : Mathématiques Appliquées et Modélisation
Établissement : Polytech Nice Sophia
Dataset : CQI Arabica Coffee Quality Dataset (Kaggle)
Dépôt Git : [TraitementDONN-esMAM3](#)

Contents

1	Business Goal — Le café, un objet de science	2
1.1	Contexte	2
1.2	Utilité du dataset	2
2	Gestion d'équipe	2
2.1	Organisation du travail	2
2.2	Répartition des rôles	2
3	Description des données	3
3.1	Vue d'ensemble	3
3.2	Statistiques descriptives des critères sensoriels	3
3.3	Nettoyage	3
4	Visualisation des données	4
4.1	Corrélations entre les critères sensoriels	4
4.2	Profil sensoriel selon la variété	5
4.3	Scores par pays d'origine	6
4.4	Influence de l'altitude	6
5	Feature Engineering - Valoriser les signaux faibles	6
5.1	Variables directement disponibles (features brutes)	6
5.2	Transformations stratégiques (Features construites)	7
5.3	Vérification de la pertinence des features construites	7
6	Modélisation	8
6.1	Prédiction globale : l'Indice de Qualité Composite	8
6.2	Analyse ciblée : l'effet de l'altitude sur l'acidité selon la région	9
7	Conclusion	10
7.1	Enseignements de l'analyse	10
7.2	Limites et perspectives	10

1. Business Goal — Le café, un objet de science

1.1. Contexte

Le café est l'une des boissons les plus consommées au monde, avec plus de 2,5 milliards de tasses bues chaque jour. Pourtant, la frontière entre un café ordinaire et un café d'exception reste souvent floue pour le consommateur. Pour les professionnels du secteur (torréfacteurs, importateurs, baristas) cette question est au cœur de décisions économiques majeures.

Le **Coffee Quality Institute (CQI)** propose un protocole d'évaluation sensorielle rigoureux, le cupping score, qui décompose la qualité d'un café en huit critères objectifs, chacun noté de 6 à 10. Le score total (*Total Cup Points*) est la somme de ces sous-scores. Un café atteignant 80 points ou plus est qualifié de Specialty Coffee - la crème de la crème.

Quels sont les facteurs (sensoriels, géographiques, variétaux et agronomiques) qui permettent de prédire et d'expliquer la qualité d'un café arabica noté par le CQI ?

1.2. Utilité du dataset

Le dataset `df_arabica_clean.csv` (source : Kaggle, CQI) regroupe **207 échantillons** de cafés arabica certifiés, notés entre 2021 et 2023, provenant de **23 pays**. Il constitue une source idéale pour répondre à notre question car :

- Les notes sensorielles sont **standardisées** par des juges certifiés.
- Il couvre une grande diversité géographique,variétale et de méthodes de traitement.
- Il comprend à la fois des variables continues et des variables catégorielles.

2. Gestion d'équipe

2.1. Organisation du travail

Le travail a été organisé en phases successives.

Phase	Tâche principale	Date
1	Choix du dataset, formulation de la question	01/06
2	Nettoyage et exploration	01/06
3	Visualisation et storytelling	02/06
4	Feature engineering, régression	02-03/06
5	Rédaction du rapport, préparation des slides	04/06
6	Soutenance orale	05/06

2.2. Répartition des rôles

Chaque membre a contribué à l'ensemble des phases du projet, avec des responsabilités principales différenciées pour assurer une progression parallèle efficace.

Tâche	Clément	Evrard	James
Choix du dataset et formulation de la question	Contributeur	Principal	Contributeur
Nettoyage des données	Contributeur	Contributeur	Principal
Exploration statistique	Contributeur	–	Principal
Visualisation (figures 1-4)	Principal	Contributeur	Contributeur
Visualisation (figures 5-8)	Contributeur	–	Principal
Feature engineering	Principal	Contributeur	Contributeur
Régression linéaire	Contributeur	–	Principal
Rédaction du rapport	Principal	Contributeur	–
Préparation des slides	–	Contributeur	Principal

3. Description des données

3.1. Vue d'ensemble

Le dataset contient 207 lignes et 41 colonnes, couvrant trois familles de variables :

Famille	Variables clés	Type
Identité	Pays, Région, Ferme, Variété, Propriétaire	Catégorielle / texte
Agronomique	Altitude, Méthode de traitement, Couleur, Humidité	Numérique / catég.
Sensorielle	Aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity, Body, Balance, Uniformity, Clean Cup, Sweetness, Overall, Total Cup	Numérique [6–10]
Défauts	Category One Defects, Category Two Defects, Quakers	Entier

3.2. Statistiques descriptives des critères sensoriels

Critère	Min	Médiane	Moyenne	Max
Aroma	6.50	7.67	7.72	8.58
Flavor	6.75	7.75	7.74	8.50
Aftertaste	6.67	7.58	7.60	8.42
Acidity	6.83	7.67	7.69	8.58
Body	6.83	7.67	7.64	8.25
Balance	6.67	7.67	7.64	8.42
Total Cup Points	78.00	83.75	83.71	89.33

Note : Les critères *Uniformity*, *Clean Cup* et *Sweetness* présentent des variances quasi nulles (presque tous égaux à 10 dans ce dataset), ce qui explique leur faible pouvoir prédictif.

3.3. Nettoyage

- L'altitude est fournie comme texte libre ; elle a été convertie en numérique (`pd.to_numeric( , errors='coerce')`), aboutissant à 153 valeurs valides sur

207.

- Les méthodes de traitement rares ont été regroupées en une catégorie « Autres » pour les analyses comparatives.
- La couleur des grains présente des incohérences typographiques (*yellow green* vs *yellow-green*), un nettoyage a été appliqué.
- Aucune ligne n'a été supprimée pour les analyses sensorielles (207 valeurs complètes).

4. Visualisation des données

4.1. Corrélations entre les critères sensoriels




Figure 1: Corrélogramme triangulaire inférieur des huit critères sensoriels (n = 207). Les couleurs chaudes indiquent une forte corrélation positive.

La figure 1 révèle que tous les critères sensoriels sont **fortement corrélés entre eux** ($r > 0.70$ pour la plupart). Les corrélations les plus élevées avec le *Total Cup Points* sont : *Flavor* ($r = 0.94$), *Aftertaste* ($r = 0.93$) et *Balance* ($r = 0.93$).

Un café arabica de qualité est un équilibre : aucun critère isolé ne suffit. La force du Flavor et de l'Aftertaste sont cependant les signaux les plus discriminants.

4.2. Profil sensoriel selon la variété




Figure 2: Diagramme radar des profils sensoriels moyens selon la variété. Les cafés « Gesha » se distinguent par un profil gustatif plus prononcé.

La figure 2 compare trois variétés : Gesha, Caturra et Typica. On observe que les cafés Caturra tendent à présenter un arrière-goût plus faible, tandis que les autres cafés sont plus équilibrés sur l'ensemble des critères.

4.3. Scores par pays d'origine




Figure 3: Distribution du *Total Cup Points* pour les 12 pays les plus représentés. Les boîtes à moustaches sont ordonnées par médiane croissante. La ligne pointillée indique la moyenne globale (83,7 pts).

L'Éthiopie et la Tanzanie dominent le classement en termes de score médian (respectivement 85,0 et 84,7 pts), loin devant le Brésil et El Salvador qui peinent à dépasser 82 pts en médiane. Taiwan, très représenté ($n = 61$), affiche une médiane élevée (84,4 pts) avec une grande dispersion, témoignant d'une filière dynamique mais hétérogène.

4.4. Influence de l'altitude

La corrélation brute altitude-score est modeste. Cependant, comme nous le verrons lors du Feature Engineering (Section 5), l'analyse par tranches d'altitude révèle un véritable effet de seuil : les cafés cultivés au-delà de 1800 m obtiennent en moyenne 84,8 pts (moyenne des traitements), soit + 1,3 pt par rapport aux cafés cultivés sous 1000 m (83,5 pts).

5. Feature Engineering - Valoriser les signaux faibles

5.1. Variables directement disponibles (features brutes)

Les six critères sensoriels (Aroma, Flavor, Aftertaste, Acidity, Body, Balance) constituent des descripteurs de tasse essentiels. Cependant, comme mis en évidence lors de la phase de visualisation, ces notes souffrent d'une forte multicollinéarité ($r > 0.70$). Pour construire un modèle prédictif robuste et stable, utile aux acteurs de la filière (producteurs et négociants), il est nécessaire de déplacer le focus vers les variables physiques, environnementales et temporelles stables.

5.2. Transformations stratégiques (Features construites)

Afin d'enrichir nos modèles et de capturer des relations non-linéaires, quatre transformations majeures ont été conçues :

- **Paliers d'Altitude** : Afin de modéliser une segmentation climatique potentiellement non-linéaire, l'altitude brute a été discrétisée en 4 classes géographiques et thermiques majeures :
 - Basses altitudes : < 1200 m
 - Altitudes intermédiaires : 1200 m – 1500 m
 - Hautes altitudes : 1500 m – 1800 m
 - Très hautes altitudes : > 1800 m
- **Procédés Harmonisés** : Les modes de préparation initiaux, trop fragmentés dans le jeu de données d'origine, ont été regroupés et harmonisés en 3 grandes familles technologiques homogènes : Washed/Wet, Natural/Dry et Pulped natural/honey.
- **Macro-Régions** : Pour stabiliser les prédictions face à la forte cardinalité des pays d'origine (23 pays), une variable de regroupement géographique a été créée autour de trois grands terroirs climatiques homogènes : Afrique, Amériques et Asie-Pacifique. Ce découpage capture les spécificités bioclimatiques de chaque continent sans diluer l'information dans une multitude de classes rares.
- **Âge du Café (Facteur temporel)** : Création d'une variable temporelle continue calculant le temps précis écoulé entre la date de récolte du lot de café et sa date d'expiration certifiée.

5.3. Vérification de la pertinence des features construites



Figure 4: Distribution réelle des scores finaux selon les tranches d'altitude construites et les méthodes de traitement associées.

L'analyse croisée de ces nouvelles variables (Figure 4) valide notre intuition statistique. On observe un net effet de seuil lié à l'altitude : au-delà de 1800 m, la moyenne des scores se stabilise à un niveau élevé (84,8 pts). De plus, à très haute altitude, les procédés

Washed/Wet et Natural/Dry affichent des comportements plus réguliers, limitant la dispersion des notes vers le bas.

6. Modélisation

6.1. Prédiction globale : l'Indice de Qualité Composite

Afin d'anticiper la note *Total Cup Points* (Y) avant les phases subjectives de dégustation, un modèle de régression linéaire multiple (Moindres Carrés Ordinaires) a été entraîné sur 10 variables exclusivement physiques, géographiques et temporelles : altitude, âge du lot, taux d'humidité, défauts de catégorie 1 et 2, grains Quakers, méthode de traitement, couleur du grain, pays de production et variété botanique (ces quatre dernières encodées en One-Hot).




Figure 5: Confrontation entre le score composite prédit ($\hat{Y}$) et la qualité réelle observée (*Total Cup Points*).

L'analyse des coefficients révèle que les défauts de catégorie 2 et les Quakers sont les principaux vecteurs de dépréciation du score, tandis que l'altitude agit positivement, en cohérence avec la littérature agronomique. L'âge du lot et l'humidité, bien que secondaires, décrivent l'état de conservation du café.

Comme l'illustre la Figure 5, ce modèle atteint un coefficient de détermination $R^2 = 0.526$. Expliquer plus de la moitié de la variance d'une évaluation sensorielle humaine uniquement à partir de caractéristiques techniques mesurables constitue une performance solide pour un outil d'aide à la décision précoce.

L'évaluation du potentiel d'un café de spécialité peut s'affranchir des phases de dégustation initiales : l'intégrité physique du lot et son contexte de culture fournissent une estimation fiable avant l'importation.

6.2. Analyse ciblée : l'effet de l'altitude sur l'acidité selon la région

Au-delà de la prédiction globale, une seconde modélisation affine la compréhension du lien entre terroir et profil aromatique. Un modèle d'interaction linéaire a été ajusté pour prédire le sous-score *Acidity* en fonction de l'altitude, de la macro-région, et de leur produit croisé :

$$\text{Acidity} \sim \text{Altitude} + \text{Macro-Région} + \text{Altitude} \times \text{Macro-Région} \quad (1)$$




Figure 6: Effet de l'altitude sur l'acidité selon la macro-région de production. Les pentes hétérogènes montrent que l'altitude n'a pas le même impact selon le continent.

La Figure 6 met en évidence une dissociation nette entre les trois macro-régions. En Afrique, l'acidité augmente sensiblement avec l'altitude, ce qui correspond aux conditions bioclimatiques des hauts plateaux est-africains. En Asie-Pacifique, la pente est quasi nulle : l'acidité reste stable quelle que soit l'altitude. Dans les Amériques, la tendance est intermédiaire. Ce résultat montre que la relation altitude–qualité, souvent présentée comme universelle, est en réalité conditionnée par le contexte climatique régional.

Le modèle atteint un $R^2 = 0.219$. Bien que modeste, cette valeur est cohérente avec la nature très locale et multifactorielle de l'acidité. L'apport clé de cette analyse est moins prédictif qu'**explicatif** : elle démontre que l'interaction géographie $\times$ altitude capte une information que ni l'altitude seule ni la région seule ne peuvent exprimer.

7. Conclusion

7.1. Enseignements de l'analyse

Notre analyse du dataset CQI Arabica apporte des réponses concrètes à la question « *Quels critères définissent objectivement un café d'exception ?* », tout en s'affranchissant de la subjectivité de la dégustation :

1. **La prédictibilité par l'agronomie et la physique** : Il est possible d'expliquer une grande partie de la variance de la note finale (jusqu'à $R^2 \approx 0.53$) en se basant strictement sur des critères vérifiables avant la torréfaction.
2. **L'importance vitale de l'intégrité physique** : Les défauts (notamment les Quakers et ceux de catégorie 2) appliquent une pénalité sévère et quasi-immédiate sur la note finale. Le tri visuel et physique reste la première barrière d'entrée vers la spécialité.
3. **La prime au Terroir et à la Botanique** : L'origine géographique et la génétique (les variétés comme le *Gesha* ou le *Typica*) agissent comme d'importants "boosters" de score, offrant une prime naturelle à certains lots.
4. **L'effet de l'altitude** : Une altitude élevée (notamment l'effet de seuil au-delà de 1800 m) est statistiquement associée à des scores supérieurs, ce qui corrobore le principe agronomique d'une maturation ralentie des cerises.
5. **L'interaction altitude-géographie** : L'analyse par macro-régions révèle que l'effet de l'altitude sur l'acidité n'est pas universel : il est fort en Afrique, quasi inexistant en Asie-Pacifique et intermédiaire dans les Amériques. Cette dissociation remet en question la vision d'un lien altitude-qualité uniforme et souligne l'importance des conditions bioclimatiques locales.

7.2. Limites et perspectives

- **Taille de l'échantillon** : Le dataset ne compte que 207 observations, ce qui limite la robustesse statistique, notamment pour l'analyse des origines rares à de très hautes altitudes.
- **Données climatiques manquantes** : Pour aller plus loin dans l'analyse du terroir, il serait pertinent d'intégrer des données macro-économiques et météorologiques exogènes telles que la pluviométrie et les températures régionales annuelles.
- **Impact économique** : Une extension naturelle consisterait à croiser ces scores avec les données de prix du marché pour chiffrer directement la perte ou le gain de valeur commerciale lié aux défauts physiques.
- **Modélisation avancée** : Le passage à des modèles non-linéaires (Random Forest, XGBoost) ou intégrant une régularisation (Ridge/Lasso) permettrait d'améliorer la prédiction tout en gérant mieux les variables colinéaires.