

הנחיות למתן Iloprost (Ilomedin®) לטיפול בגפה איסכמית בפגיה

עמוד 1 מתוך 1

תאריך אפקטיבי: 21.05.2026

מבוא:

- השימוש בכפוף לטופס 29 ג' מוסדי (הרחבת התוויות). אין צורך למלא טופס 29 ג' פרטני.
- ההנחיות הדילול אינן תקפות למחלקות טיפול נמרץ ילדים/לב ילדים, בהן יש פרוטוקול מובנה בריכוז קבוע למתן במשאבת מזרק.
- פרוטוקול מומלץ:**
 - יש להתחיל בעירוי בקצב 0.5 ng/kg/min למשך 30 דקות
 - בתלות בתגובת התינוק, יש להעלות לקצב של 1 ng/kg/min למשך 30 דקות
 - בתלות בתגובת התינוק, יש להעלות לקצב של 1.5 ng/kg/min למשך 30 דקות
 - בתלות בתגובת התינוק, יש להעלות לקצב של 2 ng/kg/min למשך 4.5 שעות.
- על פי פרוטוקול המתן המקובל בטיפול בגפה איסכמית יש לתת עירוי של Iloprost למשך 6 שעות כל 24 שעות.
- במקרים חריגים ניתן לשקול עירוי מתמשך (מעבר ל-6 שעות) בתינוקות אשר מצבם ההמודינאמי מאפשר זאת (בהתאם לפרוטוקולים לטיפול בתרופה ביל"ד ריאתי).
- משך הטיפול המקובל נע בין מספר ימים למספר שבועות.

אופן הכנה:

מומלץ להכין את התמיסה בריכוז סופי של 60 ng/kg/mL

כך שהפג יקבל בהתחלה 0.5 mL/h (0.5 ng/kg/min)
והקצב יועלה בהדרגה עד 2 mL/h (2 ng/kg/min).

תמיסות הדילול: Normal Saline 0.9% או Dextrose 5% in Water.

דילול ראשוני:

- יש לשאוב את 0.5 mL מתכולת האמפולה ($50 \text{ mcg}/0.5 \text{ mL}$)
- להעביר למזרק של 50 mL
- להשלים במזרק עד 50 mL עם Normal Saline 0.9% או Dextrose 5% in Water
- לטלטל את המזרק היטב לקבלת תמיסת אם בריכוז 1000 ng/mL

דילול סופי:

- למזרק של 20 mL יש לשאוב מתוך תמיסת האם (שריכוזה 1000 ng/mL) נפח לפי הנוסחה:
 $[0.06 \times \text{Weight}_{\text{kg}} \times 20] = \text{נפח מתמיסת האם (מל')}$
- להשלים במזרק עד 20 mL עם Normal Saline 0.9% או Dextrose 5% in Water
- לטלטל את המזרק לקבלת תמיסה בריכוז 60 ng/kg/mL

יציבות:

התמיסה בריכוזה הסופי יציבה ל-24 שעות בטמפ' החדר או במקרר.

סימוכין:

- Silverberg D et al. Acute Limb Ischemia in Pediatric Intensive care Units. Ann Vasc Surg 2023; 92: 65–70
- Meini S et al. Prostanoids for Critical Limb Ischemia. Angiology 2020, Vol. 71(3) 226-234
- Björck M et al. European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2020 Clinical Practice Guidelines on the Management of Acute Limb Ischaemia. Eur J Vasc Endovasc Surg (2020) 59, 173e218
- <https://www.kemh.health.wa.gov.au/~media/HSPs/NMHS/Hospitals/WNHS/Documents/Clinical-guidelines/Neonatal-MPs/Iloprost.pdf?thn=0>
- Shaniv D et al. Management of iatrogenic acute limb ischaemia in the neonate. BMJ Case Rep. 2024 Sep 3;17(9)

שם	תפקיד	תאריך	נכתב ע"י
ד"ר מאיה לוצקי	רוקחת קלינית	ספטמבר 2019	נכתב ע"י
ד"ר מרואן חנא	רוקח קליני	מאי 2026	נבדק ע"י