

Выборный Евгений Викторович
email: evybornyi@hse.ru

Математический анализ

Тема 5: Ряды

Москва 2016

Числовые ряды. Определение

В математике и различных приложениях крайне часто возникает необходимость рассматривать суммы с бесконечным числом слагаемых. Приведем два примера.

Представление числа в десятичной системе счисления

В десятичной системе счисления любое действительное число представляется в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, d_1 d_2 d_3 \dots,$$


где d_k — цифра от 0 до 9. Эта запись означает, что

$$a = a_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots$$

Бесконечная геометрическая прогрессия

Очевидно, что

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$



Числовые ряды. Определение

В математике и различных приложениях крайне часто возникает необходимость рассматривать суммы с бесконечным числом слагаемых. Приведем два примера.

Представление числа в десятичной системе счисления

В десятичной системе счисления любое действительное число представляется в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, d_1 d_2 d_3 \dots,$$


где d_k — цифра от 0 до 9. Эта запись означает, что

$$a = a_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots$$

Бесконечная геометрическая прогрессия

Очевидно, что

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$



Числовые ряды. Определение

В математике и различных приложениях крайне часто возникает необходимость рассматривать суммы с бесконечным числом слагаемых. Приведем два примера.

Представление числа в десятичной системе счисления

В десятичной системе счисления любое действительное число представляется в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, d_1 d_2 d_3 \dots,$$


где d_k — цифра от 0 до 9. Эта запись означает, что

$$a = a_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots$$

Бесконечная геометрическая прогрессия

Очевидно, что

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$



Числовые ряды. Определение

В математике и различных приложениях крайне часто возникает необходимость рассматривать суммы с бесконечным числом слагаемых. Приведем два примера.

Представление числа в десятичной системе счисления

В десятичной системе счисления любое действительное число представляется в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, d_1 d_2 d_3 \dots,$$


где d_k — цифра от 0 до 9. Эта запись означает, что

$$a = a_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots$$

Бесконечная геометрическая прогрессия

Очевидно, что

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$



Числовые ряды. Определение

В математике и различных приложениях крайне часто возникает необходимость рассматривать суммы с бесконечным числом слагаемых. Приведем два примера.

Представление числа в десятичной системе счисления

В десятичной системе счисления любое действительное число представляется в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, d_1 d_2 d_3 \dots,$$


где d_k — цифра от 0 до 9. Эта запись означает, что

$$a = a_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots$$

Бесконечная геометрическая прогрессия

Очевидно, что

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$



Числовые ряды. Определение

Определение

Пусть задана последовательность a_n . Тогда символ

$$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots ,$$

представляющий упорядоченную сумму бесконечного числа слагаемых, называют **числовым рядом**. Величины S_n :

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + \cdots + a_n,$$

называют **частичными суммами** числового ряда. Если последовательность чисел S_n имеет предел при $n \rightarrow +\infty$, то говорят, что соответствующий числовой ряд **сходится**, а число

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k$$

называют **суммой числового ряда**. В этом случае пишут:

$$S = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k.$$

Числовые ряды. Определение

В действительности, числовые ряды — это другой способ говорить о числовых последовательностях.

Каждому числовому ряду соответствует последовательность частичных сумм:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} h_k \rightarrow S_n = \sum_{k=1}^n h_k.$$

Обратно, для произвольной последовательности a_n можно рассмотреть числовой ряд:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} d_k = a_1 + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots,$$

где

$$d_n = a_n - a_{n-1}, \quad n \geq 2, \quad d_1 = a_1.$$

Частичные суммы этого ряда в точности совпадают с членами последовательности a_n :

$$a_n = \sum_{k=1}^n d_k.$$

Следовательно, если последовательность a_n сходится, то и ряд с членами d_k сходится, и соответствующие пределы совпадают.

Числовые ряды. Примеры

❶ Числовой ряд

$$\sum_{k=1}^{+\infty} 1 = 1 + 1 + 1 + \dots$$

расходится к $+\infty$, поскольку частичные суммы $S_n = n \rightarrow +\infty$ при $n \rightarrow +\infty$.

❷ Числовой ряд

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

расходится, поскольку частичные суммы S_n не имеют предела.

❸ Числовой ряд

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(1+k)k} = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1$$

сходится, поскольку частичные суммы имеют вид:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left(1 - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

❹ Расходится числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} (\ln(n+1) - \ln(n)) = +\infty.$$

Остаток ряда

Числовой ряд

$$R_k = \sum_{n=k+1}^{+\infty} a_n$$

называют k -ым **остатком ряда** $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$. Исходный ряд и его остаток сходятся или расходятся одновременно.

Линейность

Если ряды $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ сходятся, то сходится и ряд с общим членом $A a_n + B b_n$.

Справедливо равенство:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} (A a_n + B b_n) = A \sum_{n=1}^{+\infty} a_n + B \sum_{n=1}^{+\infty} b_n.$$

Теорема. Необходимое условие сходимости ряда

Если числовой ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится, то $a_n \rightarrow 0$ при $n \rightarrow +\infty$.

Доказательство

Сходимость ряда означает, что

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k = S.$$

Тогда

$$a_n = S_n - S_{n-1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

Обратное утверждение не верно. Например, ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ расходится, поскольку

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq n \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \Rightarrow S_n \rightarrow +\infty.$$

Числовые ряды. Знакопостоянные ряды

Ряд называют знакопостоянным, если все $a_n \geq 0$ или $a_n \leq 0$.

Предложение

Положительный числовой ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, где $a_n \geq 0$, всегда имеет сумму. Сумма ряда будет конечной, если последовательность частичных сумм ряда ограничена, иначе сумма ряда будет равна $+\infty$.

Доказательство

Последовательность частичных сумм является монотонной:

$$A_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k = A_n + a_{n+1} \geq A_n, \quad \forall n.$$

Следовательно, по теореме Вейерштрасса существует предел последовательности A_n , представляющий сумму ряда.

Числовые ряды. Теорема сравнения

Теорема. Сравнение

Рассмотрим два положительных ряда $A = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ и $B = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$. Пусть справедливо неравенство

$$a_n \leq b_n, \quad \forall n \geq 1.$$

Тогда из сходимости ряда B следует сходимость ряда A , а из расходимости ряда A следует расходимость ряда B .

Аналогичное утверждение справедливо при выполнении условия $a_n = O(b_n)$.

Теорема. Асимптотическое сравнение

Пусть $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$ и $a_n \sim b_n$, при $n \rightarrow +\infty$. Тогда ряды $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ сходятся или расходятся одновременно.

Упражнение

Выпишите полное доказательство этих теорем.

Числовые ряды. Признак Коши

В качестве эталона для сравнения рядов выберем геометрическую прогрессию:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad 0 \leq q < 1.$$

Теорема. Признак Коши

Пусть $a_n \geq 0$ и для достаточно больших n справедливо неравенство:

$$C_n = \sqrt[n]{a_n} \leq q < 1.$$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится, а если $C_n \geq 1$, то ряд расходится.

Доказательство

Из предположения теоремы следует, что $a_n < q^n$ для достаточно больших n . Из теоремы о сравнении рядов и сходимости геометрической прогрессии с знаменателем $q < 1$ следует сходимость ряда с членами a_n .

Если $C_n \geq 1$, то и $a_n \geq 1$. Следовательно, $a_n \not\rightarrow 0$ при $n \rightarrow +\infty$, то есть не выполнено необходимое условие сходимости ряда.

Числовые ряды. Признак Коши

Поскольку нас интересует выполнение неравенства

$$\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$$

только для достаточно больших n можно сформулировать предельный признак сравнения.

Теорема. Предельный признак Коши

Пусть существует предел

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q.$$

Тогда при $q < 1$ ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится, а при $q > 1$ расходится. Если $q = 1$, то вопрос остается открытым.

Доказательство

Рассмотрим случай $q < 1$. Дано:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : |\sqrt[n]{a_n} - q| \leq \varepsilon \quad \forall n \geq N.$$

Выбирая положительное $\varepsilon = \varepsilon_0 < 1 - q$, получаем, что

$$\sqrt[n]{a_n} \leq q + \varepsilon_0 < 1 \quad \forall n \geq N.$$

Остается применить признак сходимости Коши.

Пример

Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{2n}}{e^{n^2}}.$$

Применим предельный признак Коши:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{e^n} = 0 < 1.$$

Следовательно, ряд сходится.

Упражнение

Аналогично рассмотрите ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} 3^n \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n^2}$.

Числовые ряды. Признак Даламбера

Сложность применения признака Коши связана с необходимостью вычисления корня n -ой степени. Существует более простой признак сходимости Даламбера.

Теорема. Признак Даламбера

Пусть $a_n > 0$. Если для достаточно больших n справедливо неравенство

$$\mathcal{D}_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1,$$

то ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится, а если $\mathcal{D}_n \geq 1$, то ряд расходится.

Если существует предел $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda$, то ряд сходится при $\lambda < 1$ и расходится при $\lambda > 1$.

Доказательство

Рассмотрим случай $q < 1$:

$$\mathcal{D}_n \leq q < 1 \quad \Rightarrow \quad a_{n+1} \leq q a_n \leq q^2 a_{n-1} \leq \dots \leq q^n a_1.$$

Следовательно, $a_n = O(q^n)$, и ряд с членами a_n сходится по теореме сравнения, где сравнение происходит с геометрической прогрессией.

Числовые ряды. Признак Даламбера

Признак Даламбера особенно удобно применять, если в формуле для общего члена присутствуют факториалы.

Пример

Рассмотрим ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$.

По признаку Даламбера

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{1+n} \leq \frac{1}{2} < 1 \quad (n \geq 1).$$

Следовательно, ряд сходится.

Нам известно, что

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e.$$

Упражнение

Аналогично рассмотрите ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

Числовые ряды. Интегральный признак

Рассмотрим положительный числовой ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

Теорема. Интегральный признак сходимости ряда

Пусть

$$a_n = f(n),$$

где $f \in C[1, +\infty)$ положительна и монотонно убывает.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ и интеграл $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство

Из положительности f следует, что сходимость интеграла эквивалентна ограниченности $F(x) = \int_1^x f(t)dt$, а сходимость ряда эквивалентна ограниченности последовательности частичных сумм $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$.


По теореме сравнения для интеграла:

$$a_{k+1} \leq \int_k^{k+1} f(x)dx \leq a_k \quad \Rightarrow \quad S_{n+1} - a_1 \leq F(n+1) \leq S_n$$

Из последнего неравенства следует эквивалентность ограниченности $F(x)$ и S_n .

Числовые ряды. Интегральный признак

Теорема об интегральном признаке сходимости имеет простую геометрическую интерпретацию.



Если интеграл $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ сходится, то он представляет площадь под графиком $f(x)$ при $x \geq 1$. Сумма ряда $\sum_{k=2}^{+\infty} a_k$ можно интерпретировать, как площадь прямоугольников, полностью лежащих под графиком f .

Следовательно, из ограниченности площади под графиком f следует и ограниченность суммарной площади прямоугольников.

Ряд Дирихле

Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.

Доказательство

При $\alpha \leq 0$ ряд, очевидно, расходится. Пусть $\alpha > 0$. Поскольку $f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ положительна, непрерывна и монотонно убывает, то применим интегральный признак сходимости. Таким образом, интеграл и ряд:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}, \quad \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$$

сходятся или расходятся одновременно. Мы знаем, что этот интеграл сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $0 < \alpha \leq 1$.

Замечание

Величину суммы ряда $\zeta(\alpha) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ называют функцией Римана. Она имеет ключевое значение в теории чисел.

Пример

Рассмотри ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln(n)}{\sqrt{n^3+5}}$. Заметим, что

$$\frac{\ln(n)}{\sqrt{n^3+5}} \sim \frac{\ln(n)}{n^{3/2}} = \frac{O(n^{1/4})}{n^{3/2}} = O\left(\frac{1}{n^{5/4}}\right).$$

Поскольку ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{5/4}}$ сходится (ряд Дирихле), то сходится и исходный ряд (теорема об асимптотическом сравнении рядов).

Упражнения

Исследуйте сходимость рядов

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n)}, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n \ln^2(n)}.$$

Попробуйте применить к ним признаки Даламбера, Коши и интегральный признак сходимости.

Числовые ряды. Знакопеременные ряды

Определение

Числовой ряд называют **знакопеременным**, если среди членов ряда имеется бесконечно много как положительных так и отрицательных членов.

Действительно, иначе отбросив фиксированное число членов ряда мы бы получили знакостоянный ряд.

Определение

Если сходится ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$, то говорят, что ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ **абсолютно сходится**. Если ряд сходится, но не является абсолютно сходящимся, то говорят, что ряд **сходится условно**.

Теорема

Из абсолютной сходимости ряда следует сходимость ряда:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n| < +\infty \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ — сходится.}$$

Определение

Числовой ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$, где $a_n \geq 0$, называют **рядом Лейбница**.

Теорема. Признак Лейбница

Пусть $a_n \geq 0$ монотонно стремятся к нулю:

$$a_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty), \quad a_{n+1} \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Тогда ряд Лейбница $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n a_n$ сходится.

Если ряд Лейбница сходится, то остаток ряда не превосходит первого отброшенного слагаемого:

$$\left| \sum_{n=N}^{+\infty} (-1)^n a_n \right| \leq a_N \quad \forall N \in \mathbb{N}.$$

Числовые ряды. Знакопеременные ряды

Доказательство признака Лейбница

Рассмотрим последовательность частичных сумм с нечетным числом слагаемых:

$$S_{2n+1} = -a_1 + a_2 - a_3 + \cdots + a_{2n} - a_{2n+1} = S_{2n-1} + a_{2n} - a_{2n+1} \geq S_{2n-1}.$$

Таким образом, последовательность S_{2n+1} монотонно возрастает, но

$$S_{2n+1} = -(a_1 - a_2) - \cdots - (a_{2n-1} - a_{2n}) - a_{2n+1} \leq 0.$$

По теореме Вейерштрасса о монотонной ограниченной последовательности получаем, что

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2n+1} = S.$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (S_{2n-1} + a_{2n}) = S + 0 = S \Rightarrow S_n \rightarrow S.$$

Мы доказали сходимость ряда. Докажем оценку для остаточного члена.

Последовательность S_{2n} является монотонно убывающей. Следовательно,

$$S_{2n+1} \leq S \leq S_{2n+2} \leq S_{2n} \Rightarrow \left| \sum_{n=N}^{+\infty} (-1)^n a_n \right| = |S - S_{N-1}| \leq |S_N - S_{N-1}| = a_N.$$

Пример

Рассмотрим знакочередующийся ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$. Этот ряд не является абсолютно сходящимся, так как расходится ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$.

Исследуем ряд на условную сходимость. Последовательность $1/n$, очевидно, монотонно стремится к нулю. Применяя признак Лейбница, получаем, что ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ сходится условно.

Числовые ряды. Перестановка членов ряда

Определение

Будем говорить, что ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ получен из ряда $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, перестановкой слагаемых, если $b_n = a_{s(n)}$, где $s(n)$ — биекция из \mathbb{N} в \mathbb{N} .

Теоремы о перестановке слагаемых

Если ряд сходится абсолютно, то к той же сумме абсолютно сходится и ряд с переставленными слагаемыми.

Если ряд является лишь условно сходящимся, то для любого числа S существует такая перестановка слагаемых, что ряд с переставленными слагаемыми будет сходиться к сумме S .

Для заданного знакопеременного ряда рассмотрим суммы его положительных и отрицательных слагаемых:

$$A_+ = \sum_{n: a_n > 0} a_n, \quad A_- = \sum_{n: a_n < 0} |a_n|.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится абсолютно тогда и только тогда, когда сходятся положительные ряды A_+ и A_- . В этом случае справедливо равенство для сумм: $A = A_+ - A_-$.

Числовые ряды. Перестановка членов ряда

Определение

Будем говорить, что ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ получен из ряда $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, перестановкой слагаемых, если $b_n = a_{s(n)}$, где $s(n)$ — биекция из \mathbb{N} в \mathbb{N} .

Теоремы о перестановке слагаемых

Если ряд сходится абсолютно, то к той же сумме абсолютно сходится и ряд с переставленными слагаемыми.

Если ряд является лишь условно сходящимся, то для любого числа S существует такая перестановка слагаемых, что ряд с переставленными слагаемыми будет сходиться к сумме S .

Для заданного знакопеременного ряда рассмотрим суммы его положительных и отрицательных слагаемых:

$$A_+ = \sum_{n: a_n > 0} a_n, \quad A_- = \sum_{n: a_n < 0} |a_n|.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится абсолютно тогда и только тогда, когда сходятся положительные ряды A_+ и A_- . В этом случае справедливо равенство для сумм: $A = A_+ - A_-$.

Числовые ряды. Перестановка членов ряда

Определение

Будем говорить, что ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ получен из ряда $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$, перестановкой слагаемых, если $b_n = a_{s(n)}$, где $s(n)$ — биекция из \mathbb{N} в \mathbb{N} .

Теоремы о перестановке слагаемых

Если ряд сходится абсолютно, то к той же сумме абсолютно сходится и ряд с переставленными слагаемыми.

Если ряд является лишь условно сходящимся, то для любого числа S существует такая перестановка слагаемых, что ряд с переставленными слагаемыми будет сходиться к сумме S .

Для заданного знакопеременного ряда рассмотрим суммы его положительных и отрицательных слагаемых:

$$A_+ = \sum_{n: a_n > 0} a_n, \quad A_- = \sum_{n: a_n < 0} |a_n|.$$

Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится абсолютно тогда и только тогда, когда сходятся положительные ряды A_+ и A_- . В этом случае справедливо равенство для сумм: $A = A_+ - A_-$.

Функциональные последовательности. Определение

Определения

Последовательность функций

$$f_1(x), f_2(x), \dots,$$

где все функции $f_n(x)$ определены на общем множестве $x \in X \subset \mathbb{R}$, называют **функциональной последовательностью**.

Можно считать, что $\{f_n(x)\}$ — это семейство числовых последовательностей, зависящее от $x \in X$ как от параметра.

Говорят, что функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ **сходится** для фиксированного $x = x_0$, если сходится соответствующая числовая последовательность $\{f_n(x_0)\}$.

Пусть последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится для всех $x \in Y \subset X$. Тогда, очевидно, предел функциональной последовательности

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)$$

зависит от x . В этом случае говорят, что последовательность функций $\{f_n\}$ **поточечно сходится** к функции f , функцию f называют **предельной функцией**, а множество Y — **множеством сходимости**.

Пример

Рассмотрим последовательность функций $\{x^n\}$. Тогда

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x^n = \begin{cases} 0, & \text{при } -1 < x < 1; \\ 1, & \text{при } x = 1; \\ \nexists & \text{при } x \notin (-1, 1]. \end{cases}$$

Следовательно, функциональная последовательность сходится на множестве $(-1, 1]$.

Замечание

Из рассмотренного примера видно, что функциональная последовательность непрерывных функций не обязательно сходится к непрерывной функции.

Так последовательность непрерывных функций x^n сходятся на множестве $x \in (-1, 1]$. Но предельная функция не является непрерывной в точке $x = 1$.

Упражнение

Для последовательности $(1 - x^2)^n$ определите множество сходимости и предельную функцию.

Равномерная сходимость

Определение. Равномерная сходимость

Говорят, что функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ **сходится равномерно** к функции $f(x)$ при $x \in X$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : \quad \forall n \geq N, \forall x \in X \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

Если записать определение поточечной сходимости на X , то получим

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon, x) : \quad \forall n \geq N \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

Таким образом, равномерная сходимость является более сильным условием, так как требуется не только существование номера N , но и его независимость от x .

Утверждение

Последовательность $f_n(x)$ равномерно сходится к $f(x)$ при $x \in X$ тогда и только тогда, когда

$$\sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Доказательство

$$\sup_{x \in X} |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon \quad \Longleftrightarrow \quad \forall x \in X \quad |f(x) - f_n(x)| \leq \varepsilon.$$

Равномерная сходимость

Утверждение

Из равномерной сходимости следует поточечная сходимость. Обратное, вообще говоря, не верно.

Доказательство

То, что из равномерной сходимости следует поточечная сходимость — очевидно. Покажем на примере, что обратное не верно.

Пример

Рассмотрим функциональную последовательность x^n при $x \in (0, 1)$, которая сходится поточечно к нулю. Пусть $x_n = 1 - 1/n$. Тогда $x_n \in (0, 1)$ и $f_n(x_n) \rightarrow 1/e$ при $n \rightarrow +\infty$, следовательно, равномерной сходимости нет.

Действительно, из равномерной сходимости следует, что $f_n(x)$ должна стремиться к нулю при $n \rightarrow +\infty$ вне зависимости от выбора x , но $f_n(x_n) \rightarrow 1/e \neq 0$.

Равномерная сходимость

Утверждение

Из равномерной сходимости следует поточечная сходимость. Обратное, вообще говоря, не верно.

Доказательство

То, что из равномерной сходимости следует поточечная сходимость — очевидно. Покажем на примере, что обратное не верно.

Пример

Рассмотрим функциональную последовательность x^n при $x \in (0, 1)$, которая сходится поточечно к нулю. Пусть $x_n = 1 - 1/n$. Тогда $x_n \in (0, 1)$ и $f_n(x_n) \rightarrow 1/e$ при $n \rightarrow +\infty$, следовательно, равномерной сходимости нет.

Действительно, из равномерной сходимости следует, что $f_n(x)$ должна стремиться к нулю при $n \rightarrow +\infty$ вне зависимости от выбора x , но $f_n(x_n) \rightarrow 1/e \neq 0$.

Функциональные ряды

Аналогично с функциональными последовательностями рассматривают и функциональные ряды.

Определение. Сходимость функционального ряда

Пусть задана функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$. Тогда символ $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$

называют **функциональным рядом**. Если для любого $x \in X$ сходится последовательность частичных сумм ряда

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x) \rightarrow S(x), \quad (n \rightarrow +\infty),$$

то говорят, что ряд **сходится поточечно** при $x \in X$ и имеет сумму $S(x)$. Пишут:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) = S(x).$$

Определение. Равномерная сходимость

Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ **сходится равномерно** по $x \in X$ к сумме $S(x)$, если равномерно к $S(x)$ сходится последовательность частичных сумм ряда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : \quad \forall n \geq N, \forall x \in X \quad \Rightarrow \quad \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon.$$

Функциональные ряды

Аналогично с функциональными последовательностями рассматривают и функциональные ряды.

Определение. Сходимость функционального ряда

Пусть задана функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$. Тогда символ $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$

называют **функциональным рядом**. Если для любого $x \in X$ сходится последовательность частичных сумм ряда

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x) \rightarrow S(x), \quad (n \rightarrow +\infty),$$

то говорят, что ряд **сходится поточечно** при $x \in X$ и имеет сумму $S(x)$. Пишут:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x) = S(x).$$

Определение. Равномерная сходимость

Функциональный ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ **сходится равномерно** по $x \in X$ к сумме $S(x)$, если равномерно к $S(x)$ сходится последовательность частичных сумм ряда:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N = N(\varepsilon) : \quad \forall n \geq N, \forall x \in X \quad \Rightarrow \quad \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon.$$

Свойства равномерно сходящихся последовательностей и рядов

Теорема (Непрерывность)

Пусть функциональная последовательность непрерывных функций $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно к $f(x)$ в некоторой окрестности точки x_0 . Тогда функция $f(x)$ непрерывна в точке x_0 .

Теорема (Интегрирование)

Пусть функциональная последовательность $\{f_n(x)\}$ сходится равномерно к $f(x)$ при $x \in [a, b]$. Тогда, если функции $f_n(x)$ интегрируемы на отрезке $[a, b]$, то функция $f(x)$ также интегрируема на $[a, b]$ и

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Теорема (Дифференцирование)

Пусть функциональная последовательность непрерывно дифференцируемых функций $\{f_n(x)\}$ сходится к $f(x)$ при $x \in [a, b]$ и последовательность функций $\{f'_n(x)\}$ сходится равномерно на $[a, b]$. Тогда функция $f(x)$ непрерывно дифференцируема на $[a, b]$ и

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f'_n(x) = f'(x)$$

Аналогичные утверждения справедливы и для функциональных рядов.

Признак равномерной сходимости ряда

Теорема Вейерштрасса

Пусть задан функциональный ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ при $x \in X$ и сходящийся числовой ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$.

Если справедливы неравенства:

$$|f_n(x)| \leq a_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall x \in X,$$

то функциональный ряд сходится равномерно в X .

В этом случае числовой ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ называют **мажорирующим** для ряда $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$.

Степенные ряды

Определение степенного ряда

Функциональный ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x - x_0)^n$ называют **степенным рядом** с центром в точке x_0 .

Последовательность a_n называют **последовательностью коэффициентов** степенного ряда.

Простой заменой переменных $\tilde{x} = x - x_0$ можно перейти к рассмотрению степенного ряда $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \tilde{x}^n$ с центром в точке $\tilde{x} = 0$.

Определение ряда Тейлора

Рядом Тейлора функции $f(x)$, дифференцируемой любое число раз в окрестности точки x_0 , называют степенной ряд

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \dots$$

Пример

Бесконечная геометрическая прогрессия сходится при $|x| < 1$:

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k = \frac{1}{1-x}.$$

Сходимость не является равномерной на $(-1, 1)$. Действительно

$$\frac{1}{1-x} - \sum_{n=1}^n x^n = \frac{1}{1-x} - \frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \frac{x^{n+1}}{1-x}.$$

Равномерная сходимость на $(-1, 1)$ эквивалентна (по утверждению):

$$\sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{x^{n+1}}{1-x} \right| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow +\infty)$$

но \sup равен $+\infty$ для каждого n .

С другой стороны, равномерная сходимость имеет место для любого отрезка $[-r, r] \subset (-1, 1)$, поскольку:

$$\sup_{x \in [-r, r]} \left| \frac{x^{n+1}}{1-x} \right| \leq \frac{|r|^{n+1}}{1-r} \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow +\infty).$$

Степенные ряды

Теорема о множестве сходимости степенного ряда

Если степенной ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ сходится для $x_0 \neq 0$, то он абсолютно сходится для любого $|x_1| < |x_0|$. Ряд равномерно сходится на отрезке $[-r, r]$, где $r = |x_1|$.

Доказательство

По условию ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_0^n$ сходится. Следовательно,

$$a_n x_0^n \rightarrow 0, \quad n \rightarrow +\infty \Rightarrow \exists M : |a_n x_0^n| < M, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Пусть $|x_1| < |x_0|$. Тогда

$$|a_n x_1^n| = |a_n x_0^n| \left| \frac{x_1}{x_0} \right|^n \leq M q^n,$$

где $q = \left| \frac{x_1}{x_0} \right| < 1$. По признаку сравнения ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n x_1^n|$ сходится. Равномерная сходимость на $[-r, r]$ следует из признака Вейерштрасса.

Радиус сходимости степенного ряда

Определение

Рассмотрим множество X сходимости степенного ряда $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

Радиусом сходимости степенного ряда называют величину

$$R = \sup_{x \in X} |x|.$$

Множество X всегда не пусто, поскольку $0 \in X$.

Если $R = 0$, то есть степенной ряд сходится только для $x = 0$, то его называют **всюду расходящимся**.

Если множество X не является ограниченным и, следовательно, $R = +\infty$, то степенной ряд (по теореме) сходится для любых $x \in \mathbb{R}$. Такой ряд называют **всюду сходящимся**.

Следствия

Из доказанной теоремы следует, что интервал $(-R, R)$ всегда лежит в множестве сходимости степенного ряда X . На интервале $(-R, R)$ степенной ряд сходится абсолютно и ряд расходится вне этого интервала. Ряд сходится равномерно на любом отрезке $[-r, r]$, который полностью лежит в интервале сходимости $(-R, R)$.