

Выборный Евгений Викторович  
email: [evybornyi@hse.ru](mailto:evybornyi@hse.ru)

## Математический анализ

### Тема 5: Ряды

Москва 2016

## Числовые ряды. Определение

В математике и различных приложениях крайне часто возникает необходимость рассматривать суммы с бесконечным числом слагаемых. Приведем два примера.

### Представление числа в десятичной системе счисления

В десятичной системе счисления любое действительное число представляется в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, d_1 d_2 d_3 \dots,$$


где  $d_k$  — цифра от 0 до 9. Эта запись означает, что

$$a = a_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots$$

### Бесконечная геометрическая прогрессия

Очевидно, что

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$



## Числовые ряды. Определение

В математике и различных приложениях крайне часто возникает необходимость рассматривать суммы с бесконечным числом слагаемых. Приведем два примера.

### Представление числа в десятичной системе счисления

В десятичной системе счисления любое действительное число представляется в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, d_1 d_2 d_3 \dots,$$


где  $d_k$  — цифра от 0 до 9. Эта запись означает, что

$$a = a_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots$$

### Бесконечная геометрическая прогрессия

Очевидно, что

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$



## Числовые ряды. Определение

В математике и различных приложениях крайне часто возникает необходимость рассматривать суммы с бесконечным числом слагаемых. Приведем два примера.

### Представление числа в десятичной системе счисления

В десятичной системе счисления любое действительное число представляется в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, d_1 d_2 d_3 \dots,$$


где  $d_k$  — цифра от 0 до 9. Эта запись означает, что

$$a = a_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots$$

### Бесконечная геометрическая прогрессия

Очевидно, что

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$



## Числовые ряды. Определение

В математике и различных приложениях крайне часто возникает необходимость рассматривать суммы с бесконечным числом слагаемых. Приведем два примера.

### Представление числа в десятичной системе счисления

В десятичной системе счисления любое действительное число представляется в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, d_1 d_2 d_3 \dots,$$


где  $d_k$  — цифра от 0 до 9. Эта запись означает, что

$$a = a_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots$$

### Бесконечная геометрическая прогрессия

Очевидно, что

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$



## Числовые ряды. Определение

В математике и различных приложениях крайне часто возникает необходимость рассматривать суммы с бесконечным числом слагаемых. Приведем два примера.

### Представление числа в десятичной системе счисления

В десятичной системе счисления любое действительное число представляется в виде бесконечной десятичной дроби

$$a = a_0, d_1 d_2 d_3 \dots,$$


где  $d_k$  — цифра от 0 до 9. Эта запись означает, что

$$a = a_0 + \frac{d_1}{10} + \frac{d_2}{10^2} + \frac{d_3}{10^3} + \dots$$

### Бесконечная геометрическая прогрессия

Очевидно, что

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1.$$



# Числовые ряды. Определение

## Определение

Пусть задана последовательность  $a_n$ . Тогда символ

$$\sum_{k=1}^{+\infty} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots ,$$

представляющий упорядоченную сумму бесконечного числа слагаемых, называют **числовым рядом**. Величины  $S_n$ :

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + \cdots + a_n,$$

называют **частичными суммами** числового ряда. Если последовательность чисел  $S_n$  имеет предел при  $n \rightarrow +\infty$ , то говорят, что соответствующий числовой ряд **сходится**, а число

$$S = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k$$

называют **суммой числового ряда**. В этом случае пишут:

$$S = \sum_{k=1}^{+\infty} a_k.$$

## Числовые ряды. Определение

В действительности, числовые ряды — это другой способ говорить о числовых последовательностях.

Каждому числовому ряду соответствует последовательность частичных сумм:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} h_k \rightarrow S_n = \sum_{k=1}^n h_k.$$

Обратно, для произвольной последовательности  $a_n$  можно рассмотреть числовой ряд:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} d_k = a_1 + (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \cdots,$$

где

$$d_n = a_n - a_{n-1}, \quad n \geq 2, \quad d_1 = a_1.$$

Частичные суммы этого ряда в точности совпадают с членами последовательности  $a_n$ :

$$a_n = \sum_{k=1}^n d_k.$$

Следовательно, если последовательность  $a_n$  сходится, то и ряд с членами  $d_k$  сходится, и соответствующие пределы совпадают.



## Числовые ряды. Примеры

### ❶ Числовой ряд

$$\sum_{k=1}^{+\infty} 1 = 1 + 1 + 1 + \dots$$

расходится к  $+\infty$ , поскольку частичные суммы  $S_n = n \rightarrow +\infty$  при  $n \rightarrow +\infty$ .

### ❷ Числовой ряд

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k = 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$$

расходится, поскольку частичные суммы  $S_n$  не имеют предела.

### ❸ Числовой ряд

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(1+k)k} = \sum_{k=1}^{+\infty} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1$$

сходится, поскольку частичные суммы имеют вид:

$$S_n = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \left( 1 - \frac{1}{2} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

### ❹ Расходится числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln \left( \frac{n+1}{n} \right) = \sum_{n=1}^{+\infty} (\ln(n+1) - \ln(n)) = +\infty.$$

## Остаток ряда

Числовой ряд

$$R_k = \sum_{n=k+1}^{+\infty} a_n$$

называют  $k$ -ым **остатком ряда**  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ . Исходный ряд и его остаток сходятся или расходятся одновременно.

## Линейность

Если ряды  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  и  $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$  сходятся, то сходится и ряд с общим членом  $A a_n + B b_n$ .

Справедливо равенство:

$$\sum_{k=1}^{+\infty} (A a_n + B b_n) = A \sum_{n=1}^{+\infty} a_n + B \sum_{n=1}^{+\infty} b_n.$$

### Теорема. Необходимое условие сходимости ряда

Если числовой ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  сходится, то  $a_n \rightarrow 0$  при  $n \rightarrow +\infty$ .

### Доказательство

Сходимость ряда означает, что

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k = S.$$

Тогда

$$a_n = S_n - S_{n-1} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

Обратное утверждение не верно. Например, ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$  расходится, поскольку

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n}} \geq n \frac{1}{\sqrt{n}} = \sqrt{n} \Rightarrow S_n \rightarrow +\infty.$$

## Числовые ряды. Знакопостоянные ряды

Ряд называют знакопостоянным, если все  $a_n \geq 0$  или  $a_n \leq 0$ .

### Предложение

Положительный числовой ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ , где  $a_n \geq 0$ , всегда имеет сумму. Сумма ряда будет конечной, если последовательность частичных сумм ряда ограничена, иначе сумма ряда будет равна  $+\infty$ .

### Доказательство

Последовательность частичных сумм является монотонной:

$$A_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} a_k = A_n + a_{n+1} \geq A_n, \quad \forall n.$$

Следовательно, по теореме Вейерштрасса существует предел последовательности  $A_n$ , представляющий сумму ряда.

# Числовые ряды. Теорема сравнения

## Теорема. Сравнение

Рассмотрим два положительных ряда  $A = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  и  $B = \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ . Пусть справедливо неравенство

$$a_n \leq b_n, \quad \forall n \geq 1.$$

Тогда из сходимости ряда  $B$  следует сходимость ряда  $A$ , а из расходимости ряда  $A$  следует расходимость ряда  $B$ .

Аналогичное утверждение справедливо при выполнении условия  $a_n = O(b_n)$ .

## Теорема. Асимптотическое сравнение

Пусть  $a_n \geq 0$ ,  $b_n \geq 0$  и  $a_n \sim b_n$ , при  $n \rightarrow +\infty$ . Тогда ряды  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  и  $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$  сходятся или расходятся одновременно.

## Упражнение

Выпишите полное доказательство этих теорем.

## Числовые ряды. Признак Коши

В качестве эталона для сравнения рядов выберем геометрическую прогрессию:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}, \quad 0 \leq q < 1.$$

### Теорема. Признак Коши

Пусть  $a_n \geq 0$  и для достаточно больших  $n$  справедливо неравенство:

$$C_n = \sqrt[n]{a_n} \leq q < 1.$$

Тогда ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  сходится, а если  $C_n \geq 1$ , то ряд расходится.

### Доказательство

Из предположения теоремы следует, что  $a_n < q^n$  для достаточно больших  $n$ . Из теоремы о сравнении рядов и сходимости геометрической прогрессии с знаменателем  $q < 1$  следует сходимость ряда с членами  $a_n$ .

Если  $C_n \geq 1$ , то и  $a_n \geq 1$ . Следовательно,  $a_n \not\rightarrow 0$  при  $n \rightarrow +\infty$ , то есть не выполнено необходимое условие сходимости ряда.

## Числовые ряды. Признак Коши

Поскольку нас интересует выполнение неравенства

$$\sqrt[n]{a_n} \leq q < 1$$

только для достаточно больших  $n$  можно сформулировать предельный признак сравнения.

### Теорема. Предельный признак Коши

Пусть существует предел

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = q.$$

Тогда при  $q < 1$  ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  сходится, а при  $q > 1$  расходится. Если  $q = 1$ , то вопрос остается открытым.

### Доказательство

Рассмотрим случай  $q < 1$ . Дано:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N : |\sqrt[n]{a_n} - q| < \varepsilon \quad \forall n > N.$$

Выбирая положительное  $\varepsilon = \varepsilon_0 < 1 - q$ , получаем, что

$$\sqrt[n]{a_n} < q + \varepsilon_0 < 1.$$

Остается применить признак сходимости Коши.

### Пример

Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{2n}}{e^{n^2}}.$$

Применим предельный признак Коши:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{e^n} = 0 < 1.$$

Следовательно, ряд сходится.

### Упражнение

Аналогично рассмотрите ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} 3^n \left( \frac{n+1}{n+2} \right)^{n^2}$ .



## Числовые ряды. Признак Даламбера

Сложность применения признака Коши связана с необходимостью вычисления корня  $n$ -ой степени. Существует более простой признак сходимости Даламбера.

### Теорема. Признак Даламбера

Пусть  $a_n > 0$ . Если для достаточно больших  $n$  справедливо неравенство

$$\mathcal{D}_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1,$$

то ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  сходится, а если  $\mathcal{D}_n \geq 1$ , то ряд расходится.

Если существует предел  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lambda$ , то ряд сходится при  $\lambda < 1$  и расходится при  $\lambda > 1$ .

### Доказательство

Рассмотрим случай  $q < 1$ :

$$\mathcal{D}_n \leq q < 1 \quad \Rightarrow \quad a_{n+1} \leq q a_n \leq q^2 a_{n-1} \leq \dots \leq q^n a_1.$$

Следовательно,  $a_n = O(q^n)$ , и ряд с членами  $a_n$  сходится по теореме сравнения, где сравнение происходит с геометрической прогрессией.

## Числовые ряды. Признак Даламбера

Признак Даламбера особенно удобно применять, если в формуле для общего члена присутствуют факториалы.

### Пример

Рассмотрим ряд  $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$ .

По признаку Даламбера

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n!}{(n+1)!} = \frac{1}{1+n} \leq \frac{1}{2} < 1 \quad (n \geq 1).$$

Следовательно, ряд сходится.

Нам известно, что

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} = e.$$

### Упражнение

Аналогично рассмотрите ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} n^2 \left(\frac{2}{3}\right)^n$ .

## Числовые ряды. Интегральный признак

Рассмотрим положительный числовой ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ .

### Теорема. Интегральный признак сходимости ряда

Пусть

$$a_n = f(n),$$

где  $f \in C[1, +\infty)$  положительна и монотонно убывает.

Тогда ряд  $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$  и интеграл  $\int_1^{+\infty} f(x)dx$  сходятся или расходятся одновременно.

### Доказательство

Из положительности  $f$  следует, что сходимость интеграла эквивалентна ограниченности  $F(x) = \int_1^x f(t)dt$ , а сходимость ряда эквивалентна ограниченности последовательности частичных сумм  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ .


По теореме сравнения для интеграла:

$$a_k \leq \int_k^{k+1} f(x)dx \leq a_{k+1} \quad \Rightarrow \quad S_n \leq F(n+1) \leq S_{n+1} - a_1$$

Из последнего неравенства следует эквивалентность ограниченности  $F(x)$  и  $S_n$ .

## Числовые ряды. Интегральный признак

Теорема об интегральном признаке сходимости имеет простую геометрическую интерпретацию.



Если интеграл  $\int_1^{+\infty} f(x)dx$  сходится, то он представляет площадь под графиком  $f(x)$  при  $x \geq 1$ . Сумма ряда  $\sum_{k=2}^{+\infty} a_k$  можно интерпретировать, как площадь прямоугольников, полностью лежащих под графиком  $f$ .

Следовательно, из ограниченности площади под графиком  $f$  следует и ограниченность суммарной площади прямоугольников.