

*February 25, 2020*

# Condensé de la terminale Mathématiques

Ewen Le Bihan  
TS3

## Notations non vues en cours

$:=$	Égal par définition
$\lceil x \rceil$	Arrondir $x$ à l'entier supérieur. ( $\lceil 5.1 \rceil = 6$ )
1.5	Séparateur ,
$x \cdot y$	Multiplication $\times$
$\nearrow$	Croissant
$\searrow$	Décroissant
$a \gtrless b$	Revient à écrire $a > b$ , $a = b$ et $a > b$
$\wedge$	"et"
$\text{Im} z$	Point d'affixe $z$
$\diamond$	Caractère utilisé pour représenter plusieurs opérations

# Contents

<b>0 Outils</b>	<b>4</b>
0.1 Composition de fonction $f \circ g$	4
0.2 Équations de cercle $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$	4
0.3 Opérations avec des puissances	4
0.4 Diverses théorèmes	4
0.4.1 Application de fonctions aux inéquations	4
<b>1 Suites numériques</b>	<b>5</b>
1.1 Définition fonctionnelle	5
1.2 Définition par récurrence	5
1.3 Suite arithmétique	5
1.4 Suite géométrique	5
1.5 Limites	5
1.6 Majoration et minoration	6
1.7 Opérations sur les limites	6
1.8 Comparaisons et limites	6
<b>2 Probabilités</b>	<b>7</b>
2.1 Probabilité conditionnelle $P(A B)$	7
2.2 Probabilités d'intersections $P(A \cap B)$	7
2.3 Probabilités d'union $P(A \cup B)$	7
2.4 Partitions	7
2.5 Formule des probabilités totales	7
2.6 Indépendance d'événements	7
2.7 Loi de Bernoulli	7
2.8 Autre vocabulaire	8
<b>3 Limites <math>\lim</math></b>	<b>9</b>
3.1 Notation	9
3.2 Limites d'un quotient à la valeur indéfinie	9
3.3 Opérations sur les limites	9
3.4 Asymptotes	10
3.5 Simplifications de limites	10
3.5.1 Polynômes	10
3.6 Fonctions composées	10
<b>4 Continuité des fonctions</b>	<b>11</b>
4.1 Définition	11
4.2 Continuité de fonctions usuelles	11
4.3 Théorèmes utilisant la continuité	11
4.3.1 Valeurs intermédiaires	11
4.3.2 Bijection	11

<b>5</b>	<b>Nombres complexes <math>\mathbb{C}</math></b>	<b>12</b>
5.1	Définition . . . . .	12
5.2	Partie imaginaire $\text{Im}$ et réelle $\text{Re}$ . . . . .	12
5.2.1	Définition . . . . .	12
5.2.2	Propriétés . . . . .	12
5.3	Conjugué $\bar{z}$ . . . . .	12
5.3.1	Définition . . . . .	12
5.3.2	Identités . . . . .	12
5.4	Affixe $\text{Aff}$ . . . . .	12
5.4.1	Propriétés . . . . .	12
5.5	Racines des polynômes de second degré $az^2 + bz + c$ . . . . .	13
5.6	Coordonnées polaires avec $z$ . . . . .	13
5.6.1	Module $ z $ . . . . .	13
5.6.2	Argument $\arg$ . . . . .	13
5.7	Formes . . . . .	14
5.7.1	Propriétés de la forme exponentielle . . . . .	14
<b>6</b>	<b>Dérivées</b>	<b>15</b>
6.1	Opération sur des fonctions . . . . .	15
<b>7</b>	<b>Fonction exponentielle <math>\exp</math></b>	<b>16</b>
7.1	Notation . . . . .	16
7.2	Caractéristiques . . . . .	16
7.3	Limites remarquables . . . . .	16
7.4	Propriétés . . . . .	16
<b>8</b>	<b>Géométrie dans l'espace</b>	<b>17</b>
8.1	Intersections . . . . .	17
8.1.1	Droite-droite, plan-plan . . . . .	17
8.1.2	Droite-plan . . . . .	17
8.2	Section d'un cube . . . . .	17
8.3	Orthogonalité $\perp$ . . . . .	17
8.4	Plan $\perp$ droite . . . . .	17
8.5	Plan médiateur . . . . .	17
8.6	Propriétés . . . . .	18
<b>9</b>	<b>Le logarithme népérien <math>\ln</math></b>	<b>19</b>
9.1	Caractéristiques . . . . .	19
9.2	Limites remarquables . . . . .	19
9.3	Propriétés . . . . .	19

## 0 Outils

### 0.1 Composition de fonction $f \circ g$

Soit  $f$  et  $g$  des fonctions respectivement définies sur  $I$  et  $J$

$$(f \circ g)(x) \iff f(g(x))$$

Attention: il faut que  $x$  soit défini dans  $I$  et que  $g(x)$  soit défini dans  $J$

Plus généralement, soit  $\Theta$  un ensemble de fonctions

$$\left(\bigcirc_{i=0}^j \Theta_i\right)(x) = \Theta_0(\Theta_1(\Theta_2(\Theta_3 \dots (x \dots)))$$

### 0.2 Équations de cercle $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$

Soit  $R$  le rayon du cercle, et  $O(x_0; y_0)$  le centre du cercle

Un cercle dans le plan peut être décrit par l'équation suivante:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

### 0.3 Opérations avec des puissances

$$(x^a)^b = x^{ab}$$

$$x^a x^b = x^{a+b}$$

$$x^{-a} = \frac{1}{x^a}$$

$$x^{\frac{1}{a}} = \sqrt[a]{x}$$

$$x^0 = 1$$

### 0.4 Diverses théorèmes

#### 0.4.1 Application de fonctions aux inéquations

Soit  $I$  une intervalle,  $f$  une fonction définie et croissante sur  $I$ ,  $x$  et  $y$  deux nombres dans  $I$

$$\begin{aligned} x &\begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} y \\ \iff f(x) &\begin{matrix} \geq \\ \leq \end{matrix} f(y) \end{aligned}$$

# 1 Suites numériques

## 1.1 Définition fonctionnelle

Soit  $f$  une fonction:

$$u_n = f(n)$$

## 1.2 Définition par récurrence

Soit  $f$  une fonction

$$u_n = \begin{cases} u_0 = \text{cste} \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

## 1.3 Suite arithmétique

Avec  $r$  la raison de la suite

**Définition fonctionnelle**  $u_n = u_0 + r \cdot n$

**Définition par récurrence**  $u_n = \begin{cases} u_0 = \text{cste} \\ u_{n+1} = u_n + r \end{cases}$

**Somme des termes de  $i$  à  $j$**   $\sum_{i=i}^j u_i = (j - i + 1) \cdot \frac{u_j + u_i}{2}$

## 1.4 Suite géométrique

Avec  $q$  la raison de la suite

**Définition fonctionnelle**  $u_n = u_0 \cdot q^n$

**Définition par récurrence**  $u_n = \begin{cases} u_0 = \text{cste} \\ u_{n+1} = u_n \cdot q \end{cases}$

**Somme des termes de  $i$  à  $j$**   $\sum_{i=i}^j u_i = u_j \cdot \frac{1 - q^{j-i+1}}{1 - q}$

## 1.5 Limites

**Suite convergente vers  $L$**   $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L$

**Suite divergente**  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \neq L$

$p \in \{0.5\} \cup \mathbb{N}$	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$q \in \mathbb{R}$					
$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n$	?		0	1	$+\infty$
$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^p$		0	1		$+\infty$

Limites de type  $\text{cste}^n$  ou  $n^{\text{cste}}$

## 1.6 Majoration et minoration

Soit  $(u_n)$  une suite définie sur les rangs dans  $I$  et  $L$  un réel

**Suite majorée**  $\forall n \in I \quad \exists M \quad u_n \leq M$

**Suite minorée**  $\forall n \in I \quad \exists m \quad u_n \geq m$

**Suite bornée** Suite majorée *et* minorée

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \dots$$

	Majorée (par $L$ )		Minorée (par $L$ )	
	Oui	Non	Oui	Non
$\nearrow$	$\leq L$	$= +\infty$		
$\searrow$			$\geq L$	$= -\infty$

Soit  $f$  la fonction associée à  $u_n$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = L \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} u_{n+1} = f(L)$$

## 1.7 Opérations sur les limites

Voir en 3.3

## 1.8 Comparaisons et limites

Soit  $L \in \mathbb{R}$ ,  $(u_n)$ ,  $(v_n)$  et  $(w_n)$  trois suites et  $l_A$  la limite quand  $n \rightarrow +\infty$  de la suite  $A_n$

Nom du théorème	Conditions		Résultat	Explication graphique
Par comparaison	$u_n \leq v_n$	$l_u = +\infty$	$\implies l_v = +\infty$	$(u_n)$ emporte $(v_n)$ vers $+\infty$
	$u_n \geq v_n$	$l_u = -\infty$	$\implies l_v = -\infty$	$(u_n)$ emporte $(v_n)$ vers $-\infty$
Théorème des gendarmes	$w_n \geq v_n \geq u_n$	$l_u = l_w = L$	$\implies l_v = L$	$(u_n)$ et $(w_n)$ forcent $(v_n)$ à tendre vers $L$

## 2 Probabilités

### 2.1 Probabilité conditionnelle $P(A|B)$

Probabilité que  $A$  soit réalisé **sachant que**  $B$  a déjà été réalisé.

$$P(A|B) \text{ ou } P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad \text{si } P(B) \neq 0$$

### 2.2 Probabilités d'intersections $P(A \cap B)$

Probabilité que  $A$  **et**  $B$  soit réalisées.

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(B) \cdot P(A|B) \\ &= P(A) \cdot P(B|A) \end{aligned}$$

### 2.3 Probabilités d'union $P(A \cup B)$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

### 2.4 Partitions

Si on a deux événements ou plus tel que...

- Aucun événement n'est vide  
 $\iff B_i \neq \emptyset \quad \forall i$
- Aucun événement ne recouvre un autre  
 $\iff B_i \cap B_j = \emptyset \quad \forall i, j$
- L'union de chaque partition couvre l'univers entier  
 $\iff \bigcup_{i=1}^j B_i = \Omega$

### 2.5 Formule des probabilités totales

Soit  $B_1, B_2, \dots, B_n$  des événements formant une partition de  $\Omega$

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i)$$

### 2.6 Indépendance d'événements

$$\begin{aligned} A \text{ et } B \text{ sont indépendants} &\iff \overline{B} \text{ et } B \text{ forment une partition de } \Omega \\ &\iff \overline{A} \text{ et } A \text{ forment une partition de } \Omega \\ &\iff \overline{A} \text{ et } \overline{B}, A \text{ et } \overline{B} \text{ et } B \text{ et } \overline{A} \text{ sont indépendants} \end{aligned}$$

### 2.7 Loi de Bernoulli

Épreuve de Bernoulli



## 2.8 Autre vocabulaire

Événements incompatibles  $P(A \cap B) = 0$

### 3 Limites lim

#### 3.1 Notation

Soit  $x$ ,  $C$  et  $D$  des nombres et  $\Psi$  un réel,  $+\infty$  ou  $-\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \Psi} C = D \iff C \xrightarrow{x \rightarrow \Psi} D$$

$$\iff \text{Limite de } C \text{ quand } x \text{ tends vers } \Psi$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \Psi \\ >}} C = D \iff C \xrightarrow{x \rightarrow \Psi^+} D$$

$$\iff \text{Limite de } C \text{ en } \Psi \text{ par valeurs supérieures}$$

$$\iff \text{Limite de } C \text{ à droite de } \Psi$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \Psi \\ <}} C = D \iff C \xrightarrow{x \rightarrow \Psi^-} D$$

$$\iff \text{Limite de } C \text{ en } \Psi \text{ par valeurs inférieures}$$

$$\iff \text{Limite de } C \text{ à gauche de } \Psi$$

#### 3.2 Limites d'un quotient à la valeur indéfinie

Soit  $f : x \mapsto \frac{p(x)}{q(x)}$  et  $r \in \mathbb{R}$  tq.  $q(r) = 0$

1. Calculer  $\lim_{x \rightarrow r} p(x)$
2. **Par valeurs supérieures** Calculer  $\lim_{x \rightarrow r^+} q(x)$ :  $0^+$  ou  $0^-$   
**Par valeurs inférieures** Calculer  $\lim_{x \rightarrow r^-} q(x)$ :  $0^+$  ou  $0^-$
3. Conclure par quotient:  $0^+ \rightarrow +$  et  $0^- \rightarrow -$

#### 3.3 Opérations sur les limites

Les opérations entre deux limites réelles sont comparables aux opérations sur des nombres

**FI** Forme Indéterminée

$x, y$	$x + y$	$x \cdot y$	$x/y$
$\pm\infty$	Signes = $\pm\infty$ Signes $\neq$ FI	(règle des signes)	FI
$\mathbb{R}$ ou $\pm\infty$	$\pm\infty$	$x = 0$ FI $x > 0$ $\pm\infty$ $x < 0$ $\mp\infty$	$y = 0$ FI $y = \pm\infty$ 0 $x = \pm\infty$ et $y \in \mathbb{R}^*$ $\pm\infty$

### 3.4 Asymptotes

Soit  $L \in \mathbb{R}$ ,  $f$  une fonction,  $\Gamma$  la courbe d'équation  $y = f(x)$  et  $\Psi$  un nombre ou symbole

$$\begin{aligned} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow \Psi} L &\iff \Gamma \text{ admet en } \Psi \text{ une asymptote (horizontale) d'équation } y = L \\ \begin{cases} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow L^+} \pm\infty \\ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow L^-} \pm\infty \end{cases} &\iff \Gamma \text{ admet en } L \text{ une asymptote (verticale) d'équation } x = L \end{aligned}$$

### 3.5 Simplifications de limites

#### 3.5.1 Polynômes

Pour les limites en  $+\infty$  ou en  $-\infty$ , on peut simplifier la limite d'un polynôme à la limite du terme de plus haut degré:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3 - 4x + 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2x^3$$

Ça marche aussi avec les fractions:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^9 + x^3 - 2}{5x^3 - 8x^{18} + 420} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^9}{-8x^{18}}$$

### 3.6 Fonctions composées

Soit  $a, b \in \mathbb{R} \cup \{-\infty; +\infty\}$ ,  $f$  et  $g$  des fonctions

$$\begin{cases} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} c \end{cases} \implies (f \circ g)(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} c$$

## 4 Continuité des fonctions

### 4.1 Définition

Une fonction est continue quand "on peut tracer sa courbe sans lever le stylo". Plus rigoureusement, la fonction  $f$  est continue sur l'intervalle  $I$  si, pour tout  $a \in I$ ,  $f(a) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$ .

### 4.2 Continuité de fonctions usuelles

Polynôme	$\mathbb{R}$
$\sqrt{x}$	$\mathbb{R}^+$
Rationnelle	Ensemble de définition

De plus, n'importe quelle fonction créée par  $+$ ,  $\times$ ,  $\circ$  ou  $\div$  à partir de fonctions continues sont continues

### 4.3 Théorèmes utilisant la continuité

#### 4.3.1 Valeurs intermédiaires

Soit  $a$  et  $b$  des réels,  $f$  une fonction continue sur  $[a; b]$ .

$$\forall k \in [f(a); f(b)], \quad f(x) = k \text{ admet au moins une solution dans } [a; b]$$

#### 4.3.2 Bijection

Soit  $I$  une intervalle,  $a$  et  $b$  des réels dans  $I$  et  $f$  une fonction définie sur  $I$  ou plus grand

$$\begin{cases} f \text{ est continue sur } I \\ f \text{ est strictement monotone sur } I \end{cases} \quad (1)$$
$$k \in [f(a); f(b)] \quad (2)$$

$$\implies f(x) = k \text{ admet une unique solution dans } [a; b]$$

(1) quand elle ne l'est pas, on étudie séparément chaque intervalle où la fonction est strictement monotone

(2) si  $a$  ou  $b = \pm\infty$ , on calcule la limite pour l'intervalle image:

Montrer que  $f(x) = k$  n'admet qu'une seule solution dans  $\mathbb{R}$

$$k \in \left] \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[$$

*Attention:* pour montrer que  $f(x) = k$  n'a pas de solutions on n'utilise pas la bijection mais le tableau de variations

## 5 Nombres complexes $\mathbb{C}$

### 5.1 Définition

$$i^2 := -1, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad z \in \mathbb{C} \\ z = a + ib$$

Ensemble des imaginaires purs:  $i\mathbb{R} := \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$

### 5.2 Partie imaginaire $\text{Im}$ et réelle $\text{Re}$

#### 5.2.1 Définition

- $\text{Re}(a + ib) := a$
- $\text{Im}(a + ib) := b$

#### 5.2.2 Propriétés

- $\text{Re } z = 0 \iff z \in i\mathbb{R}$
- $\text{Im } z = 0 \iff z \in \mathbb{R}$

### 5.3 Conjugé $\bar{z}$

#### 5.3.1 Définition

$$\bar{z} := \text{Re } z - i\text{Im } z$$

#### 5.3.2 Identités

$\diamond$  représente les opérations  $+$ ,  $\times$  et  $\div$

- $z \cdot \bar{z} = (\text{Im } z)^2 + (\text{Re } z)^2$
- $\overline{z \diamond w} = \bar{z} \diamond \bar{w}$
- $\overline{z^n} = (\bar{z})^n$
- $\overline{\bar{z}} = z$
- $\bar{z} = z \iff z \in \mathbb{R}$

### 5.4 Affixe $\text{Aff}$

L'affixe est un nombre complexe représenté par un point ou un vecteur dans le plan:

$$\text{Aff} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a + ib$$

Réciproquement, l'image de  $a + ib$  est  $(a; b)$

#### 5.4.1 Propriétés

- $\text{Aff}(\overrightarrow{AB}) = \text{Aff}(B) - \text{Aff}(A)$

## 5.5 Racines des polynômes de second degré $az^2 + bz + c$

$$az^2 + bz + c = 0 \quad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad \Delta := b^2 - 4ac$$

$$\begin{cases} \Delta < 0 & \Rightarrow \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a} \\ \Delta = 0 & \Rightarrow \frac{-b}{2a} \\ \Delta > 0 & \Rightarrow \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \end{cases}$$

## 5.6 Coordonnées polaires avec $z$




Figure 1: Représentation géométrique de l'affixe de  $z$  et de ses propriétés

### 5.6.1 Module $|z|$

$$|z| = \sqrt{\text{Re}^2 z + \text{Im}^2 z}$$

Propriétés

$\diamond$  représente les opérations  $\times$  et  $\div$

$$|z^n| = |z|^n$$

$$|z \diamond z'| = |z| \diamond |z'|$$

### 5.6.2 Argument $\arg$

$$\forall z \in \mathbb{C}^*$$

$$\begin{aligned} \arg z &:= \left( \overrightarrow{O \text{Im}(\text{Re } z)}; \overrightarrow{O \text{Im} z} \right) \\ &= \begin{cases} \cos(\arg z) &= \frac{\text{Re } z}{|z|} \\ \sin(\arg z) &= \frac{\text{Im } z}{|z|} \end{cases} \end{aligned}$$

Propriétés

*Similaire à ln, voir 9.2*

## 5.7 Formes

$$\begin{aligned}\operatorname{Re} z + i \operatorname{Im} z & \quad (\text{algébrique}) \\ |z| (\cos(\arg z) + i \sin(\arg z)) & \quad (\text{trigonométrique}) \\ |z| e^{i \arg z} & \quad (\text{exponentielle})\end{aligned}$$

Notations usuelles:  $r := |z|$ ,  $\theta := \arg z$ ,  $x := \operatorname{Re} z$ ,  $y := \operatorname{Im} z$

### 5.7.1 Propriétés de la forme exponentielle

$$e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$$

*Les autres propriétés découlent de celles de l'exponentielle, voir ??*

## 6 Dérivées

### 6.1 Opération sur des fonctions

Soit  $u$  et  $v$  des fonctions.

$$(uv)' = u'v + v'u$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$(u^n)' = nu'u^{n-1} \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0.5; -1\}$$

$$(u \circ v)' = u'(v' \circ u)$$

$$\sin' = \cos$$

$$\cos' = -\sin$$



## 7 Fonction exponentielle $\exp$

### 7.1 Notation

$$e^x := \exp x$$

### 7.2 Caractéristiques

Soit  $x \in \mathbb{R}$  et  $u$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$

**Dérivée**  $(e^x)' = e^x$   
 $(e^u)' = u'e^u$

**Réciproque**  $\ln(e^x) = x$

**Signe**  $e^x > 0$

**Variations** strictement croissante sur  $\mathbb{R}$

**Limites**  $e^x \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty$   
 $e^x \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0$

### 7.3 Limites remarquables

lim	$x \rightarrow$	=
$e^x - 1/x$	0	1
Par croissance comparée ↓		
$xe^x$	$-\infty$	0
$e^x/x$	$+\infty$	$+\infty$

### 7.4 Propriétés

$$e^a \gtrless e^b \iff a \gtrless b$$

$e^{a \diamond b}$	$e^a \diamond e^b$
+	$\times$
-	$\div$
$(e^a)^n$	$e^{an}$

## 8 Géométrie dans l'espace

### 8.1 Intersections

#### 8.1.1 Droite-droite, plan-plan

Soit  $a$  et  $b$  des droites et  $P$  et  $Q$  des plans

	Coplanaires			Non-coplanaires
	Parallèles		Sécantes	
	Strictement	Confondues		
$a \cap b$	$\emptyset$	$a$ et $b$	{point}	$\emptyset$
$P \cap Q$	$\emptyset$	$P$ et $Q$	droite	$\emptyset$

#### 8.1.2 Droite-plan

	Parallèles		Sécants
	Strictement	$a \subset P$	
$a \cap P$	$\emptyset$	droite	{point}

### 8.2 Section d'un cube

*2 points dans la même face*

Relier directement

*$[AB]$  sur une face,  $C$  sur face opposée*

Tracer la parallèle à  $[AB]$  passant par  $C$

*$[AB]$  sur une face  $E$ ,  $C$  sur face adjacente*

Prolonger une arête et  $(AB)$  jusqu'à intersection en  $D$

Tracer  $(DC)$ . La partie du segment qui est sur la face  $E$  est la section.

### 8.3 Orthogonalité $\perp$

$$d \underset{\text{orth.}}{\perp} d' \iff \gamma \underset{\text{perp.}}{\perp} \gamma' \quad \exists \gamma \parallel d, \gamma' \parallel d'$$

### 8.4 Plan $\perp$ droite

$$\begin{aligned} d \perp P &\iff d \perp \gamma \wedge d \perp \gamma' \quad \forall \gamma \cap \gamma' = \text{point} \\ &\implies \gamma \perp d \quad \forall \gamma \subset P \end{aligned}$$

### 8.5 Plan médiateur

$$\begin{aligned} P \text{ med } [AB] &\iff P \perp (AB) \wedge I \in P \quad \forall I \text{ mil } [AB] \\ &\iff P = \{C \mid CA = CB\} \end{aligned}$$

## 8.6 Propriétés

$$\begin{aligned}
d \parallel d' &\implies P \perp d \quad \forall P \perp d' \\
&\iff d \parallel \gamma \wedge d' \parallel \gamma \\
&\iff P \cap P' = d' \wedge d \parallel P \wedge d \parallel P'
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P \parallel P' &\iff P \perp d \wedge P' \perp d \\
&\iff P \parallel \Delta \wedge P' \parallel \Delta \\
&\iff d_1 \parallel d'_1 \wedge d \parallel d' \quad \forall d \cap d' = \text{point}, d_1 \cap d'_1 = \text{point} \\
&\implies \Gamma \cap P' = \gamma \wedge \Gamma \cap P = \gamma' \wedge \gamma \parallel \gamma' \quad \forall \Gamma \cap P = \text{droite}
\end{aligned}$$

$$\Delta \parallel d \wedge \Delta \parallel d' \iff d \parallel d' \wedge d \subset P \wedge d' \subset P' \wedge P \cap P' = \Delta$$

$$\Delta \parallel P \iff \Delta \parallel d \quad \forall d \subset P$$

$$P \parallel Q \wedge \Gamma \cap P = \gamma \implies \Gamma \cap Q = \gamma' \wedge \gamma \parallel \gamma'$$

## 9 Le logarithme népérien $\ln$

Aussi appelé "logarithme naturel" ou "logarithme base  $e$ "

### 9.1 Caractéristiques

Notation	$\ln x$
Réciproque	$\exp$
Ensemble	$\mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$
Limites	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$
Dérivée	$\frac{1}{x}$
Variations	Croissante sur $\mathbb{R}_+^*$
Continuité	Continue sur $\mathbb{R}_+^*$
Valeurs remarquables	$\ln 1 = 0$

### 9.2 Limites remarquables

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$$

### 9.3 Propriétés

$\ln(a \diamond b)$	$\ln a \diamond \ln b$
$\times$	$+$
$\div$	$-$
$a^n$	$n \ln a$