# Chapitre 4 : Espaces euclidiens

## I Produit scalaire et norme

### A Produit scalaire

*On ne rappelera pas les définitions de normes et distances ici et les propositions qui s'ensuivent. Le lecteur est invité à se référer au chapitre 4 du cours AN3.*

**Définition :** Soit $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.
Un **produit scalaire** sur $E$ est une application $\langle \cdot, \cdot \rangle : E \times E \to \mathbb{R}$ qui vérifie les propriétés suivantes :

1. $\forall x, y \in E,\ \langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (symétrie)
2. $\forall x, x', y \forall \lambda \in \mathbb{R},\ \langle \lambda x + x', y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle$ (linéarité en la première variable)
3. $\forall x \in E,\ \langle x, x \rangle \geq 0$ et $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$ (positivité)

En résumé, un produit scalaire est une forme bilinéaire, symétrique et définie positive.

**Exemple :** Dans $\mathbb{R}^n$,$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ est un produit scalaire.
Dans $\mathcal{C}^0([0,1], \mathbb{R})$, $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$ est un produit scalaire.

**Remarque :** Si $E$ est un espace vectoriel normé de dimension finie, il n'y a pas de produit scalaire canonique *a priori*. (On a vu néanmoins que dans $\mathbb{R}^n$, il existe un produit scalaire canonique.

**Définition :** Un $\mathbb{R}$-espace vectoriel $E$ de **dimension finie** muni d'un produit scalaire est appelé un **espace euclidien**.
On le note $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

**Identités remarquables :**

$\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle$
$\langle x + y, x - y \rangle = \langle x, x \rangle - \langle y, y \rangle$

**Théorème : Inégalité de Cauchy-Schwarz**

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.
Alors, pour tous $x, y \in E$, on a :

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle}\sqrt{\langle y, y \rangle}$$

De plus, l'égalité a lieu si et seulement si $x$ et $y$ sont colinéaires.

**Démonstration :**

- Soit $t \in \mathbb{R}$. On pose $P(t) = \langle x, y \rangle$. Supposons $y \neq 0$.
  $P(t) = \langle x, x \rangle + 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle \geq 0$ est polynômiale de degré 2 si $y \neq 0$. Ainsi $\Delta \leq 0$.
  $\Delta = (2\langle x, y \rangle)^2 - 4\langle x, x \rangle\langle y, y \rangle = 4(\langle x, y \rangle^2 - \langle x, x \rangle\langle y, y \rangle)$. Donc $\langle x, y \rangle \leq \langle x, x \rangle\langle y, y \rangle$.
- Supposons l'égalité. Alors $\Delta = 0$. Soit $t_0 \in \mathbb{R}$ tel que $P(t_0) = 0$.
  On obtient $\langle x + ty, x + ty \rangle = 0$, c'est-à-dire que $x + t_0 y = 0$. Donc $x$ et $y$ sont colinéaires.
- Réciproquement, si $x$ et $y$ sont colinéaires.
  Si $y \neq 0$, on peut écrire $x = \lambda y$ et $|\langle x, y \rangle| = |\langle \lambda y, y \rangle| = |\lambda|\langle y, y \rangle$.
  $\sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\langle \lambda y, \lambda y \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle y, y \rangle} = \lambda \langle y, y \rangle$. D'où l'égalité. $\square$

## B Normes

**Rappel :** On rappelle qu'une norme est une application $N\colon E \to \mathbb{R}_+$ qui vérifie l'homogénéité, l'inégalité triangulaire et la séparation.

**Proposition :**

Soit $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
On pose $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
Alors $\| \cdot \|$ est une norme sur $E$, appelée la norme associée au produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

**Démonstration :**
**Homogénéité :** Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in E$.
$\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$
**Inégalité triangulaire :** Soit $x, y \in E$.
$\|x+y\|^2 = \langle x+y, x+y \rangle = \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \leq \langle x, x \rangle + 2|\langle x, y \rangle| + \langle y, y \rangle$
$\leq \langle x, x \rangle + 2\sqrt{\langle x, x \rangle}\sqrt{\langle y, y \rangle} + \langle y, y \rangle = (\sqrt{\langle x, x \rangle} + \sqrt{\langle y, y \rangle})^2$
$\Rightarrow \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$
**Séparation :** Soit $x \in E$ tel que $\|x\| = 0$.
Alors $\sqrt{\langle x, x \rangle} = 0 \Rightarrow \langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$

**Remarque :** $x \mapsto |x|$ est une norme sur $\mathbb{R}$, associée au produit scalaire $\langle x, y \rangle = xy$.

**Rappel :** Une distance sur un ensemble $X$ est une application $d : X \times X \to \mathbb{R}_+$ qui vérifie la séparation, la symétrie et l'inégalité triangulaire.

**Proposition : Lien entre norme et distance**

Soit $N$ une norme sur un $\mathbb{R}$-espace vectoriel $E$.
Alors $d(x, y) = N(x - y)$ est une distance sur $E$.

**Remarque :** En géométrie affine, si $A$ et $B$ sont deux points, le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est défini par $\overrightarrow{AB} = B - A$, et $d(A, B) = \|\overrightarrow{AB}\|$.

**Remarque :** Un produit scalaire donne une norme ($\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$) et une norme donne une distance ($d(x, y) = \|x - y\|$).

**Propriété : Norme associée au produit scalaire (identité du parallélogramme)**

$\forall x, y \in E,\ \|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$.
On peut le vérifier avec $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ et les identités remarquables.

D'où si une norme ne vérifie pas l'identité du parallélogramme, elle n'est pas associée à un produit scalaire.

**Démonstration :**
Vérifions avec $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$.
$\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$ et $\|x-y\|^2 = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2$.
Donc, $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$.

**Définition :** Soit $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle \cdot, \cdot \rangle$.
L'**angle non-orienté** entre $x, y \in E \setminus \{0\}$ est défini par $\theta = \arccos\left(\frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|\|y\|}\right) \in [0, \pi]$.

**Remarque :** Cette définition est basée sur la propriété en géométrie euclidienne classique (angle où la direction

n'a pas d'importance), et on a : $\langle x, y\rangle = \|x\|\|y\|\cos(\theta)$.

**Remarque :** Le vecteur normé associé à $x \in E \setminus \{0\}$ est $\frac{x}{\|x\|}$. C'est utile pour calculer des vecteurs unitaires.

# II Orthogonalité

## A Vecteurs orthogonaux, familles orthogonales et orthonormées

**Définition :** Soit $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$.
Deux vecteurs $x, y \in E$ sont dits **orthogonaux** si $\langle x, y\rangle = 0$.

On note $x \perp y$. De même, si $F$ est un sous-espace vectoriel de $E$, on dit que $x \perp F$ si $\forall y \in F,\ x \perp y$.

**Remarque :** L'angle entre deux vecteurs orthogonaux non nuls est $\frac{\pi}{2}$, et tout vecteur est orthogonal au vecteur nul.

**Définition :** Soit $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$.
Une famille de vecteurs $(x_i)_{i\in I}$ est dite **orthogonale** si $x_i \perp x_j$ pour tous $i \neq j$, *i.e.* si ses vecteurs sont deux à deux orthogonaux.

**Théorème de Pythagore :**

Soit $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$.
Soit $(x_1, \ldots, x_k)$ une famille orthogonale (finie) de $E$.
Alors :

$$\|x_1 + \ldots + x_k\|^2 = \|x_1\|^2 + \ldots + \|x_k\|^2.$$

De plus, si $k = 2$, alors $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 \Rightarrow x \perp y$.

**Démonstration :**
$\|\sum_{i=1}^k x_i\|^2 = \langle\sum_{i=1}^k x_i, \sum_{j=1}^k x_j\rangle =$ (bilinéarité) $\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^k \langle x_i, x_j\rangle = \sum_{i=1}^k \langle x_i, x_i\rangle = \sum_{i=1}^k \|x_i\|^2$.

Pour $k = 2$, $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2$.
Donc si $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$, alors $2\langle x, y\rangle = 0 \Rightarrow x \perp y$. $\square$

**Définition :** Soit $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel (ou un espace hermitien), muni d'un produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$.
Une famille de vecteurs $(x_i)_{i\in I}$ est dite **orthonormée** si elle est orthogonale et que $\|x_i\| = 1$ pour tout $i \in I$.

Autrement dit, $\forall i, j \in I,\ \langle x_i, x_j\rangle = \delta_{ij}$.

**Proposition :**

Soit $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel, muni d'un produit scalaire $\langle\cdot,\cdot\rangle$.
Alors une famille orthogonale dont chacun des vecteurs est non nul est libre.

En particulier, une famille orthonormée est libre.

**Remarque :** Si $E$ est de dimension finie, toute famille orthonormée admet au plus $\dim(E)$ vecteurs.

**Démonstration :**
Soit $\sum_{i\in J} \lambda_i x_i = 0$ une combinaison linéaire nulle de vecteur de la famille $J$, avec $J \subset I$ un ensemble fini.
Soit $j \in J$, $\langle x_j, \sum_{i\in J} \lambda_i x_i\rangle = 0$.
D'où $\sum_{i\in J} \lambda_i \langle x_j, x_i\rangle = 0$ car $\langle x_j, x_i\rangle = 0$ si $i \neq j$.
D'où $\lambda_j \langle x_i, x_j\rangle = 0$; $\langle x_j, x_i\rangle > 0$ car $x_j \neq 0$. D'où $\lambda_j = 0$. D'où $\forall j \in J$, $\lambda_j = 0$.
Donc $(x_i)_{i\in I}$ est libre.

**Définition :** Soit $E$ un espace euclidien.
Une **base orthonormée** de $E$ est une famille orthonormée qui est une base de $E$.

**Parenthèse : avantages d'une base orthonormée :**
Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de $E$.
Soit $x \in E$.

Alors : $x = \sum_{i=1}^{n} \langle x, e_i \rangle e_i$. (on remarque que ça ressemble à la dualité !)
La $i^{me}$ coordonnée de $x$ dans la base $(e_1, \dots, e_n)$ est $\langle x, e_i \rangle$.

## B Procédé d'orthonormalisation Gram-Schmidt

Voir cette vidéo pour une explication du procédé d'orthonormalisation Gram-Schmidt.

**Théorème :**

Soit $E$ un espace euclidien de dimension finie et soit $(e_1, \dots, e_k)$ une famille libre de $E$.
Il existe une famille $(u_1, \dots, u_k)$ orthonormée de $E$ telle que $\forall i \in S_k,\ \text{Vect}(u_1, \dots, u_i) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.
En particulier, si $k = \dim(E)$, alors $(u_1, \dots, u_k = u_n)$ est une base orthonormée de $E$.

**Démonstration :**
On procède par récurrence sur $k$.
**Initialisation :** $k = 1$.
Alors $(e_1)$ est une famille libre de $E$ si et seulement si $e_1 \neq 0$.
Dans ce cas, on pose $u_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$, qui est un vecteur de norme 1.
**Hérédité :** Supposons que la propriété est vérifiée pour $k \leq n-1$.
Soit $(e_1, \dots, e_{k+1})$ une famille libre de $E$.
Par hypothèse de récurrence, il existe une famille $(u_1, \dots, u_k)$ orthonormée de $E$ telle que $\forall i \in S_k,\ \text{Vect}(u_1, \dots, u_i) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.
On pose : $\overline{u_{k+1}} = e_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} \langle e_{k+1}, u_i \rangle u_i$.

Soit $1 \leq i \leq k$.
On a : $\langle \overline{u_{k+1}}, u_i \rangle = \langle e_{k+1}, u_i \rangle - \sum_{j=1}^{k} \langle e_{k+1}, u_j \rangle \underbrace{\langle u_j, u_i \rangle}_{\delta ij}$. (car $(u_1, \dots, u_k)$ est orthonormée)

$\langle \overline{u_{k+1}}, u_j \rangle = \langle e_{k+1}, u_i \rangle - \langle e_{k+1}, u_i \rangle = 0$.
De plus, $\overline{u_{k+1}} \neq 0$ car $e_{k+1} \notin \text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(u_1, \dots, u_k)$.
On pose alors $u_{k+1} = \frac{\overline{u_{k+1}}}{\|\overline{u_{k+1}}\|}$, qui est un vecteur de norme 1.
On a : $(u_1, \dots, u_{k+1})$ est une famille orthonormée de $E$ qui vérifie $\forall i \in S_{k+1},\ \text{Vect}(u_1, \dots, u_i) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_i)$. $\square$

**Corollaire :**

Tout espace euclidien de dimension finie admet une base orthonormée.

**Définition :** Soient $E, F$ deux espaces euclidiens.
On appelle **isométrie** de $E$ dans $F$ toute application $f : E \to F$ qui est un isomorphisme d'espace vectoriel et $\forall x \in E,\ \|f(x)\| = \|x\|$.

**Remarque :** $\forall x \in E\ \|f(x)\| = \|x\| \Leftrightarrow \forall x, y \in E,\ \langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$.

**Application :** Démontrer la remarque précédente.

**Définition :** Deux espaces euclidiens $E$ et $F$ sont dits **isométriques** s'il existe une isométrie de $E$ dans $F$.

**Théorème :**

Soit $E$ un espace euclidien de dimension $n$.
Alors $E$ est isométrique à $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire canonique.

**Démonstration :**
Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de $E$.
Soit $(\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.
On définie l'application linéaire $f : E \to \mathbb{R}^n$ par $f(e_i) = \varepsilon_i$ pour tout $i \in S_n$.
Alors $f$ est un isomorphisme d'espace vectoriel (car l'image d'une base est une base).

Soit $x, y \in E$.
$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$ avec $x_i, y_i \in \mathbb{R}$.
$\langle x, y \rangle = \langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j \langle e_i, e_j \rangle$ (bilinéarité)
$= \sum_{i=1}^n x_i y_i$ (car $(e_1, \dots, e_n)$ est orthonormée) qui est le produit scalaire canonique de $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i$ et $f(y) = \sum_{i=1}^n y_i \varepsilon_i$.
$= \langle f(x), f(y) \rangle$ (car $f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i$ et $f(y) = \sum_{i=1}^n y_i \varepsilon_i$)
$\Rightarrow f$ est une isométrie de $E$ dans $\mathbb{R}^n$. $\square$

## C Projections orthogonales

**Définition :** Soit $E$ un espace euclidien et soit $F$ un sous-espace vectoriel de $E$.
Alors :

1. $\forall x \in E \ \exists! y \in F : (x - y) \perp F$. On dit que $y$ est le **projeté orthogonal** de $x$ sur $F$.
2. L'application $p : E \to F$ qui à $x$ associe son projeté orthogonal sur $F$ est appelée **projection orthogonale** de $E$ sur $F$ et $ker(p) = \{z \in E : z \perp F\} = F^\perp$. On a de plus que $p$ est un projecteur (*i.e.* $p^2 = p$).

**Démonstration de l'unicité du projeté orthogonal :**
Soit $y$ tel que $y \in F$ et $x - y \perp F$.
$F$ est un espace euclidien en posant comme produit scalaire sur $F$ la restriction à $F \times F$ du produit scalaire de $E$.
Soit $(e_1, \dots, e_k)$ une base orthonormée de $F$.
Alors : $y = \sum_{i=1}^k \langle y, e_i \rangle e_i$ et on a de plus $\forall i \in S_n \ e_i \perp x - y$.
Donc $0 = \langle x - y, e_i \rangle = \langle x, e_i \rangle - \langle y, e_i \rangle$ donc $y = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i$. $\square$
**Démonstration de l'existence du projeté orthogonal :**
Le vecteur $y = \sum_{i=1}^k \langle x, e_i \rangle e_i$ vérifie bien $y \in F$ et $x - y \perp F$. $\square$
**Démonstration de $ker(p)$ :**
$kerp = \{z \in E : p(z) = 0\} = \{z \in E : z \perp F\} = F^\perp$. $\square$

**Remarque :** Soit $p$ la projection orthogonale sur $F$. Alors pour $x \in E$, $p(x)$ est l'unique vecteur de $F$ tel que $\|x - p(x)\| = \min_{z \in F} \|x - z\|$. Autrement dit, $p(x)$ est le point de $F$ le plus proche de $x$.

**Démonstration :**

On a $\|x-z\|^2 = \|x-p(x)+p(x)-z\|^2 = \|x-p(x)\|^2\|p(x)-z\|^2$ par Pythagore.
$\geq \|x-p(x)\|^2$. Donc $p(x)$ atteint le $\min_{z\in F}\|x-z\|$.
De plus, le minimum est unique car $\|x-z\| = \min z \in F\|x-z\| \Rightarrow \|p(x)-z\| = 0 \Rightarrow p(x) = z$.

**Note de rédaction :** cf. Laurent pour ce qui s'ensuit (fait). cf. OneNote pour le schéma.

**Remarque :** On peut retrouver la formule de la distance d'un point à une droite / plan dans $\mathbb{R}^3$. Prendre une base orthonormée du plan $P$ et $d(x,P) = \|x - \sum_{i=1}^{2}\langle x, e_i\rangle e_i\|$ où $d(x,F) = \inf_{y\in F}\|x-y\|$.

**Remarque :** Si $(e_1,\dots,e_k)$ est une famille libre de $E$. Gram-Schmit définit par récurrence $u_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|}$ et $u_{k+1} = \frac{e_{k+1}-p_i(e_{k+1})}{\|e_{k+1}-p_i(e_{k+1})\|}$, où $p_i$ est la projection orthogonale sur Vect$(u_1,\dots,u_k)$.

## D Suppléments orthogonaux

**Définition :** Soit $E$ un espace euclidien. Soit $F$ un sous-espace vectoriel de $E$.
On note

$$F^\perp = \{x \in E \mid \forall y \in F,\ \langle x,y\rangle = 0\} = \bigcap_{y\in F} ker(x \mapsto \langle x,y\rangle) = \bigcap_{i\in S_k} ker(x \mapsto \langle x,e_i\rangle)$$

où $(e_1,\dots,e_k)$ est une base de $F$. $F^\perp$ est appelé l'**espace orthogonal** de $F$ dans $E$.

**Remarque :** $x \perp F \Leftrightarrow x \in F^\perp$.

**Théorème :**

Soit $E$ un espace euclidien de dimension finie et soit $F$ un sous-espace vectoriel de $E$.
Alors $E = F \oplus F^\perp$ (c'est même une somme directe orthogonale) et $F = (F^\perp)^\perp$.

**Démonstration :**
$F^\perp = kerp$ et $F = Imp$ où $p$ est la projection orthogonale de $E$ sur $F$.
D'où $F^\perp \oplus F = kerp \oplus Imp = E$.
On a $dim(F^\perp)^\perp = dim(E) - dim(F^\perp) = dim(F)$ donc il suffit de montrer une inclusion.
Soit $y \in F^\perp$.
Alors $\forall x \in F,\ \langle y,x\rangle = 0$ (en effet, si $x \in F$ alors $\forall y \in F^\perp,\ \langle y,x\rangle = 0$)
D'où $F \subset (F^\perp)^\perp$, d'où $F^\perp \supset (F^\perp)^\perp$. $\square$

**Corollaire :**

Soit $H$ un hyperplan de $E$. Alors il existe $x_0 \in E$ tel que $H = (Vect(x_0))^\perp$.

**Démonstration :**
Par définition d'un hyperplan, et comme $H^\perp$ est un supplémentaire de $H$, il existe $x_0 \in H^\perp$ tel que $H^\perp = Vect(x_0)$.
Et donc $H = (H^\perp)^\perp = (Vect(x_0))^\perp$. $\square$

**Remarque :** Si $A \subset E$, on définit $A^\perp = \{x \in E : \forall a \in A,\ \langle x,a\rangle = 0\}$.
Alors $A^\perp$ est un sev de $E$ et $A^\perp = (Vect(A))^\perp$.

**Application :** Montrer que $F_1 \subset F2 \Rightarrow F_2^\perp \subset F_1^\perp$.

## III Dual d'espace euclidien

**Théorème de Riesz : Représentation des formes linéaires**

Soit $E$ un espace euclidien. On note $j_E : E \to E^*$ l'application qui à $x$ associe $j_E(x) : y \mapsto \langle x, y\rangle$.
Alors $j_E$ est un isomorphisme d'espace vectoriel de $E$ dans $E^*$.

Autrement dit, $\forall \varphi \in E^*,\ \exists x \in E : \varphi = \langle x, \cdot\rangle$.

**Démonstration :**
$j_E$ est linéaire et $dimE = dimE^*$ et $x \in ker(j_E) \Leftrightarrow \forall y \in E,\ \langle x, y\rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$. $\square$

**Remarque :** Si $\varphi \in E^*, y \in E$ on a le crochet de dualité $\langle \varphi, y\rangle$. Mais aussi si $x$ est tel que $\varphi = \langle x, \cdot\rangle$, on a aussi $\langle x, y\rangle = \langle \varphi, y\rangle$. Donc on peut confondre les deux crochets de dualité. Autrement dit, $\langle j_E(x), y\rangle_{E^*\times E} = \langle x, y\rangle_{E\times E}$ et $j_E$ permet de dire que le crochet de dualité est la même chose que le produit scalaire en identifiant $E$ et $E^*$ de manière canonique.

## IV Cas des $\mathbb{C}$-espaces vectoriels : espaces hermitiens

**Définition :** Soit $E$ un $\mathbb{C}$-espace vectoriel.
Soit $\langle \cdot, \cdot\rangle : E \times E \to \mathbb{C}$ une application.
On dit que $\langle \cdot, \cdot\rangle$ est un **produit scalaire** sur $E$ si :

1. $\forall x, y \in E,\ \langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle}$ (hermitianité)
2. $\forall x \in E\ y \mapsto \langle x, y\rangle$ est $\mathbb{C}$-linéaire (linéarité en la seconde variable)
3. $\forall x \in E,\ \langle x, x\rangle > 0$ si $x \neq 0$ et $\langle x, x\rangle = 0$ si $x = 0$ (positivité)

**Remarque :** Sesquilinéaire : $\forall y \in E \forall x, x' \in E \lambda \in \mathbb{C}\ \langle \lambda x + x', y\rangle = \overline{\lambda}\langle x, y\rangle + \langle x', y\rangle$. $\forall x \in E \forall y, y' \in E \forall \lambda \in \mathbb{C}\ \langle x, \lambda y + y'\rangle = \lambda\langle x, y\rangle + \langle x, y'\rangle$.

**Exemple :** Dans $\mathbb{C}^n$, $x = (x_i)$ et $y = (y_i)$, $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^n \overline{x_i} y_i$ est un produit scalaire (canonique).

**Remarque :** Pour $n = 1$, $x, y \in \mathbb{C}$, $\langle x, y\rangle = \overline{x}y$ est un produit scalaire, et $\langle x, x\rangle = |x|^2$ (module au carré).

**Remarque :**

$$\begin{cases} y \mapsto \langle x, y\rangle \text{ est } \mathbb{C}\text{-linéaire} \\ \forall x, y \in E,\ \langle x, y\rangle = \overline{\langle y, x\rangle} \text{ (hermitianité)} \end{cases} \quad \text{implique que } (x, y) \mapsto \langle x, y\rangle \text{ est sesquilinéaire.}$$

**Remarque :** Dans $\mathcal{C}^0([a,b],\mathbb{C})$, $\langle f,g\rangle = \int_a^b \overline{f}(t)g(t)dt$ est un produit scalaire.

**Définition :** On appelle **espace hermitien** un $\mathbb{C}$-espace vectoriel muni d'un produit scalaire (complexe/hermitien).

**Remarque :** On garde toutes les définitions et propriétés vues pour les espaces euclidiens, en remplaçant le produit scalaire par un produit hermitien et en imposant la finitude de la dimension.

**Attention** La réciproque du même théorème de Pythagore ($\langle x,y\rangle = 0 \Rightarrow \|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$) n'est pas vérifiée dans les espaces hermitiens : il ne permet pas de conclure que $\Im m(\langle x,y\rangle) = 0$ et donc pas que $\langle x,y\rangle = 0$.

**Remarque :** Si $E$ est un espace hermitien, alors $\|x\| = \sqrt{\langle x,x\rangle}$ est bien un norme sur $E$.

**Proposition :**

Si $(e_1,\dots,e_n)$ est une base orthonormée de $E$ un espace hermitien, et on a $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ et $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$, alors :

$$x_i = \langle x, e_i\rangle \text{ et } y_j = \langle y, e_j\rangle \text{ et } \langle x,y\rangle = \sum_{i=1}^n \overline{x_i} y_i$$

**Application :** Proposer une démonstration de l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans les espaces hermitiens.

# Contents

**I Produit scalaire et norme** **1**
A Produit scalaire . . . . . 1
B Normes . . . . . 2

**II Orthogonalité** **3**
A Vecteurs orthogonaux, familles orthogonales et orthonormées . . . . . 3
B Procédé d'orthonormalisation Gram-Schmidt . . . . . 4
C Projections orthogonales . . . . . 5
D Suppléments orthogonaux . . . . . 6

**III Dual d'espace euclidien** **7**

**IV Cas des $\mathbb{C}$-espaces vectoriels : espaces hermitiens** **7**