

Cours 1 : Introduction aux graphes

I Généralités sur les graphes

A Définitions et vocabulaire

Définition : Un **graphe** est un couple $G = (V, E)$ où :

- V est un ensemble fini : l'ensemble des **sommets** de G . On le note aussi $V(G)$,
- E est un ensemble fini de couples d'éléments de V : l'ensemble des **arêtes** de G . On le note aussi $E(G)$.

Remarque : De manière intuitive, un graphe est une collection de points (les sommets) reliés par des lignes (les arêtes).

Exemple : Un réseau social peut être représenté par un graphe où les sommets représentent les utilisateurs et les arêtes représentent les relations d'amitié entre eux.

Note de rédaction : mettre une image d'une représentation graphique

Définition : Une **chaîne** dans un graphe $G = (V, E)$ est une suite de sommets de la forme $(v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_n, v_n)$ où :

- $v_i \in V$,
- $e_i \in E$,
- $e_{i+1} = v_i v_{i+1}$ pour $i = 0, 1, \dots, n-1$.

Vocabulaire : Une **chaîne élémentaire** ou **chemin** est une chaîne ne passant pas deux fois par un même sommet. Un chemin avec n sommets est noté P_n .

Définition : Un graphe est dit **connexe** si pour tout couple de sommets (u, v) , il existe une chaîne reliant u à v .

Définition : Une **composante connexe** d'un graphe est un sous-graphe connexe maximal (par inclusion).

Méthode : Réflexes pour étudier un problème de graphe

1. Trouver le graphe associé au problème.
2. Identifier les sommets et les arêtes.
3. *dans la plupart des cas* : Vérifier si le graphe est connexe.

Définition : Soit $G = (V, E)$ un graphe. On considère l'application :

$$\omega : E \longrightarrow \mathbb{R}$$

qui associe à chaque arête un nombre réel. On appelle ω **la fonction de pondération** du graphe.

Vocabulaire : Un graphe pondéré est un graphe muni d'une fonction de pondération.

Définition : Un **graphe orienté** est un couple (V, A) où V est l'ensemble des sommets et $A \subset \{(u, v) \in V^2 \mid u \neq v\}$ est l'ensemble des arcs. Chaque arc est une paire ordonnée de sommets, indiquant une direction.

Remarque : Sauf mention contraire, tous les graphes considérés dans ce cours sont simples (ni orientés, ni pondérés et sans boucles ni arêtes multiples).

B Sous-graphes

Définition : Soient $G = (V, E)$ et $H = (W, F)$ deux graphes. On dit que :

- H est un **sous-graphe** de G si $W \subseteq V$ et $F \subseteq \binom{W}{2} \cap E$,
- H est un **sous-graphe induit** (et on le note $G[W]$) de G si $W \subseteq V$ et F contient toutes les arêtes de E dont les deux extrémités sont dans W ($F = \binom{W}{2} \cap E$),
- H est un **sous-graphe couvrant** de G si $W = V$ et $F \subseteq E$.

Remarque : $\binom{W}{2} = \{\{u, v\} \mid u, v \in W, u \neq v\}$ est l'ensemble de toutes les paires d'éléments distincts de W . La différence avec V^2 est que $\binom{W}{2}$ ne contient pas les paires ordonnées et ne contient pas les paires avec des éléments identiques.

Proposition : Sous-graphe induit couvrant

Soit $G = (V, E)$. Le sous-graphe couvrant induit par V est G lui-même. En d'autres termes, $G[V] = G$.

C Graphes complets et complémentaires

Définition : Un graphe $G = (V, E)$ est dit **complet** si pour tout couple de sommets distincts $(u, v) \in V^2$, il existe une arête entre u et v . On note le graphe complet sur n sommets par K_n .

Proposition : Caractérisation du graphe complet

Il vient :

$$K_n = (\{1, 2, \dots, n\}, \binom{\{1, 2, \dots, n\}}{2})$$

Proposition : Nombre d'arêtes dans un graphe complet

Le nombre d'arêtes dans un graphe complet à n sommets est donné par la formule :

$$|E(K_n)| = \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2} \in \Theta(n^2)$$

Définition : Soit $G = (V, E)$ un graphe. Le **graphe complémentaire** de G , noté $\overline{G}$, est le graphe défini par :

$$\overline{G} = (V, \binom{V}{2} \setminus E)$$

II Stockage des graphes

A Vocabulaire et conventions

Remarque : Pour les noms de variables, on pose les conventions suivantes :

- V (*vertices*) : l'ensemble des sommets du graphe,
- E (*edges*) : l'ensemble des arêtes du graphe,
- $n = |V|$: le nombre de sommets du graphe,
- $m = |E|$: le nombre d'arêtes du graphe.

Définition : Soient G un graphe, u et v deux sommets de G et e une arête de G . On dit que :


- u et v sont **adjacents** (ou voisins) si $\{u, v\} \in E$,
- e est **incident** à u si $u \in e$,
- les deux éléments de e sont ses **extrémités**,
- le **voisinage** d'un sommet u est l'ensemble des sommets adjacents à u , noté $N_G(u)$,
- les **voisins** de u sont les éléments de $N_G(u)$.

B Matrice d'adjacence

Définition : Soit G un graphe à n sommets. On numérote les sommets $V(G) = \{v_0, v_1, \dots, v_{n-1}\}$. La **matrice d'adjacence** de G , notée $A(G)$, est la matrice carrée $n \times n$ définie par :

$$A(G)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } \{v_i, v_j\} \in E(G) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple : Pour le graphe G suivant :



La matrice d'adjacence est :

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Remarque : La matrice d'adjacence est symétrique pour un graphe non orienté, et sa diagonale est nulle.

C Liste d'adjacence

Définition : Soit G un graphe à n sommets. On numérote les sommets $V(G) = \{v_0, v_1, \dots, v_{n-1}\}$. La **liste d'adjacence** de G est une liste contenant, pour chaque sommet v_i , la liste de ses voisins.

 **Exemple :** Pour le graphe G précédent, la liste d'adjacence L est :

$$\begin{aligned} L[0] &= [1, 2] \\ L[1] &= [0, 2] \\ L[2] &= [0, 1] \end{aligned}$$

D Matrice d'incidence

Définition : Soit G un graphe à n sommets et m arêtes. On numérote les sommets $V(G) = \{v_0, v_1, \dots, v_{n-1}\}$ et les arêtes $E(G) = \{e_0, e_1, \dots, e_{m-1}\}$. La **matrice d'incidence** de G , notée $B(G)$, est la matrice $n \times m$ définie par :

$$B(G)_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } v_i \in e_j \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

 **Remarque :** La somme des éléments de chaque colonne de la matrice d'incidence est toujours égale à 2 pour un graphe simple non orienté.

 **Exemple :** Pour le graphe G précédent, la matrice d'incidence est :

$$B(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

E Algorithme : calcul du degré d'un sommet

 **Vocabulaire :** Le **degré** d'un sommet v , noté $\deg(v)$, est le nombre d'arêtes incidentes à v .

 **Application :** Pour chacune des trois représentations (matrice d'adjacence, liste d'adjacence, matrice d'incidence), proposer un algorithme pour calculer le degré moyen du graphe.

1. Matrice d'adjacence :

 **Note de rédaction :** cf. cours

2. Liste d'adjacence :

Listing 1: Calcul du degré moyen à partir de la liste d'adjacence (**naïf**)

```

1 def degre_moyen (L):
2     if (len(L) == 0):
3         return -1
4
5     sum_degre = 0
6     for i in range len(L):
7         sum_degre += len(L[i])
8     return sum_degre/len(L)
```

3. Matrice d'incidence :

 **Note de rédaction :** cf. cours

Théorème : Somme des degrés

Soit $G = (V, E)$ un graphe simple non orienté à n sommets et m arêtes. Alors :

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$$

Preuve : Soit S la somme de tous les éléments de la matrice d'incidence de G .

La somme de chaque ligne est égale au degré du sommet correspondant, donc $S = \sum_{v \in V} \deg(v)$.

La somme de chaque colonne est égale à 2, car chaque arête a exactement deux extrémités, donc $S = 2m$.

Ainsi, $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m$.

Corollaire : Parité du degré

Soit $G = (V, E)$ un graphe. Alors :

$$\sum_{v \in V} \deg(v) \in 2\mathbb{N}$$

Autrement dit, le nombre de sommets de degré impair dans un graphe est pair.

💡 **Exemple :** Sept personnes se serrent la main. Il n'est pas possible que chacun d'entre eux serre la main exactement trois fois (et même un nombre impair de fois). En effet, si chacun serre la main trois fois, le nombre total de poignées de main serait $7 \times 3 = 21$, ce qui est impair. Or, d'après le corollaire précédent, le nombre total de poignées de main doit être pair.

F Analyse de complexité

Définition : La **complexité temporelle** (dans le pire cas) d'un algorithme A , noté $T(n)$, est le nombre d'opérations élémentaires maximum que puisse effectuer A avant d'arriver à un résultat, étant donné une entrée de taille N .

✗ **Attention** ✗ Pour un graphe, on compte la complexité en fonction de n et m (respectivement le nombre de sommets et d'arêtes), et non pas en fonction de la taille de la représentation du graphe.

Proposition :

Soit G un graphe connexe. Alors :

$$m \geq n - 1$$

Preuve : Partons du graphe sans arête sur les mêmes n sommets : il possède n composantes connexes. Ajouter une arête réduit ce nombre d'au plus 1. Comme G n'a qu'une seule composante, il faut donc au moins $n - 1$ arêtes.

Contents

I	Généralités sur les graphes	1
A	Définitions et vocabulaire	1
B	Sous-graphes	2
C	Graphes complets et complémentaires	2
II	Stockage des graphes	3
A	Vocabulaire et conventions	3
B	Matrice d'adjacence	3
C	Liste d'adjacence	3
D	Matrice d'incidence	4
E	Algorithme : calcul du degré d'un sommet	4
F	Analyse de complexité	5

Crédits

Ce cours est inspiré des slides de cours de l'Université Paris Cité réalisés par Mónika Csikós et Mikäel Rabie. Assurez-vous de citer correctement la source si vous utilisez ce cours dans vos travaux.

Ce cours est mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons  **Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International**. Pour voir une copie de cette licence, visitez <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.