

Chapitre 2 : Groupes quotients

I Ensembles quotients par une relation d'équivalence

A Relations d'équivalence et classes d'équivalence

Définition : Soit E un ensemble et R une relation sur E , où l'on note xRy si $(x, y) \in R$. On dit que R est une **relation d'équivalence** si elle est réflexive, symétrique et transitive.

Exemple : $=$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$

Définition : Soit R une relation d'équivalence sur E . Pour $x \in E$, on appelle **classe d'équivalence** de x et on note $\bar{x}$ (ou $[x]_R$, $cl_R(x)$ ou $x + k\mathbb{Z}$) l'ensemble $\{y \in E \mid xRy\}$.

Remarque : C'est tout simplement l'ensemble des éléments de E qui sont en relation avec x par R .

Exemple : Soit $x \in \mathbb{R}$. La classe d'équivalence de x pour la relation d'équivalence $=$ est $\bar{x} = \{y \in \mathbb{R} \mid x = y\} = \{x\}$.

Définition : Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de parties de E . On dit que cette famille est une **partition** de E si :

- $E = \bigcup_{i \in I} F_i$ (la réunion des F_i est E).
- $\forall i, j \in I, i \neq j \Rightarrow F_i \cap F_j = \emptyset$ (les F_i sont deux à deux disjointes).

Illustration : On peut reprendre l'idée intuitive d'un univers en probabilités :




Figure 1: Partition de Ω en A_1, A_2, A_3, A_4

Proposition :

Les classes d'équivalence d'une relation d'équivalence R forment une partition de E .

Preuve:

- Les classes sont non vides.
- Deux classes différentes sont disjointes (elles n'ont pas d'élément en commun).
- L'union des classes est E . $\square$

Remarque : Cela implique que si deux classes d'équivalence ont un élément en commun, alors elles sont égales.

Proposition :

Soit $(F_i)_{i \in I}$ une partition de E . On peut définir une relation d'équivalence R sur E par : $xRy \Leftrightarrow \exists i \in I : x, y \in F_i$. Alors R est d'équivalence.

Preuve:

- **Réflexivité** : Soit $x \in E$. Par définition de partition, $\exists i \in I$ tel que $x \in F_i$. Donc xRx .
- **Symétrie** : Soient $x, y \in E$ tels que xRy . Par définition de R , $\exists i \in I$ tel que $x, y \in F_i$. Donc $y, x \in F_i$ et ainsi yRx .
- **Transitivité** : Soient $x, y, z \in E$ tels que xRy et yRz . Par définition de R , $\exists i, j \in I$ tels que $x, y \in F_i$ et $y, z \in F_j$. Comme $y \in F_i$ et $y \in F_j$, on a $F_i \cap F_j \neq \emptyset$. Par définition de partition, on en déduit que $i = j$. Donc $x, z \in F_i$ et ainsi xRz . $\square$

B Ensemble quotient d'une relation d'équivalence

Définition : Soit R une relation d'équivalence sur E .

On appelle **ensemble quotient** de E par R et on note E/R l'ensemble des classes d'équivalence de R .
i.e. $E/R = \{\bar{x} \mid x \in E\}$.

Proposition : Bijection de l'application quotient

Soit R une relation d'équivalence sur E .

L'application $\pi : \begin{matrix} E \rightarrow E/R \\ x \mapsto \bar{x} \end{matrix}$ est une surjection.

 **Vocabulaire :** On appelle π l'**application quotient** de E par R .

Définition : Soit $S \subseteq E$. On dit que S est un **système de représentants** pour R si pour toute classe C de R , il existe un unique élément dans $S \cap C$.

De manière équivalente, S est un système de représentants si $\pi|_S : S \rightarrow E/R$ est une bijection.

C Passage au quotient et décomposition canonique

Dans cette section, on note π_E l'application quotient de E par R .

Définition : Soit $f : E \rightarrow F$ une application sur deux ensembles E et F quelconques.

On dit que f **passse au quotient** ou que f est **constante sur les classes d'équivalence de R** si $\forall x, y \in E$ avec $xRy \Rightarrow f(x) = f(y)$.

 **Exemple :** Si R est la relation d'équivalence $=$ sur $\mathbb{R}$, alors une application $f : \mathbb{R} \rightarrow F$ passe au quotient si et seulement si f est constante.

Définition : Soit f une application de E vers F constante sur les classes d'équivalence de R .

On appelle l'**application déduite de f par passage au quotient** l'application $\bar{f} : \begin{matrix} E/R \rightarrow F \\ \bar{x} \mapsto f(x) \end{matrix}$.

Proposition :

Soit $f : E \rightarrow F$ une application, et soit R une relation d'équivalence sur E . On note R_f la relation d'équivalence définie par $xR_f y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$.

1. f est constante sur les classes d'équivalence de R si et seulement si $\forall x, y \in E, xRy \Rightarrow xR_f y$.
2. L'application $\bar{f} : E/R_f \rightarrow F$ est bien définie et est injective.
3. Réciproquement, si f est constante sur les classes d'équivalence de R , alors il $\bar{f} : E/R \rightarrow F$ est injective si et seulement si $\forall x, y \in E, xRy \Leftrightarrow xR_f y$.

Définition : Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

Alors $f = \bar{f} \circ \pi_E$ avec $\bar{f} : E/R_f \rightarrow F$ injective et $\pi_E : E \rightarrow E/R_f$ l'application quotient de E par R_f surjective. On dit que cette décomposition est la **décomposition canonique** de f (car elle ne dépend que de f).

Proposition : Décomposition canonique (admis)

Soit $f : E \rightarrow F$ une application. f se décompose de façon **canonique** en $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$ avec $\pi : E \rightarrow E/R_f$ la projection canonique (surjective), $\bar{f} : E/R_f \rightarrow f(E)$ définie par $\bar{f}(\text{cl}_{R_f}(x)) = f(x)$ bijective et $j : f(E) \rightarrow F$ l'inclusion canonique d'ensembles.

Exemple : Soit l'application $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ définie par $f(x) = x \pmod{3}$ (qui à chaque entier associe son reste dans la division euclidienne par 3).

- L'ensemble de départ est $E = \mathbb{Z}$ et l'ensemble d'arrivée est $F = \mathbb{Z}$.
- L'ensemble image est $f(E) = \{0, 1, 2\}$.
- La relation d'équivalence associée est $xR_f y \iff x \equiv y \pmod{3}$. L'ensemble quotient E/R_f est donc $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{\text{cl}(0), \text{cl}(1), \text{cl}(2)\}$.

La décomposition $f = j \circ \bar{f} \circ \pi$ se traduit ainsi :

1. $\pi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ associe à chaque entier sa classe de congruence (projection surjective).
2. $\bar{f} : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \rightarrow \{0, 1, 2\}$ associe à chaque classe le reste correspondant : $\bar{f}(\text{cl}(x)) = x \pmod{3}$ (bijection).
3. $j : \{0, 1, 2\} \rightarrow \mathbb{Z}$ prend ce reste et le voit comme un entier dans l'ensemble d'arrivée général (injection/inclusion).

II Relations d'équivalence associées à un sous-groupe

Vocabulaire : Soient A et B deux sous-ensembles (parties) d'un groupe $(G, *)$. On note AB (ou $A * B$ si on veut éviter une confusion) le sous-ensemble de G défini par

$$AB := \{a * b, a \in A, b \in B\}$$

On s'autorise si $A = \{a\}$ à écrire aB (et de même pour B).

Proposition : Classes de sous-groupes (admis)

Soit G un groupe et soit $H \subset G$ un sous-groupe. Sur G on définit deux relations, notées $\equiv_g$ et $\equiv_d$ par

$$x \equiv_g y \iff x^{-1} * y \in H \iff xH = yH$$

$$x \equiv_d y \iff y * x^{-1} \in H \iff Hx = Hy$$

Les relations $\equiv_g$ et $\equiv_d$ sont des relations d'équivalence. La classe de x pour $\equiv_g$ est xH . La classe de x pour $\equiv_d$ est Hx .

Démonstration :

On fait la démonstration pour $\equiv_g$ (pour $\equiv_d$ c'est exactement la même). On montre en premier lieu que $x^{-1} * y \in H \iff xH = yH$. Si $xH = yH$ alors comme l'élément $y * e_G$ appartient à yH , il doit aussi appartenir à xH . Donc il existe $h \in H$ tel que $x * h = y$. Donc $x^{-1} * y = h \in H$. Supposons $x^{-1} * y \in H$ et montrons $xH = yH$. Prenons $y * h, h \in H$ un élément de yH . Alors $(x^{-1} * y) * h$ est dans H car $x^{-1} * y \in H$ et $h \in H$ et H est un sous-groupe de G . Donc $y * h = x * (x^{-1} * y * h) \in xH$. On vient de montrer $yH \subset xH$. On montre de même $xH \subset yH$ en remarquant que si $x^{-1} * y \in H$ alors son symétrique $(x^{-1} * y)^{-1} = y^{-1} * x \in H$, puisque H est un sous-groupe de G .

Pour tous $x, y, z \in G$ on a :

- $xH = xH$, donc la relation est réflexive ;
- $xH = yH \implies yH = xH$, donc la relation est symétrique ;
- $(xH = yH \text{ et } yH = zH) \implies xH = zH$, donc la relation est transitive.

Enfin montrons que $\text{cl}_{\equiv_g}(x) = xH$. On a : $y \equiv_g x$ si et seulement si il existe $h \in H$ tel que $x^{-1} * y = h$, si et seulement si il existe $h \in H$ tel que $y = x * h$, si et seulement si $y \in xH$. $\square$

Définition : On note G/H l'ensemble quotient par la relation $\equiv_g$ et $H \backslash G$ l'ensemble quotient par la relation $\equiv_d$. G/H est l'ensemble des **classes à gauche modulo H** et $H \backslash G$ l'ensemble des **classes à droite modulo H** . On notera $\pi : G \rightarrow G/H$ la projection canonique.

Lemme : Bijections des classes (admis)

Fixons $x \in G$. Les applications $l_x : H \rightarrow xH$ et $r_x : H \rightarrow Hx$ définies par $l_x(h) = x * h$ et $r_x(h) = h * x$ sont des bijections.

Démonstration :

On fait la démonstration pour l_x . L'application est surjective. Montrons qu'elle est injective. Supposons $l_x(h) = l_x(k)$ alors $x * h = x * k$ et en multipliant à gauche par x^{-1} on obtient $h = k$. $\square$

Exemple : Pour $H = \{e_G\}$, on a $xH = Hx = \{x\}$, donc $G/H = H \backslash G$ et la projection canonique $G \rightarrow G/H$ est bijective.

Pour $H = G$, on a $xH = Hx = G$, donc $G/H = H \backslash G = \{G\}$.

Remarque : Si $(G, \star)$ est un groupe abélien et H un sous-groupe de G ,

$$\forall x, y \in G, \quad x \equiv_g y \iff x \equiv_d y \iff xH = yH \iff Hx = Hy$$

Si l'on utilise la notation additive $(G, +)$ on a

$$\forall x, y \in G, \quad x \equiv_g y \iff x - y \in H \iff x + H = y + H$$

Théorème : Théorème de Lagrange (admis)

Soit $(G, \star)$ un groupe fini et soit H un sous-groupe de G . On a :

$$|G| = |H| \times |G/H| = |H| \times |H \backslash G|$$

En particulier, le nombre d'éléments de H divise le nombre d'éléments de G .

Démonstration :

Comme les classes d'équivalence forment une partition de G , on a $|G| = \sum_{A \in G/H} |A|$. Pour $x \in G$, la classe de x est xH en bijection avec H (par le lemme). Donc toutes les classes d'équivalence ont $|H|$ éléments, ce qui permet de conclure. $\square$

Vocabulaire : Lorsque G/H est fini, son nombre d'éléments s'appelle l'**indice** de H dans G et se note $[G : H]$. Si G/H est infini, on dit que l'indice de H dans G est infini.

III Application du théorème de Lagrange

Corollaire : (*admis*)

Soit $(G, *)$ un groupe fini. Si l'ordre de G est premier, alors G est cyclique et engendré par n'importe quel élément de G différent de l'élément neutre.

Exemple : Soit p un nombre premier. Alors $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$ est un groupe cyclique d'ordre p engendré par $\bar{1}$.

Proposition : (*admis*)

Soit $(G, *)$ un groupe et soient $x, y \in G$.

Supposons x, y d'ordres finis $\omega(x)$ et $\omega(y)$ et que $\omega(x)$ et $\omega(y)$ sont premiers entre eux. Alors :

1. $\langle x \rangle \cap \langle y \rangle = \{e_G\}$,
2. Si de plus $x * y = y * x$, alors $\omega(x * y) = \omega(x)\omega(y)$ et $\langle x * y \rangle = \langle \{x, y\} \rangle = \langle x \rangle \times \langle y \rangle$.

IV Groupe quotient

🗨 **Note de rédaction :** non rédigé, fin page 19 du poly de DL3

V Congruences

A Rappels et généralités

Définition : Soit $k \in \mathbb{Z}$. On pose la relation $\equiv_k$ sur $\mathbb{Z}$ définie par : $x \equiv_k y \Leftrightarrow y - x \in k\mathbb{Z}$ (i.e. k divise $y - x$). On écrit aussi $x \equiv y[k]$. i.e. $\exists n \in \mathbb{Z}, y - x = kn$.

 Vocabulaire : $\equiv_k$ est appelée **congruence modulo k** .

Proposition : Equivalence

$\equiv_k$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Preuve:

[illegible]

Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

On a que $\mathbb{Z}/\equiv_k = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{k-1}\}$ noté $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$.

En particulier, $\{0, 1, 2, \dots, k-1\}$ est un système de représentants pour $\equiv_k$.

Preuve:

Soit $x \in \mathbb{Z}$.

Par la division euclidienne, $\exists!(q, r) \in \mathbb{Z} \times \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$ tel que $x = kq + r$. Donc $x - r = kq \in k\mathbb{Z}$ et ainsi $x \equiv_k r$.

Il reste à voir que $\overline{i} \neq \overline{j}$ si $i \neq j$ avec $i, j \in \{0, 1, 2, \dots, k-1\}$.

En effet, $i - j \in \{1 - k, 2 - k, \dots, -1, 1, 2, \dots, k-1\}$ et $i - j \neq 0$.


Donc $i - j \notin k\mathbb{Z}$ et ainsi $i \not\equiv_k j$ donc $\overline{i} \neq \overline{j}$. $\square$

Lemme :

Soient $x, y \in \mathbb{Z}$.


Considérons $\overline{x+y} \in \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$. Alors $\overline{x+y}$ ne dépend que de $\overline{x}$ et $\overline{y}$.

Autrement dit : $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, x \mapsto \overline{x+y}$ et $y \mapsto \overline{x+y}$ passent au quotient.

Preuve:**Théorème :** $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

On a que $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien.

Preuve:



Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

Le groupe $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est le groupe des entiers modulo k .

Proposition : $\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$

Le groupe $(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}, +)$ est cyclique et engendré par $\bar{1}$.

Preuve:

Le sous-groupe engendré par $\bar{1}$ est $\{\bar{n} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\overline{n \cdot 1} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}/k\mathbb{Z}$. $\square$

Contents

I	Ensembles quotients par une relation d'équivalence	1
A	Relations d'équivalence et classes d'équivalence	1
B	Ensemble quotient d'une relation d'équivalence	2
C	Passage au quotient et décomposition canonique	2
II	Relations d'équivalence associées à un sous-groupe	3
III	Application du théorème de Lagrange	5
IV	Groupe quotient	5
V	Congruences	5
A	Rappels et généralités	5