


Mardi 25 octobre 2016; Durée: 13h30 à 15h20

Aucune documentation permise; une calculatrice permise

Problème 1 (28 points sur 100)

Trouvez la transformée de Fourier de la fonction périodique suivante :



$$f_p(t) = \begin{cases} 1 & -1 < t < 0 \\ -1 & 0 < t < 1 \end{cases}$$

$$f_p(t) = f_p(t - 5n) \text{ pour tout } n$$

Problème 2 (28 points sur 100)

- (12 points) Trouvez la transformée de Fourier de $\text{Tri}(t-2)$. Tracez son spectre d'amplitude et son spectre de phase.
- (12 points) Trouvez la transformée de Fourier de $\sin(50t)\text{Tri}(t)$. Tracez son spectre d'amplitude et son spectre de phase.
- (4 points) Trouvez la transformée de Fourier de la première dérivée de la fonction $\text{Tri}(t)$.

Problème 3 (24 points sur 100)

En sachant que $\delta_{T_0}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_0)$

- Donnez une esquisse de $f(t) = \delta_2(t) \cdot \text{Rect}\left(\frac{t}{3}\right)$ et trouvez sa transformée de Fourier.
- Donnez une esquisse de $g(t) = \delta_1(t) \cdot \text{Rect}\left(\frac{t}{3}\right)$ et trouvez sa transformée de Fourier.
- Donnez une esquisse de $h(t) = \delta_{2/3}(t) \cdot \text{Rect}\left(\frac{t}{3}\right)$ et trouvez sa transformée de Fourier.

Problème 4 (20 points sur 100)

Trouvez la transformée de Fourier de la fonction $f(t) = \frac{1}{t^2}$.

fonction temporelle	transformée
$\text{Rect}(t/\tau)^{(1)}$	$\tau \text{Sa}(\omega\tau/2)$
$\text{Tri}(t/\tau)^{(2)}$	$\tau \text{Sa}^2(\omega\tau/2)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{j\omega_0 t}$	$2\pi\delta(\omega - \omega_0)$
$U(t)$	$1/j\omega + \pi\delta(\omega)$
$\text{Sgn}(t)$	$2/j\omega$
$\delta_{T_0}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT_0)$	$\omega_0 \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$
$e^{-\beta t} U(t)$	$\frac{1}{\beta + j\omega}$
$e^{-\beta t }$	$\frac{2\beta}{\beta^2 + \omega^2}$
$\delta'(t)$	$j\omega$
$\delta''(t)$	$(j\omega)^2$

domaine temporelle	domaine fréquentiel
$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega$	$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$
$f(t)$	$F(\omega)$
$F(t)$	$2\pi f(-\omega)$
$f(t+a)$	$e^{ja\omega} F(\omega)$
$e^{jbt} f(t)$	$F(\omega - b)$
$f(at)$	$\frac{1}{ a } F\left(\frac{\omega}{a}\right)$
$t^n f(t)$	$(j)^n \frac{d^n}{d\omega^n} F(\omega)$
$\frac{d^n}{dt^n} f(t)$	$(j\omega)^n F(\omega)$
$f(t)$ pas continue	décroissance $1/\omega$
$f(t)$ continue $f'(t)$ pas continue	décroissance $1/\omega^2$
$f(t), f'(t)$ continue $f''(t)$ pas continue	décroissance $1/\omega^3$
$E = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) ^2 dt$	$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) ^2 d\omega$

¹ $\text{Rect}\left(\frac{t-t_0}{\tau}\right)$ rectangle de hauteur un, centré sur $t=t_0$, et de longueur τ .

² $\text{Tri}\left(\frac{t-t_0}{\tau}\right)$ triangle de hauteur un, centré sur $t=t_0$, avec une base de longueur 2τ .

$f(t) \Leftrightarrow F(\omega) = TF\{f(t)\}$ $F(\omega) = A(\omega) + jB(\omega) = F(\omega) e^{j\text{Arg}(\omega)}$ $E(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) ^2$	
fonction réelle en temps	
$f(t)$ réelle $\Leftrightarrow F^*(\omega) = F(-\omega)$	
paire	impaire
$A(\omega) = \text{Re } F(\omega)$	$B(\omega) = \text{Im } F(\omega)$
$ F(\omega) $	$\text{Arg } F(\omega)$
$f(t) = f_{\text{paire}}(t) + f_{\text{impaire}}(t)$	
$f_{\text{paire}}(t) \Leftrightarrow \text{Re } F(\omega)$	$f_{\text{impaire}}(t) \Leftrightarrow \text{Im } F(\omega)$

fonction delta, etc.
$f_p(t) \Leftrightarrow 2\pi \sum_{n=-\infty}^{+\infty} F_{\text{Série}}(n) \delta(\omega - n\omega_0)$ $f_p(t) \text{ périodique avec période } T_0, T_0\omega_0 = 2\pi$ $F_{\text{Série}}(n) = \frac{1}{T_0} \cdot F_r(\omega) \Big _{\omega=n\omega_0}, f_r(t) = \begin{cases} f_p(t) & -\frac{T_0}{2} < t < \frac{T_0}{2} \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$
$f'(a) = \left[\lim_{t \rightarrow a^+} f(t) - \lim_{t \rightarrow a^-} f(t) \right] \delta(t-a)$ $t=a \text{ est un point de discontinuité de } f(t)$
$h(t) \delta(t-t_0) = h(t_0) \delta(t-t_0)$ <p>propriété d'échantillonnage</p>
$x_0 \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - nx_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-j2\pi nx/x_0}$

$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax}$	$\int x \cos ax dx = \frac{1}{a^2} \cos ax + \frac{x}{a} \sin ax$
$\int e^{bx} \sin ax dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{bx} (b \sin ax - a \cos ax)$	$\int x e^{ax} dx = \left(\frac{x}{a} - \frac{1}{a^2} \right) e^{ax}$
$\int e^{bx} \cos ax dx = \frac{1}{a^2 + b^2} e^{bx} (a \sin ax + b \cos ax)$	$\int x^2 e^{ax} dx = \left(\frac{x^2}{a} - \frac{2x}{a^2} + \frac{2}{a^3} \right) e^{ax}$
$\cos x = \frac{e^{jx} + e^{-jx}}{2}$	$e^{jx} = \cos x + j \sin x$
$\sin x = \frac{e^{jx} - e^{-jx}}{2j}$	$e^{jn\pi} = (-1)^n$
$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} [1 + \cos 2\theta]$	$\cos \theta = \sin(\pi/2 - \theta)$