

EXAMEN PARTIEL 2

MAT-18996: analyse numérique pour l'ingénieur
Date: 29 avril, 18h30-20h20.

Hiver 2008

Remarques:

- 1) Documents admis: deux feuilles $8\frac{1}{2} \times 11$, recto-verso.
- 2) Seulement les calculatrices avec l'auto-collant de la Faculté seront admises.
- 3) Vous pouvez répondre aux questions dans l'ordre de votre choix, mais identifiez clairement les questions.
- 4) Pour chaque question on fournira le détail des calculs et du raisonnement. En l'absence de ces détails, une solution sera considérée comme nulle.
- 5) Déposez votre carte d'identité avec photo sur le coin de votre table.

Voici un extrait d'une table de noeuds et de poids des quadratures de Gauss.

n	Noeuds	Poids
2	-0.57735	1
	0.57735	1
3	-0.77460	0.55556
	0	0.88889
	0.77460	0.55556
4	-0.86114	0.34785
	-0.33998	0.65215
	0.33998	0.65215
	0.86114	0.34785
5	-0.90618	0.23693
	-0.53847	0.47863
	0	0.56889
	0.53847	0.47863
	0.90618	0.23693

Question 1. (4 + 4 + 4 + 4 points)

Répondre à chacune des questions suivantes. Justifier dans chacun des cas mais **les réponses doivent être brèves**.

- (a) Quel est le nombre minimal de points de Gauss pour intégrer exactement

$$\int_1^2 x^8 - 2x^4 + 3x + 5 dx$$

par la formule de quadrature de Gauss?

- (b) Selon le terme d'erreur de la formule centrée pour la dérivée première $f'(x_0)$, déterminer le degré d'exactitude de cette formule, i.e. déterminer le plus haut degré du polynôme rendant la formule exacte.
- (c) L'expression $S(x) = x^3$ est-elle l'équation de la spline naturelle qui interpole les points $(-1, -1), (0, 0), (1, 1)$?
- (d) L'expression $S(x) = x$ est-elle l'équation de la spline naturelle qui interpole les points $(-1, -1), (0, 0), (1, 1)$?

Question 2. (4 + 6 + 6 points)

La longueur L de l'arc d'un ellipse de demi-axes a et b est donnée par la formule

$$L = 4a E(m)$$

où m correspond au rapport

$$m = \frac{a^2 - b^2}{a^2}$$

et $E(m)$ est l'évaluation d'une certaine intégrale dite elliptique en fonction de m . On dispose d'une table de quelques valeurs de la fonction $E(m)$.

m	$E(m)$
0.0	1.571
0.1	1.531
0.2	1.489
0.3	1.445
0.4	1.399
0.5	1.351

On désire utiliser cette table pour estimer L avec $a = 5$ et $b = 4$.

- a) Quels points avez-vous avantage à utiliser dans le cas de l'interpolation quadratique (polynôme de degré 2)? Justifier votre réponse.
- b) Déterminer le polynôme d'interpolation quadratique, basé sur les noeuds de la sous-question (a), pour approximer $E(m)$ et estimer la valeur de L en $a = 5$ et $b = 4$.
- c) Estimer l'erreur d'interpolation commise en (b) en utilisant la table ci-dessus pour approximer L .

Question 3. (4 + 6 + 6 + 4 points)

On désire résoudre l'équation différentielle suivante:

$$\begin{cases} y'(t) &= t y(t), \\ y(0) &= 2. \end{cases}$$

- a) Montrer que la solution exacte de cette équation différentielle est donnée par

$$y(t) = 2 e^{t^2/2}.$$

Pour les sous-questions b) et c), on prendra $h = 0.1$ et $t_n = nh$ pour $n = 0, 1, 2, \dots$

- b) Evaluer les approximations y_1 et y_2 fournies par la méthode de Taylor d'ordre 2.
- c) Evaluer les approximations y_1 et y_2 fournies par la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 (méthode du point milieu).
- d) Comparer vos résultats avec la solution exacte au point t_2 .

Question 4. (4 + 4 + 4 points)

Une expérience a produit les résultats suivants:

x	$f(x)$
0.8	0.5272
0.9	0.4448
1.0	0.3678
1.1	0.2981
1.2	0.2369

a) En utilisant la formule de la différence centrée, calculer une approximation de $f'(1)$ et de $f'(1.1)$.

b) Sachant que l'on peut approximer f'' avec la formule de différence avant suivante:

$$f''(x_i) \simeq \frac{f'(x_{i+1}) - f'(x_i)}{h}$$

utiliser les réponses obtenues à la sous-question a) pour obtenir une approximation de $f''(1)$.

c) Sans faire les calculs, proposer une autre formule vue au cours pour améliorer la précision de $f''(1)$. Justifier.

Question 5. (4 + 8 + 8 points)

Soit $f(x) = \cos(2x) + \sin(x)$.

- (a) Calculer une approximation de I pour $h = \frac{\pi}{4}$ à l'aide de la formule de Simpson composée.
- (b) Calculer une approximation de I en utilisant la formule de quadrature de Gauss à 4 points.
- (c) Déterminer combien de noeuds suffisent pour que la formule de Simpson composée (également appelée *Simpson 1/3*) donne une approximation de

$$I = \int_0^\pi f(x) dx$$

avec une erreur inférieure à 10^{-3} .

Question 6. (10 + 6 points)

On considère l'intégrale

$$I = \int_1^2 \ln x dx.$$

- (a) Quel pas h doit-on prendre pour que l'erreur en valeur absolue soit inférieure à 10^{-6} si on utilise la formule du trapèze composée?
- (b) Est-ce que la valeur fournie par la méthode du trapèze composée est supérieure ou inférieure à la valeur exacte de I ? Répondre à la question sans utiliser la valeur exacte de l'intégrale ci-dessus.