

Corrigé Mini 1 H2012


Question 1.

$$x^* = 1.0161468, \quad \Delta x = 0.43 \times 10^{-3}$$

a) On a

$$0.5 \times 10^{-4} \leq \Delta x \leq 0.5 \times 10^{-3}$$

alors selon la convention vue en classe, le chiffre significatif « le plus à droite » correspond à la puissance -3 des dizaines :


$$\begin{array}{cc} 10^0 & 10^{-3} \\ \downarrow & \downarrow \\ 1.0161468 \end{array}$$

seul 1.016 sont significatifs ce qui fait 4 chiffres significatifs.

b) Si on veut une représentation en virgule flottante à 3 chiffres avec arrondi pour remplir la mantisse alors on aura

$$fl(x^*) = fl(1.016468) = fl(0.1016468 \times 10^1) = 0.102 \times 10^1$$

Question 2.

$$f(x) = e^x + \sin x \quad x \in [0,1]$$

a) Pour le polynôme de Taylor de degré 2, avec $x_0 = 0$, il nous faut :

$$f(x_0) = f(0) = 1$$

$$f'(x) = e^x + \cos x \rightarrow f'(x_0) = f'(0) = 2$$

$$f^{(2)}(x) = e^x - \sin x \rightarrow f^{(2)}(x_0) = f^{(2)}(0) = 1$$

Et pour le terme d'erreur

$$f^{(3)}(x) = e^x - \cos(x)$$

On sait que

$$p_2(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2} f^{(2)}(x_0) = 1 + 2x + \frac{x^2}{2}$$

Version « **super!** »

b) On remarque que le terme suivant qui serait utilisé pour le polynôme de degré 3 est nul

$$f^{(3)}(x_0) = f^{(3)}(0) = 0$$

Donc le polynôme de degré 3 coïncide avec le polynôme de degré 2! Le terme d'erreur du polynôme $p_2(x)$ est donc

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!} (x - x_0)^4 = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!} x^4$$

Avec $\xi_x \in [0, x]$ car $x \in [0, 1]$. On a

$$f^{(4)}(\xi_x) = e^{\xi_x} + \sin \xi_x$$

Puisque e^x est croissante et $\sin x$ est croissante sur $[0, x]$ et $x \leq 1$ on a

$$f^{(4)}(\xi_x) = e^{\xi_x} + \sin \xi_x \leq e^x + \sin x \leq e + \sin 1 \approx 3.56$$

D'où

$$R_3(x) \leq \frac{e^x + \sin x}{24} x^4 \leq \frac{3.56}{24} x^4 \approx 0.15x^4$$

Et on peut dire que l'erreur est d'ordre 4 au maximum.

Version « **normale** »

b) Un polynôme de Taylor de degré 2 est au minimum d'ordre 3, car le terme d'erreur est

$$R_2(x) = \frac{f^{(3)}(\xi_x)}{3!} (x - x_0)^3 = \frac{f^{(3)}(\xi_x)}{3!} x^3$$

Avec $\xi_x \in [0, x]$ car $x \in [0, 1]$. On a

$$f^{(3)}(\xi_x) = e^{\xi_x} - \cos \xi_x$$

Puisque e^x est croissante et $-\cos x$ est croissante sur $[0, x]$ et $x \leq 1$ on a

$$f^{(3)}(\xi_x) = e^{\xi_x} - \cos \xi_x \leq e^x - \cos x \leq e - \cos 1 \approx 2.17$$

D'où

$$R_2(x) \leq \frac{e^x - \cos x}{6} x^3 \leq \frac{2.17}{6} x^3 \approx 0.36x^3$$

c) voir **b)**!

d) En utilisant **a)** on a

$$f(0.1) \approx p_2(0.1) = 1 + 2(0.2) + \frac{(0.1)^2}{2} = 1.205$$

En utilisant la calculatrice comme référence, on a

$$E_a(p_2(0.1)) = |p_2(0.1) - f(0.1)| \approx 4.334722475 \times 10^{-6}$$

$$E_r(p_2(0.1)) = \frac{E_a(p_2(0.1))}{|f(0.1)|} \approx 3.597267122 \times 10^{-6}$$

e) En utilisant l'erreur absolue, on a

$$E_a(p_2(0.1)) \approx 0.4334722475 \times 10^{-5} \leq 0.5 \times 10^{-5}$$

Donc par convention le chiffre significatif « le plus à droite » correspond à la puissance -5 des dizaines :

$$p_2(0.1) = 1.20500$$

Où tous les chiffres sont significatifs ce qui fait 6 chiffres significatifs.

Bonus

Ici on nous laisse le choix d'arrondir ou de tronquer.

Si on a pris l'arrondi. On doit respecter l'ordre de priorité des parenthèses! Alors

$$\begin{aligned}(x + y) &\rightarrow fl(fl(x) + fl(y)) = fl(0.324 \times 10^3 + 0.754 \times 10^3) = fl(1.078 \times 10^3) = 0.108 \times 10^4 \\(x + y) + z &\rightarrow fl(0.108 \times 10^4 + 0.219 \times 10^2) = fl(0.108 \times 10^4 + 0.002 \times 10^4) = 0.110 \times 10^4\end{aligned}$$

Si on a pris la troncature. On doit respecter l'ordre de priorité des parenthèses! Alors

$$\begin{aligned}(x + y) &\rightarrow fl(fl(x) + fl(y)) = fl(0.324 \times 10^3 + 0.754 \times 10^3) = fl(1.078 \times 10^3) = 0.107 \times 10^4 \\(x + y) + z &\rightarrow fl(0.107 \times 10^4 + 0.219 \times 10^2) = fl(0.107 \times 10^4 + 0.002 \times 10^4) = 0.109 \times 10^4\end{aligned}$$