

1.11

정의에 의해

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad \text{이다. 전개하면,}$$

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i^2 - 2y_i\bar{y} + \bar{y}^2) \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n y_i^2 + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (-2y_i\bar{y}) + \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n \bar{y}^2 \quad ((\text{c}) \text{에 의해}) \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{2\bar{y}}{n-1} \sum_{i=1}^n y_i + \frac{n}{n-1} \bar{y}^2 \quad ((\text{b}), (\text{b}) \text{에 의해}) \end{aligned}$$

이때, $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ 라는 점에 착안하여,

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n y_i^2 - \left\{ \frac{2}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n y_i \right) + \frac{n}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2 \right\} \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n y_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n y_i \right)^2 \right] \quad \text{이 된다.}$$

1.22

정의에 의해, $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ 이다. 정리하면 $n\bar{y} = \sum_{i=1}^n y_i$ 이다.

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) = \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n \bar{y} = n\bar{y} - n\bar{y} = \textcircled{0} \quad \text{으로, } \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y}) = 0 \quad \text{이다.}$$

1.27

Bell shape의 분포를 지니고, \bar{y} 와 S 값이 주어진 형태이다.

$\bar{y} \pm S$ 의 범위에 68%의 data가 속하고, $\bar{y} \pm 2S$ 에 95%가 속한다.

64~80은 $\bar{y} \pm S$ 의 유형이니 $340 \times 0.68 = 231.2$ 라 약 231명이 해당되며,

56~88은 $\bar{y} \pm 2S$ 의 유형이니 $340 \times 0.95 = 323$ 이라 약 323명이 해당된다.

1.32

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad \text{이다. } (n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad \text{이다. } S_k = \{i \mid |y_i - \bar{y}| \geq kS\} \quad \text{라 두면,}$$

$$(n-1)S^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \underbrace{\sum_{i \in S_k} (y_i - \bar{y})^2}_{\geq 0} + \underbrace{\sum_{i \notin S_k} (y_i - \bar{y})^2}_{\geq 0} \geq \sum_{i \in S_k} (y_i - \bar{y})^2 \quad \text{이다.}$$

$$\sum_{i \in S_k} (y_i - \bar{y})^2 \geq \sum_{i \in S_k} (kS)^2 = |S_k| k^2 S^2 \quad \text{이다. } (|S_k| \Rightarrow S_k \text{의 원소의 수})$$

$$\therefore, (n-1)S^2 \geq |S_k| k^2 S^2 \quad \text{이고, 정리하면, } 1 \geq \frac{|S_k|}{n-1} k^2 \geq \frac{|S_k|}{n} k^2 \quad \text{이다.}$$

따라서, $\frac{1}{k^2} \geq \frac{|S_k|}{n}$ 또는 $\frac{(n-|S_k|)}{n} \geq 1 - \frac{1}{k^2} \geq 0$, 문제의 제시된 바를 충족한다.

1.37

주어진 데이터의 평균과 표준편차를 보았을 때, 평균이 0.033 mg/d 인 반면, 표준편차는 0.1 mg/d 이다. 따라서, 평균과 표준편차의 수치적 차이로 인해 분포가 skewed 하게 됩니다.

2.18

a) $\{HH, HT, TH, TT\}$ (H: Head, T: Tail)

b) 만약 동일한 동전이면, 각 사건의 확률이 $\frac{1}{4}$ 로 동일하다.

c) $A = \{HT, TH\}$ $B = \{HH, HT, TH\}$ 이다.

1) $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{3}{4}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{2}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, $P(\bar{A} \cup B) = 1$ 이다.

2.20

a) $P(G) = P(D_1) = P(D_2) = \frac{1}{3}$ 로 동일하다.

b) I. Good prize 를 선택할 확률은 $\frac{1}{3}$ 입니다.

II. 다른 Dud 를 선택하게 될 것이다.

III. Dud가 아니, good prize를 선택하게 된다.

IV. $\frac{2}{3}$ 의 확률이 된다.

V. 바꾸는 것이 더 확률을 높이는 것이다.

2.28

a) 사람: (M_1, M_2, M_3, P)

$\Rightarrow \{M_1M_2, M_1M_3, M_1P, M_2M_3, M_2P, M_3P\}$

b) 각 사람이 선택될 확률이 동등하면 $\left(\frac{1}{6}\right)$ 로 모두 같다.

c) $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{2}}$ 이 된다.

2.48

x^5y^3 의 계수와 x^3y^5 의 계수 모두 $8C_3 = \binom{8}{3} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = \boxed{56}$ 이다.

2.64

1, 2, 3, 4, 5, 6 으로 구성되어지면 되므로.

$6! \times \left(\frac{1}{6}\right)^6 = \frac{120}{6^5} = \boxed{\frac{5}{324}}$ 이다.

2.68

2023 이대 김민석

$$a) \binom{n}{n} = nC_n = \frac{n!}{(n-n)! \cdot n!} = \frac{1}{0!} = \boxed{1}$$

$$b) \binom{n}{0} = nC_0 = \frac{n!}{(n-0)! \cdot 0!} = \frac{1}{0!} = \boxed{1}$$

$$c) \binom{n}{r} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!} = \frac{n!}{(n-(n-r))! \cdot (n-r)!} = \boxed{\binom{n}{n-r}}$$

$$d) (x+y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i} \text{ 이라. } x=y=1 \text{ 대입하게 되면,}$$

$$\boxed{2^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}} \text{ 가 된다.}$$

2.72

a)

independent 한을 확인하려면, $P(A|M) = P(A)$ 일지를 보이면 된다.

$$\text{자료에 의하면, } P(A) = \frac{6}{10}, P(M) = \frac{4}{10}, P(A \cap M) = \frac{24}{100} \text{ 이라.}$$

$$P(A|M) = \frac{P(A \cap M)}{P(M)} = \frac{\frac{24}{100}}{\frac{4}{10}} = \frac{6}{10} = P(A) \text{ 이라.}$$

따라서, A와 M의 경우, 서로 independent 하다.

b)

\bar{A} 와 F가 independent 한을 보일려면, $P(\bar{A}|F) = P(\bar{A})$ 일지를 보이면 된다.

$$P(\bar{A}) = \frac{4}{10}, P(F) = \frac{6}{10}, P(\bar{A} \cap F) = \frac{24}{100} \text{ 이므로,}$$

$$P(\bar{A}|F) = \frac{P(\bar{A} \cap F)}{P(F)} = \frac{\frac{24}{100}}{\frac{6}{10}} = \frac{4}{10} = P(\bar{A}) \text{ 이라.}$$

따라서, \bar{A} 와 F의 경우 independent 하다.