





НЕЙРОНТИН®

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ГАБАПЕНТИН^{1,2}

СПОСОБСТВУЕТ СТАБИЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ²⁻⁴



УНИКАЛЬНО^{2,5}




УДОБНО^{**2}



ДОСТУПНО⁶



ПЕРВЫЙ
ГАБАПЕНТИН¹



Форма рецептурного бланка № 107-1/у

Министерство здравоохранения
Российской Федерации

Наименование (штамп)
медицинской организации

Наименование (штамп) индивидуального предпринимателя
(указать адрес, номер и дату лицензии, наименование органа
государственной власти, выдавшего лицензию)

Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО

Медицинская документация
Форма № 107-1/у
Утверждена приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 24 ноября 2021 г. № 1094 н

РЕЦЕПТ

(взрослый, детский – нужное подчеркнуть)

“ 8 ” апреля 2022 г.

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее при наличии) пациента

Игнатов И.И.

Дата рождения

24.05.1967

Фамилия, инициалы имени и отчества (последнее при наличии) лечащего

врача (фельдшера, акушерки)

Иванов И.И.

Руб. | Коп. | Rp.

Gabapentini 600 mg, Rtd. N100 in tabs.

3. 900 мг в сутки в 3 приема по 1/2 таблетки
в день, увеличивая дозу до 1 таблетки 3 раза
в сутки (1800 мг) согласно схеме назначения

Руб. | Коп. | Rp.

Подпись и печать лечащего врача
(подпись фельдшера, акушерки)

М.П.



Рецепт действителен в течение 60 дней, до 1 года ()
(нужное подчеркнуть) (указать количество дней)

ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ БОЛИ

Перед началом терапии³:

Формирование ожиданий пациента

- Длительность и непрерывность терапии
- Хороший результат терапии — **снижение интенсивности боли на 30–50%**

Начальный этап терапии²:

- Терапию нейропатической боли препаратом Нейронтин можно начинать с дозы **900 мг в сутки** (по 300 мг 3 раза в сутки) или можно увеличивать дозу постепенно до **900 мг в сутки** в течение первых 3 дней.
- В зависимости от эффекта, дозу постепенно увеличивают до максимальной — **3600 мг в сутки**

Продолжение терапии³:

- Оценка эффективности и безопасности в процессе терапии — каждые **2–4 недели**
- Длительность терапии до решения об эффективности зависит от основного заболевания, но не менее **4–12 недель** с учётом периода титрации

**ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В КЛАССЕ
АНТИКОНВУЛЬСАНТОВ МОЖЕТ
ПРИВОДИТЬ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЧАСТОТЫ
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ И РЕЦИДИВОВ⁷**



Исследование проводилось на группе пациентов с эпилепсией.

По результатам исследования, при смене оригинальных антиконвульсантов на дженерики отмечалось **увеличение частоты приступов у 25,7% пациентов** и выраженности **нежелательных явлений у 20,6% пациентов⁷**

НЕЙРОНТИН® (габапентин)

КАПСУЛЫ 300 мг






















СХЕМА ТИТРАЦИИ²

Дни	 Утро	 День	 Вечер	Итого
1			 300 мг	300 мг
2		 300 мг	 300 мг	600 мг
3	 300 мг	 300 мг	 300 мг	900 мг
4-6	 300 мг	 300 мг	  600 мг	1200 мг
7-10	 300 мг	  600 мг	  600 мг	1500 мг
11-13	  600 мг	  600 мг	  600 мг	1800 мг
14	  600 мг	  600 мг	  600 мг	1800 мг

НЕЙРОНТИН® (габапентин)

ТАБЛЕТКИ 600 мг

СХЕМА ТИТРАЦИИ²

Дни	 Утро	 День	 Вечер	Итого
1			 300 мг	300 мг
2		 300 мг	 300 мг	600 мг
3	 300 мг	 300 мг	 300 мг	900 мг
4-6	 300 мг	 300 мг	 600 мг	1200 мг
7-10	 300 мг	 600 мг	 600 мг	1500 мг
11-13	 600 мг	 600 мг	 600 мг	1800 мг
14	 600 мг	 600 мг	 600 мг	1800 мг

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НЕЙРОНТИН®

Международное непатентованное название: Габапентин. **Лекарственная форма:** таблетки, покрытые плёнчатой оболочкой. **Фармакотерапевтическая группа:** противозудное средство. **Код АТХ:** N03AX12. **Показания к применению:** Эпилепсия. Монотерапия парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше. Эффективность и безопасность монотерапии у детей в возрасте до 12 лет не установлены. Как дополнительное средство при лечении парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у взрослых и детей в возрасте 3 лет и старше. Безопасность и эффективность дополнительного лечения габапентином у детей в возрасте менее 3 лет не установлены; **Нейропатическая боль.** Лечение нейропатической боли у взрослых в возрасте 18 лет и старше. Эффективность и безопасность у пациентов в возрасте до 18 лет не установлены. **Противопоказания:** Гиперчувствительность к габапентину или вспомогательным компонентам препарата. **Эпилепсия:** Применение в качестве монотерапии парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у детей в возрасте до 12 лет. Применение в качестве дополнительного средства при лечении парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у детей в возрасте до 3 лет. **Нейропатическая боль:** Для лечения нейропатической боли у детей и подростков в возрасте до 18 лет. **Способ применения и дозы:** Для всех показаний схема титрации дозы для начала терапии представлена в таблице № 1.

Таблица № 1. Схема титрации дозы препарата в начале терапии

День 1	День 2	День 3
300 мг 1 раз в сутки	по 300 мг 2 раза в сутки	по 300 мг 3 раза в сутки

Эпилепсия. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: в клинических исследованиях эффективная доза составляла от 900 до 3600 мг/сут. Терапию можно начать по схеме, описанной выше в таблице № 1 или с дозы 300 мг 3 раза в сутки в первый день. В последующем в зависимости от ответа пациента на терапию и переносимости препарата доза может быть повышена на 300 мг/сут каждые 2–3 дня, максимально до 3600 мг/сут. Дети в возрасте 3–12 лет: начальная доза препарата варьируется от 10 до 15 мг/кг/сут, которую назначают равными дозами 3 раза в день и повышают до эффективной приблизительно в течение 3 дней. **Нейропатическая боль.** Терапию можно начать по схеме, описанной выше в таблице № 1. Альтернативный способ дозирования – начальная доза составляет 900 мг/сут в три приема равными дозами. В последующем в зависимости от ответа пациента на терапию и переносимости препарата доза может быть повышена на 300 мг/сут каждые 2–3 дня, максимально до 3600 мг/сут. **Побочное действие:** очень часто – вирусные инфекции, сонливость, головокружение, атаксия, утомляемость, лихорадка; часто – пневмония, инфекция дыхательных путей, инфекция мочевыводящих путей, другие виды инфекции, средний отит, лейкопения, анорексия, повышение аппетита, враждебность, спутанность сознания, депрессия, беспокойство, нервозность, судороги, гиперкинезия, дизартрия, амнезия, тремор, бессонница, головная боль, нарушение чувствительности (например, парестезия, гистезия), нарушение координации, нистагм, усиление, ослабление или отсутствие рефлексов, нарушение зрения (такие как амблиопия, диплопия), вертиго, симптомы вазодилатации или артериальная гипертензия, запор, диарея, сухость слизистой оболочки полости рта или глотки, диспепсия, метеоризм, тошнота, рвота, боль в животе, заболелость зубов, гингивит, одышка, бронхит, фарингит, кашель, ринит, отёк лица, пурпура (чаще всего её описывали как кровоизлияние, возникавшее при физической травме), кожная сыпь, акне, зуд кожи, мигалия, артралгия, боль в спине, подергивания мышц, импотенция, периферические отёки, нарушение походки, астенция, боль различной локализации, общее недомогание, гриппоподобный синдром, снижение концентрации белых кровяных телец, повышение массы тела, травмы, переломы, ссадины, связанные спадениями. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** возможно угнетение действия, симптомы седации и смерти, связанные с приёмом габапентина, одновременно назначенных лекарственных препаратов, подавляющих ЦНС, включая опиоидные анальгетики. **Форма выпуска:** таблетки, покрытые плёнчатой оболочкой, 600 мг и 800 мг. **Срок годности:** 2 года. **Условия отпуска:** по рецепту. **Предназначение:** препаратознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата Нейронтин®, П-N013567/02.

Международное непатентованное название: Габапентин. **Лекарственная форма:** капсулы. **Фармакотерапевтическая группа:** противозудное средство. **Код АТХ:** N03AX12. **Показания к применению:** Нейропатическая боль. Лечение нейропатической боли у взрослых в возрасте 18 лет и старше. **Эпилепсия:** Монотерапия парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у взрослых и детей в возрасте 12 лет и старше. Как дополнительное средство при лечении парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у взрослых и детей в возрасте 3 лет и старше. **Противопоказания:** Повышенная чувствительность к габапентину или вспомогательным компонентам препарата. **Эпилепсия:** Применение в качестве монотерапии парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у детей в возрасте до 12 лет. Применение в качестве дополнительного средства при лечении парциальных судорог со вторичной генерализацией и без неё у детей в возрасте до 3 лет. **Нейропатическая боль:** Для лечения нейропатической боли у детей и подростков в возрасте до 18 лет. Дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. **Способ применения и дозы:** Нейронтин® назначают внутрь независимо от приёма пищи. Если необходимо снизить дозу, отменить препарат или заменить его на альтернативное средство, это следует делать постепенно в течение минимум одной недели. **Нейропатическая боль у взрослых.** Начальная доза составляет 900 мг/сут в три приема равными дозами; при необходимости, в зависимости от эффекта, дозу постепенно увеличивают до максимальной — 3600 мг/сут. Лечение можно начинать сразу с дозы 900 мг/сут (по 300 мг 3 раза в сутки) или можно увеличивать дозу постепенно до 900 мг в сутки в течение первых 3 дней по следующей схеме: 1-й день: 300 мг препарата 1 раз в сутки; 2-й день: по 300 мг 2 раза в сутки; 3-й день: по 300 мг 3 раза в сутки. **Парциальные судороги.** При эпилепсии обычно требуется длительное лечение. Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет: эффективная доза — от 900 до 3600 мг/сут. Терапию можно начать с дозы 300 мг 3 раза в сутки в первый день или увеличивать постепенно до 900 мг по схеме: 1-й день: 300 мг препарата 1 раз в сутки; 2-й день: по 300 мг 2 раза в сутки; 3-й день: по 300 мг 3 раза в сутки. В последующем доза может быть повышена максимально до 3600 мг/сут (разделённых на 3 равных приема). Дети в возрасте 3–12 лет: начальная доза препарата варьируется от 10 до 15 мг/кг/сут, которую назначают равными дозами 3 раза в день и повышают до эффективной приблизительно в течение 3 дней. Эффективная доза габапентина у детей в возрасте 5 лет и старше составляет 25–35 мг/кг/сут равными дозами в 3 приема. Эффективная доза габапентина у детей в возрасте от 3 до 5 лет составляет 40 мг/кг/сут равными дозами в 3 приема. Максимальный интервал между приемами доз препарата не должен превышать 12 часов во избежание возобновления судорог. **Побочное действие:** очень часто – вирусные инфекции, сонливость, головокружение, атаксия, утомляемость, лихорадка; часто – пневмония, инфекция дыхательных путей, инфекция мочевыводящих путей, другие виды инфекции, средний отит, лейкопения, анорексия, повышение аппетита, враждебность, спутанность сознания, депрессия, беспокойство, нервозность, нарушение мышления, эмоциональная лабильность, судороги, гиперкинезия, дизартрия, амнезия, тремор, бессонница, головная боль, нарушение чувствительности (например, парестезия, гистезия), нарушение координации, нистагм, усиление, ослабление или отсутствие рефлексов, нарушение зрения (такие как амблиопия, диплопия), вертиго, симптомы вазодилатации, артериальная гипертензия, одышка, бронхит, фарингит, кашель, ринит, запор, диарея, сухость слизистой оболочки полости рта или глотки, диспепсия, метеоризм, тошнота, рвота, боль в животе, заболелость зубов, гингивит, отёк лица, пурпура (чаще всего её описывали как кровоизлияние, возникавшее при физической травме), кожная сыпь, акне, зуд кожи, мигалия, артралгия, боль в спине, подергивания мышц, импотенция, периферические отёки, нарушение походки, астенция, боль различной локализации, общее недомогание, гриппоподобный синдром, снижение концентрации лейкоцитов, повышение массы тела, травмы, переломы, ссадины, связанные с падениями. **Взаимодействие с другими лекарственными средствами:** возможно угнетение действия, симптомы седации и смерти, связанные с приёмом габапентина, при одновременном назначении лекарственных препаратов, подавляющих ЦНС, включая опиоидные анальгетики. **Форма выпуска:** капсулы 100 мг, 300 мг и 400 мг. **Срок годности:** 3 года. **Условия отпуска:** по рецепту. **Предназначение:** препаратознакомьтесь с полной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата Нейронтин®, П-N013567/01.

* Нет аналогов габапентина для дозы 600 мг. ** Выпускается в виде капсул и делимых таблеток для удобства титрации и подбора терапии.
1. www.kidpedia.org/wiki/Gabapentin доступно 14.03.21. 2. Инструкция по медицинскому применению препарата Нейронтин® П-N013567/01. 3. Давыдов О.С., Яхно Н.Н., Кукушкин М.Л. и соавт. Невропатическая боль: клинические рекомендации по диагностике и лечению Российского общества по изучению боли. Российский журнал боли. 2018. № 4. С. 5–41. 4. Wiffen P.J., et al. Antiepileptic drugs for neuropathic pain and fibromyalgia – an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst. Rev. Nov. 11; 2013 (11): CD010567. 5. Государственный реестр лекарственных средств. 2021. <https://grls.rosminzdrav.ru> доступно 05.07.2021. 6. URL: <https://apteka.ru>; доступно 19.10.2020. 7. Bautista R.E., Gonzales W., Jahn D. Factors associated with poor seizure control and increased side effects after switching to generic antiepileptic drugs. Epilepsy Res. 2011; 91 (1–2): 158–167.



ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ