

# Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Геделикс®

## Торговое название

Геделикс®

## Международное непатентованное название

Нет

## Лекарственная форма

Сироп, 100 мл

## Состав

100 мл сиропа содержат

*активное вещество* - плюща листьев экстракт (2.2 – 2.9:1) 0.8000 г,  
*вспомогательные вещества*: макрогола глицерингидроксистеарат, масло  
аниса звездчатого, гидроксиэтилцеллюлоза, сорбитол раствор 70 %, пропиленгликоль, глицерин, вода очищенная.

## Описание

Густоватая жидкость от желтого до желто-коричневого цвета со своеобразным запахом. Возможно помутнение и выпадение осадка, что не влияет на качество и действие препарата.

## Фармакотерапевтическая группа

Респираторная система. Препараты применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Экспекторанты, исключая комбинации с подавляющими кашель. Отхаркивающие препараты. Плюща листьев экстракт.

Код АТХ R05CA12

## Фармакологические свойства

### Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике отсутствуют.

### Фармакодинамика

Лекарственное средство растительного происхождения.

Отхаркивающее действие предположительно обусловлено раздражением слизистой оболочки желудка, при котором секреторные бронхиальные железы слизистой оболочки бронхов рефлексорно стимулируются чувствительными волокнами парасимпатической системы.

## Показания к применению

- в комплексной терапии при острых воспалительных заболеваний дыхательных путей
- симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов

### **Способ применения и дозы**

Для приема внутрь.

Геделикс® сироп рекомендуется принимать неразбавленным и запивать достаточным количеством жидкости (желательно воды).

Продолжительность приема:

Длительность лечения определяется врачом индивидуально. В легких случаях длительность лечения составляет 1 неделю. Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения.

Применять внутрь с помощью прилагаемой дозирующей ложки:

*Взрослым и пожилым пациентам, детям с 11-ти до 18-ти лет:*

по 1 мерной ложке (5 мл) сиропа 3 раза в сутки

*Детям с 6-ти до 11-ти лет:*

по ½ мерной ложки (2,5 мл) сиропа 3 раза в сутки

*Детям от 2-х до 6-ти лет:*

по ½ мерной ложки (2,5 мл) сиропа 2 раза в сутки

### **Побочные действия**

*Очень редко*

- аллергические реакции: одышка, отеки, покраснения кожи, зуд, отек Квинке, крапивница, экзантема

*Редко*

- тошнота, рвота, понос у пациентов с повышенной чувствительностью

В случае выраженного проявления одной из приведенных побочных реакций или побочных действий, не указанных в настоящей инструкции, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту.

### **Противопоказания**

- повышенная чувствительность (аллергии) к экстракту листьев плюща, к растениям семейства Аралиевых или другим компонентам препарата Геделикс® сироп

- беременность и период лактации

- детский возраст до 2-х лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов

- пациентам с дефицитом фермента аргининсукцинатсинтетазы (нарушение обмена цикла мочевины). В единичном случае у 5-месячного ребенка наблюдались повторяющиеся проявления симптомов предполагаемой недостаточности аргининсукцинатсинтетазы, которые развивались в тесной временной связи с приемом препарата, содержащего то же действующее вещество

- пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы.

### **Лекарственные взаимодействия**

Взаимодействия с другими лекарственными средствами до настоящего времени неизвестны.

### **Особые указания**

Особых мер предосторожности не требуется.

Не следует превышать рекомендованную суточную дозу препарата.

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, повышение температуры тела, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.

*Указание для больных сахарным диабетом:*

Геделикс® сироп не содержит сахара и алкоголя и поэтому подходит для больных сахарным диабетом и пациентов, которым следует избегать приема алкоголя.

5 мл сиропа Геделикс содержат 1,75 г сорбита (что соответствует 0,44 г фруктозы).

*Применение в педиатрии*

Применение у детей 2-4 лет требует рекомендации врача.

Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, например кодеин или декстрометорфан. С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.

*Особенности влияния лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами или потенциально опасными механизмами*

Особых мер предосторожности не требуется.

### **Передозировка**

Прием препарата в больших количествах, превышающих трехкратную суточную дозу, может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение.

*Лечение:* симптоматическое

### **Форма выпуска и упаковка**

По 100 мл препарата разливают во флаконы из коричневого стекла, с завинчивающейся пластиковой крышкой, с контролем первого вскрытия.

По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках и дозирующей ложечкой помещают в картонную коробку.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Срок хранения**

5 лет

Период применения после вскрытия флакона - 6 месяцев

Не применять по истечении срока годности

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Производитель**

«Кревель Мойзельбах ГмбХ»

Кревельштрассе 2

53783 Айторф

Германия

**Держатель регистрационного удостоверения**

«Кревель Мойзельбах ГмбХ», Германия

*Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:*

ТОО «КФК «Медсервис Плюс»

050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой, 54

Телефон/Факс: (727) 279 98 21

E-mail: [pharmanadzor@medservice.kz](mailto:pharmanadzor@medservice.kz)