

# **Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства**

**Геделикс® s.a.**

## **Торговое название**

Геделикс® s.a.

## **Международное непатентованное название**

Нет

## **Лекарственная форма**

Капли для приема внутрь

## **Состав**

100 мл раствора содержит

*активное вещество* - плюща листьев экстракта (2.2 – 2.9:1) - 4.000 г,

*вспомогательные вещества*: пропиленгликоль, глицерин, масло аниса звездчатого, масло эвкалиптовое, ментол, масло мятное (водорастворимое).

## **Описание**

Прозрачная, зеленовато-коричневая вязкая жидкость с ароматным запахом. Возможно помутнение и выпадение осадка, что не влияет на качество и действие препарата.

## **Фармакотерапевтическая группа**

Респираторная система. Препараты применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Экспекторанты, исключая комбинации с подавляющими кашель. Отхаркивающие препараты. Плюща листьев экстракт.

Код ATX R05CA12

## **Фармакологические свойства**

### **Фармакокинетика**

Данные по фармакокинетике отсутствуют.

### **Фармакодинамика**

Геделикс® s.a., капли для приема внутрь - это лекарственное средство растительного происхождения.

Отхаркивающее действие, очевидно, осуществляется раздражением слизистой оболочки желудка, стимулируя рефлекторно через чувствительные волокна парасимпатической системы слизистые железы слизистой оболочки бронхов.

## **Показания к применению**

- в комплексной терапии острых воспалительных заболеваний дыхательных путей
- симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

## **Способ применения и дозы**

Для приема внутрь.

Капли следует принимать с достаточным количеством воды. Для маленьких детей препарат рекомендуют разбавить чаем или фруктовым соком.

Продолжительность приема:

Без консультации с врачом длительность приема Геделикс® s.a., капли для приема внутрь, не должна превышать семи дней.

*Взрослым и пожилым пациентам, детям с 12-ти до 18-ти лет:*

по 31 капле 3 раза в сутки

*Детям от 6-ти до 11-ти лет:*

по 21 капле 3 раза в сутки

*Детям от 2-х до 5-ти лет:*

по 16 капель 3 раза в сутки

## **Побочные действия**

*Очень редко*

- одышка, отеки, покраснения кожи, зуд, отек Квинке, крапивница, экзантема

*Иногда*

- тошнота, рвота, понос у пациентов с повышенной чувствительностью.

У грудных детей и детей до 2-х лет Геделикс® s.a., капли для приема внутрь, может вызвать ларингоспазм с последующими тяжелыми нарушениями дыхания.

В случае выраженного проявления одной из приведенных побочных реакций или побочных действий, не указанных в настоящей инструкции, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту.

## **Противопоказания**

- повышенная чувствительность (аллергия) к экстракту листьев плюща, к растениям семейства Аралиевых или другим компонентам препарата Геделикс® s.a., капли для приема внутрь
- детский возраст до 2-х лет из-за риска ухудшения дыхательных симптомов
- беременность и период лактации

## **Лекарственные взаимодействия**

Взаимодействия с другими лекарственными средствами до настоящего времени неизвестны.

### **Особые указания**

Не следует превышать рекомендованную суточную дозу препарата.

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, повышение температуры тела, а также гнойная или кровавая мокрота при откашливании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.

Не рекомендуется без консультации врача одновременное применение с противокашлевыми препаратами, например кодеин или декстрометорфан.

С осторожностью применять пациентам с гастритом или язвой желудка.

*Указание для больных сахарным диабетом:*

Геделикс® s.a., капли для приема внутрь, не содержит сахара и алкоголя и поэтому подходит для больных сахарным диабетом и пациентов, которым следует избегать приема алкоголя.

*Применение в педиатрии*

Применение у детей 2-4 лет требует рекомендации врача.

*Во время беременности и лактации*

Применение в период беременности и кормления грудью не рекомендуется (в связи с недостаточностью клинических данных).

*Особенности влияния препарата на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами*

Особых мер предосторожности не требуется.

### **Передозировка**

Прием препарата в больших количествах, превышающих трехкратную суточную дозу, может вызвать тошноту, рвоту, диарею и возбуждение.

*Лечение:* симптоматическое

### **Форма выпуска и упаковка**

По 50 мл препарата разливают в стеклянные флаконы из коричневого стекла с капельным дозатором и с закручивающимся пластиковым колпачком.

По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению на государственном и русском языках помещают в картонную коробку.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

### **Срок хранения**

5 лет.

Период применения после вскрытия флакона - 6 месяцев.

Не применять по истечении срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта

**Производитель**

Кревель Мойзельбах ГмбХ  
Кревельштрассе 2  
53783 Айторф  
Германия.

**Держатель регистрационного удостоверения**

Кревель Мойзельбах ГмбХ, Германия.

*Наименование, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная почта) организации на территории Республики Казахстан, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств от потребителей и ответственной за пострегистрационное наблюдение за безопасностью лекарственного средства:*

ТОО «КФК «Медсервис Плюс»  
050004, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой, 54  
Телефон/Факс: (727) 279 98 21  
E-mail: pharmanadzor@medservice.kz