


MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

חנק מגוף זר

Foreign-Body Airway Obstruction





- חנק מגוף זר הוא גורם נדיר אך בר מניעה למוות
- רוב המקרים של חנק מגוף זר מדווחים במבוגרים במהלך אכילה
- המקרים המדווחים בילדים ובתינוקות מתרחשים במהלך האכלה או במהלך משחק בנוכחות ההורים או אדם שמשגיח
- אירוע של חנק לרוב מתרחש כאשר ישנם עדים והמטפל יכול להתערב ולטפל במהירות כאשר הנפגע עדיין בהכרה
- הטיפול בד"כ מצליח וסיכויי ההישרדות יכולים להגיע ל- 95%






תהליך הבליעה התקין

- כאשר אדם נושם, אוויר יכול להיכנס בחופשיות לקנה הנשימה
- כאשר אדם בולע, מכסה הגרון מגן על קנה הנשימה מכניסת מזון, נוזלים וגופים זרים לקנה הנשימה
- קיימים שני מנגנונים עיקריים המגנים על דרכי הנשימה העליונות
- רפלקס השיעול ורפלקס ההקאה



נשימה



בליעה



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

גורמים להשתנקות

- אכילה מהירה
- שיחה בזמן סעודה
- חוסר יכולת ללעוס היטב
- חוסר שיניים בילדים קטנים ובאנשים מבוגרים
- שתיית אלכוהול/ נטילת סמים





- ראשית, הטיפול מתחיל במניעה והסברה!
- ע"י מניעה והסברה ניתן למנוע את מרבית המקרים
- אוכלוסיות בסיכון הינם: קשישים וילדים הקטנים
- יש להקפיד לחתוך מזון בצורה נכונה
- להרחיק חפצים קטנים מסביבת הילדים
- להקפיד על ערנות בקרבת הילדים
- לא לדבר במהלך האכילה





זיהוי חנק מגופ זר

- זיהוי מהיר הוא המפתח להצלחת הטיפול ולסיכויי הישרדות גבוהים
- חשוב להבדיל בין מצבי חירום אחרים שעלולים לגרום למצוקה נשימתית, כיחלון ואיבוד הכרה
- גופים זרים עלולים לגרום לחסימת נתיב קלה ועד לחסימת נתיב אוויר חמורה
- על המטפל להתערב במהירות כאשר הוא מבחין בסימנים לחסימת נתיב אוויר חמורה





סוגי חסימות נתיב אוויר

קיימים שני סיווגים לחסימת נתיב אוויר:

1. חסימת נתיב אוויר קלה: אם המטופל משמיע קול, משתעל או

בוכה, מדובר בחסימת נתיב אוויר קלה


2. חסימת נתיב אוויר חמורה: אם המטופל אינו מסוגל להשמיע קול,

להשתעל או לבכות, מדובר בחסימת נתיב אוויר חמורה





סימנים לחנק מגוף זר



סימן חנק אוניברסאלי

- סימנים לכניסת אוויר ירודה, מאמץ נשימתי גובר
- קושי ניכר בנשימה
- שיעול לא יעיל, שיעול שקט
- כיחלון
- חוסר יכולת לדבר/ להשמיע קול או לנשום
- ייתכן והנפגע יאחז בצווארו (סימן חנק אוניברסאלי)
- ירידה ברמת הכרה עד לאובדן הכרה
- דום נשימה ודום לב (סימנים מאוחרים)





טיפול בחסימה קלה

- התערבות במקרה זה עלולה לדחוק את הגוף הזר ממקומו ולהרע את מצבו של המטופל. כלומר, להוביל לחסימה חמורה
- הושב את המטופל, שמור על נתיב האוויר ועודד אותו לשיעול
- יש לפנות לבית החולים לצורך השגחה ולהמשך בירור





טיפול בחסימה חמורה

במבוגרים ובילדים:

1. וודא שמדובר בחסימת נתיב אוויר חמורה, בדוק את הסימנים

ושאל את הנפגע "האם אתה נחנק?"

2. בצע לחיצות ברום הבטן עד שהגוף הזר ייצא או עד שהמטופל

יאבד את הכרתו



לחיצות ברום הבטן





טיפול בחסימה חמורה

בתינוקות:

1. וודא שמדובר בחסימת נתיב אוויר חמורה, בדוק את הסימנים,

שלול את היכולת לבכות או להשמיע קול

2. בצע 5 טפיחות בין השכמות ולאחר מכן 5 לחיצות החזה

3. המשך לבצע טפיחות בין השכמות בשילוב עם לחיצות חזה עד


שהגוף הזר ייצא או עד שהמטופל יאבד את הכרתו



1



2



3





טיפול במחוסר הכרה

1. קרא לעזרה- הזעק נט"ן
2. אם המטופל מחוסר הכרה, ללא נשימה או נשימה לא אפקטיבית, השכב את הנפגע על הרצפה/ מצע קשיח מוגבה (בהתאם לגיל) והתחל לבצע החייאה הכוללת עיסויים והנשמות לפני ביצוע הנשמה, הבט לחלל הפה וחפש אחר גוף זר והוצא אותו במידת האפשר
3. המשך לבצע החייאה במחזורים של 2 דקות עד להגעת צוות מתקדם או עד שהגוף הזר ייצא





טיפול באוכלוסיות מיוחדות

בקבוצת האוכלוסייה הבאה יש לטפל באמצעות לחיצות חזה במקום
לחיצות ברום הבטן:

- תינוקות מתחת לגיל שנה

- חולים מרותקים למיטה/ כיסא גלגלים

- נשים בהריון

- אנשים שמנים מאוד



הוצאת גוף זר לחולה
המרותק לכיסא גלגלים



הוצאת גוף זר לאישה בהריון






טיפול לאחר הוצאת הגוף הזר

- ניתן לדעת אם הגוף הזר ייצא בנפגע מחוסר הכרה בשני מקרים:
 1. מרגישים כניסת אוויר ורואים את בית החזה מתרומם בכל נשימה
 2. הגוף הזר יצא מהלוע של המטופל
- הטיפול מתבסס על הסימפטומים שמטופל מציג
- אם הגוף הזר יצא כתוצאה מלחיצות ברום הבטן, יש לבצע בדיקה והערכת סימנים חיוניים ולפנות את המטופל למתקן רפואי





טיפול בחנק מגוף זר		
מטופל בהכרה		
מבוגרים	ילדים (עד להופעת סימני התבגרות)	תינוקות (עד גיל שנה)
1. וודא שמדובר בחסימת נתיב אוויר חמורה/ שאל את הנפגע "האם אתה נחנק?" 2. בצע לחיצות ברום הבטן 3. המשך לבצע לחיצות ברום הבטן עד שהגוף הזר ייצא או עד שהמטופל יאבד את הכרתו	1. וודא שמדובר בחסימת נתיב אוויר חמורה 2. בצע 5 טפחות בין השכמות ולאחר מכן 5 לחיצות חזה 3. המשך לבצע טפחות בין השכמות בשילוב עם לחיצות חזה עד שהגוף הזר ייצא או עד שהמטופל יאבד את הכרתו	1. וודא שמדובר בחסימת נתיב אוויר חמורה 2. בצע 5 טפחות בין השכמות ולאחר מכן 5 לחיצות חזה 3. המשך לבצע טפחות בין השכמות בשילוב עם לחיצות חזה עד שהגוף הזר ייצא או עד שהמטופל יאבד את הכרתו
		
מטופל מחוסר הכרה		
4. הזעק נט"ן 5. אם המטופל מחוסר הכרה, ללא נשימה או נשימה לא אפקטיבית, השכב את המטופל על הרצפה/ מצע קשיח מוגבה (בהתאם לגיל) והתחל לבצע החייאה הכוללת עיסויים והנשמות לפני ביצוע הנשמה, הבט לחלל הפה וחפש אחר גוף זר והוצא אותו במידת האפשר 7. המשך לבצע החייאה במחזורים של 2 דקות, עד להגעת צוות מתקדם		



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות?

