

MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



מגן דוד  
אדום  
בישראל

סכרת

Diabetes Mellitus





- הסכרת הינה מחלה מטבולית המתאפיינת בריכוז גבוה של גלוקוז בדם ובהפרעה בהפרשת אינסולין
- זוהי המחלה הנפוצה ביותר מבין המחלות האנדוקריניות
- אנדוקרינולוגיה – תחום ברפואה העוסק בחקר ההורמונים, היווצרותם, הרכבם ופעולתם
- הורמון – מולקולה המגיעה דרך מחזור הדם אל תא מטרה
- הלבלב – הלבלב ממוקם בבטן העליונה מאחורי הקיבה




- מולקולת סוכר המהווה את מקור האנרגיה העיקרי לתאי הגוף

- רמות סוכר תקינות בדם 80-110mg\dl






- הורמון המווסת את רמות הסוכר
- מופרש מהלבלב בתגובה לעלייה ברמת הסוכר בדם





- במחלת הסכרת ישנה הפרשה מועטה של אינסולין או הפרשה של אינסולין לא "איכותי" מהלב לב
- במחלת הסכרת רמות הסוכר בדם גבוהות אך רמות הסוכר **בתאים** נמוכות וזאת בשל הפרשה לא מספקת / איכותית של אינסולין


© כל הזכויות שמורות



- תורשה
- סביבה (השמנה)

- גורמים נוספים:

- גיל
- וירוסים
- מערכת חיסונית פגומה
- טראומה פיזית
- תרופות
- מצוקה / לחץ
- הריון





## סוגי הסכרת

### TYPE 2 – NIDDM

- סכרת שאינה תלויה באינסולין

- פתופיזיולוגיה: ירידה במספר / ברגישות הרצפטורים לאינסולין.

- פגם מולקולרי באינסולין

- טיפול בבית: הורדת משקל

- תרופות לאיזון המחלה

- הזרקת אינסולין – בשלב מתקדם של המחלה

### TYPE 1 – IDDM

- סכרת שתלויה באינסולין

- פתופיזיולוגיה: אי ייצור / ייצור בלתי מספיק של אינסולין

- טיפול בבית: הזרקת אינסולין



## מצבי חירום

### היפרגליקמיה – עודף סוכר בדם      היפוגליקמיה – סוכר נמוך בדם

- מתפתח תוך שעות ו/או ימים
- מתפתח תוך שניות ו/או דקות

#### • גורמים:

- אי לקיחת אינסולין
- אכילת יתר של סוכרים
- מחלת חום / זיהום
- לקיחת יתר של אינסולין
- פעילות גופנית חריגה
- הקאות



## מצבי חירום – סימנים

### היפרגליקמיה – עודף סוכר בדם      היפוגליקמיה – סוכר נמוך בדם

• צמא • הידרדרות מהירה במצב

ההכרה

• שינויים התנהגותיים: כעס, בלבול, תוקפנות

• חולשה, אי שקט, רעד

• רעב


• כאבי ראש

• פרכוסים

• דופק מהיר, הזעה, חיוורון

• טיפול

סכנות



• השתנה מרובה

• ריח אצטון מהפה

• נשימות מהירות ועמוקות

• חולשה, יובש בריריות, בחילות/הקאות

• עור חם ויבש

• דופק מהיר, ל"ד נמוך

• איבוד הכרה

• איבוד הכרה


• טיפול



## מצבי חירום – סכנות

### היפרגליקמיה – עודף סוכר בדם      היפוגליקמיה – סוכר נמוך בדם

- התייבשות
- אובדן אלקטרוליטי
- הפרעות קצב, הלם
- חוסר סוכר לתאי המוח – נזק מוחי






## מצבי חירום – טיפול

### היפרגליקמיה – עודף סוכר בדם      היפוגליקמיה – סוכר נמוך בדם

- נוזלים, אינסולין
- שתיה ממותקרת
- מזון ממותק
- גלוקג'ל – בסמכות חובש
- חבירה עם נט"ן / אט"ן



© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל

MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



מגן דוד  
אדום  
בישראל

# גלוקומטר



MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



מגן דוד  
אדום  
בישראל

# גלוקומטר – כיול המכשיר



כל הזכויות שמורות

MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



מגן דוד  
אדום  
בישראל

# גלוקומטר – מדידת סוכר



MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



מגן דוד  
אדום  
בישראל

# גלוקומטר – מדידת סוכר



© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל



## סכרת – דגשים

- חולה סכרת אשר מציג סימנים / סימפטומים של היפוגליקמיה על אף ערכי סוכר תקינים עלול להיות בהיפוגליקמיה יחסית.
- חשוב לברר מהם ערכי הסוכר התקינים של אותו חולה
- בכל חשד למצב חירום סכרתי יש לבדוק סוכר.
- בכל חשד לאירוע מוחי שלול היפוגליקמיה ע"י בדיקת סוכר.
- לאחר בדיקת סוכר יש להשליך את המחט לפח מחטים!

MAGEN  
DAVID  
ADOM  
IN ISRAEL



מגן דוד  
אדום  
בישראל

שאלות



© כל הזכויות שמורות