

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל




פרכוסים



פרכוסים – הגדרה


- אירוע פתאומי של פעילות חשמלית בלתי נשלטת במוח, הגורם לפגיעה בהכרה ו/או לסדרה של התכווצויות שרירים לא רצוניות





פרכוסים – גורמים

- גידולים
- זיהומים
- שבץ מוחי
- פגיעות ראש
- היפוגלקימיה
- סמים
- אפילפסיה
- היפוקסיה
- רעלת הריון
- אפילפסיה





פרכוסים – אפילפסיה

- מחלה התקפית בה יש הפרעה בתפקוד איזורים במוח והמתבטאת בהתקפים פתאומיים קצרים של אובדן הכרה, פעילות מוטורית, תופעות סנסוריות או התנהגות מוזרה.
- נגרמת עקב פעילות יתר לא תקינה של מוקד תאי עצב במוח.



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

פרכוסים – סוגים



- פרכוס חלקי / ממוקד

- פרכוס כללי



© כל הזכויות שמורות



פרכוסים – סוגים



- **פרכוס חלקי / ממוקד – תנועה בלתי רצונית, שינויים בהתנהגות, לעתים אף שינויים פסיכומטוריים.**



פרכוסים – סוגים



• פרכוס כללי

– פרכוס קטן – מתאפיין בירידה במצב ההכרה ושינוי בהתנהגות ללא אובדן טונוס שרירים, נמשך כ – 20-30 שניות

– פרכוס גדול – אובדן הכרה והתכווצויות

- **Aura** - השלב המקדים. החולים מדווחים על ראייה מטושטשת, כאבי ראש, טעם מתכתי בפה וכו'...
- **Tonic** - כיווץ כלל השרירים בגוף, נמשך כ-20 שניות.
- **Clonic** - כיווץ והרפייה של השרירים בגוף, נמשך מספר דקות
- **Posictal** - השלב שלאחר ההתקף. החולה יהיה עייף, ישנוני ומבולבל. נמשך מספר דקות עד שעות



פרכוסים – סוגים



- **פרכוס כללי**

- **Status epilepticus** – פרכוס מתמשך למעלה מ – 15 דקות או

מספר התקפים ללא חזרה להכרה ביניהם – מצב מסכן חיים

- **מצב קיצון של פרכוסים.**




פרכוסים – סיבוכים

- טראומה
 - פגיעה בפה
 - פגיעה בעמ"ש
 - פריקת כתף
 - פגיעת ראש
- אספירציה
- חוסר חמצן לרקמות
- דום נשימה





פרכוסים – סימנים




- פרכוסים
- סימני נשיכה
- דימום בשפתיים
- בלבול
- חולשה
- חוסר התמצאות במקום ובזמן
- חבלות

© כל הזכויות שמורות



פרכוסים – סכנות



- אובדן הכרה – צניחת בסיס לשון

- פרכוס ממושך

- היפוקסיה מוחית


- חבלות נלוות





טיפול – לכל סוגי הפרכוסים

ABC עפ"י סכמת טיפול בחולה





לאחר ההתקף

- ניקוי פיו של החולה מהפרשות כל עוד הוא מחוסר הכרה.
- אבטחת נתיב אויר
- העשרה בחמצן
- הפחתת גירויים סביבתיים
- פינוי החולה
- בצע בדיקה סוכר

בזמן הפרכוס

- הגנה של החולה מפני פגיעה מעצמים סביבו ומהרצפה – ריפוד איזור הראש
- שמירה על נתיב אויר
- העשרה בחמצן
- הזמנת נט"ן / אט"ן






פרכוסים – דגשים

- הרחק מגורם מסכן
- אם נחבל , שקול טיפול כבפצוע עפ"י סכמת PHTLS
- איסורים!

– אל תנסה למנוע את הפרכוס!

– אל תנסה לפתוח את הפה!

– אל תכניס אצבעות לפה!





התעלפות לעומת פרכוסים

קריטריון	התעלפות	פרכוסים
תנוחה	מתרחש במצב עמידה	מתרחש בכל מצב
תחושה מקדימה	"שחור בעיניים", סחרחורת (חולשה)	AURA, או ללא התראה מוקדמת
מצב הכרה	חזרה מהירה להכרה בעקבות שינוי תנוחה.	החולה עלול להישאר מחוסר הכרה דקות ארוכות לאחר האירוע. בלבול וכאבי ראש יופיעו זמן רב לאחר ההתקף.
התעוררות	חזרה מהירה לשגרה	בלבול משמעותי
פציעה נלוות	לעיתים רחוקות	לעיתים קרובות
אירוע חוזר	בד"כ עם חזרה מהירה לעמידה	שכיח
מתן שתן	לעיתים רחוקות	שכיח




פרכוסי חום – כללי

- פרכוס המתרחש בילדים מגיל חודש עד גיל 5 שנים, נלווה למחלת חום, לא נגרם ע"י זיהום במערכת העצבים ואין הסטוריה של פרכוסים ללא חום. כמו כן, אין הפרכוס עונה על הקריטריונים של פרכוס סימפטומטי אחר

- הגורם לפרכוס הינו העלייה הפתאומית בחום

- פרכוסי החום הם קצרים בדרך כלל




© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

פרכוס י חום – סימנים



- אותם סימנים כמו בכל פרקוס כללי




© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

פרכוס י חום – סכנות




- חבלות נלוות
- פרקוס ארוך – היפוקסה מוחית



© כל הזכויות שמורות



פרכוס י חום – טיפול



• מניעה

- הורדת חום בילד עם חום מעל 38.5°
- ילד שבעברו אירוע של פרקוס חום – יש להוריד חום
- הפשטה והרטבה עם מגבת עם מים פושרים

• ABC עפ"י סכמת טיפול בחולה

- שקול הזמנת אט"ן/נט"ן
- כל פרקוס חום מחייב פינוי



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות



© כל הזכויות שמורות