

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL




מגן דוד
אדום
בישראל



שבץ מוחי

Stroke





- המוח הוא האיבר החשוב ביותר בגוף
- נזק לרקמת המוח הינו נזק בלתי הפיך
- רוב מקרי השבץ מתרחשים מחוץ לכותלי בית החולים
- שבץ מוחי הוא הגורם השכיח ביותר לנכות בעולם המערבי ואחד משלושת הגורמים השכיחים ביותר לתמותה






- מצב חירום הנגרם כתוצאה מהפרעה או הפסקה בזרימת הדם לאחד מחלקי המוח

- הפגיעה באספקת הדם למוח, גורמת להתקף פתאומי של הפרעה לאחד או ליותר מתפקודי הגוף ולהופעת חסכים נוירולוגיים

קיימים שני סוגים של שבץ מוחי:

1. שבץ איסכמי (חסימתי): מתרחש ב- 87% מהמקרים
2. שבץ המורגי (דימומי): מתרחש ב- 13% מהמקרים





גורמי סיכון:


נשלטים	בלתי נשלטים
יתר לחץ דם	גיל
עישון	מין (גברים בסיכון גבוה יותר)
TIA - "שבץ חולף"	תורשה
מחלות לב	מוצא
סוכרת	שבץ קודם
מחלות קרישיות יתר של הדם	
מחלה של עורק הקרוטיד	
גלולות למניעת הריון	





שבץ איסכמי


- מתרחש בכ- 87% ממקרי השבץ
- חסימה או הפרעה באספקת הדם לחלק / אזור במוח
- מתבטא בהופעת חסכים נוירולוגים ותפקודים שגרתיים לקוויים (כמו דיבור, הליכה, ראייה, שווי משקל)
- גורם: תסחיף ש"נדד" מכלי דם גדול או מהלב אל כלי בדם במוח או קריש דם שנוצר בכלי דם במוח





שבץ המורגי

- מתרחש בכ- 13% ממקרי השבץ
- קרע או פיצוץ של כלי דם במוח (שלא כתוצאה מטרומה)
- הדימום המצטבר מפעיל לחץ על המוח כנגד הגולגולת
- בד"כ מתבטא בהתדרדרות מהירה במצבו של המטופל



(M.D.A.)



סימנים וסימפטומים

- ירידה במצב הכרה

- חולשת צד / שיתוקים בהצלבה / ירידה בכוח גס / חוסר תחושה

- קושי בבליעה/ בדיבור

- שיתוק בעצב הפנים (פציאליס)

- אישונים לא שווים / סטית מבט

- בחילות והקאות

- אי שליטה על סוגריים

- כאבי ראש





• הערכת שבץ מוחי נעשית על בסיס 3 פרמטרים:

1. דיבור

2. השמטת זרוע

3. אי סימטריות בפנים


• אם ניתן, יש לבצע בדיקת סוכר על מנת לשלול היפוגליקמיה



השמטת זרוע



מצב תקין



פציאליס- שיתוק בעצב הפנים





- חנק כתוצאה מאספירציה (שאיפת תוכן הקיבה)



- חוסר הכרה

- נכות לטווח ארוך





- זיהוי מהיר של סימני שבץ

- תמיכה ב- ABC בדגש על שמירה על נתיב האוויר

- הערכה מהירה של מטופל עם שבץ בטרומ בית החולים

- רישום הזמן האחרון בו המטופל היה נורמאלי לאחרונה/ זמן הופעת

הסימנים

- בדיקת סוכר על מנת לשלול היפוגליקמיה, הערכת מצב המודינאמי (דופק

ולחץ דם) ומעקב אחר רמת ההכרה





העשרה: טיפול בבית החולים

- בבית החולים קיים טיפול ממיס קריש הניתן בין 3-4.5 שעות מרגע הופעת הסימנים ועשוי לצמצם את הנזק המוחי בחלק מהמטופלים
- הטיפול ניתן באמצעות תרופה בשם TPA הניתנת דרך הוריד
- זיהוי מהיר והגעה לבית החולים הינם ההיבטים הטיפולי החשובים ביותר בטיפול במטופל עם חשד לשבץ מוחי



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שבץ איסכמי חולף

Transient Ischemic Attack



שבץ איסכמי חולף - TIA

- הפרעה נוירולוגית זמנית שמופיעה באופן ספונטני וסימניה חולפים לרוב לאחר כרבע שעה (15 דקות)
- אירוע איסכמי חולף זהה בסימניו הקליניים לשבץ איסכמי
- בחלק ניכר מהמקרים TIA מקדים שבץ מוחי (חלק מהחולים שעברו TIA יעברו שבץ מוחי בתוך ימים עד חודשים)
- לאחר האירוע אין עדות לנזק מוחי קבוע
- בשלב טרום בית החולים, הטיפול הזה לטיפול בשבץ איסכמי



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות?

