

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

אלרגיה ואנאפילקסיס לציבור הרחב

Allergy and Anaphylaxis





- אלרגיה ואנאפילקסיס הינם מצבי חירום שכיחים ברחבי העולם
- גורמים לתחלואה ולתמותה בכל הגילאים
- ההערכה היא שבישראל יתכנו כ- 1,600 מקרים חריפים בשנה
- נגרמים כתוצאה מחשיפה למזון, חיסונים, עקיצת חרקים ועוד
- עלולים להוות מצבי חירום מסכני חיים הדורשים הכרה והתערבות מיידית של המטפלים בכדי להציל את חייו של המטופל





מערכת החיסון

- רשת מורכבת של תאים, רקמות ואיברים שתפקידם להגן על הגוף
- מבוססת על זיכרון וייחודיות
- תפקידה העיקרי הוא למנוע כניסת חומרים זרים אל הגוף
- החומר הזר המעורר אותה קרוי "אלרגן" או "אנטיגן"
- ישנם שלושה מנגנוני הגנה (טבעיים, לא ספציפיים וספציפיים)
- תגובה קשה תגרור מעורבות של רוב מנגנוני ההגנה בגוף





תאי פייטום (MAST)




- תאי מאסט הינם תאי דם לבנים
- מהווים שחקני מפתח בהתפתחות תגובה אלרגית
- מפרישים היסטמין וחומרים נוספים כתוצאה מגירוי ע"י אלרגן
- הפרשת ההיסטמין תלויה בחומרת התגובה
- נמצאים במקומות מפגש עם העולם החיצון ובאיברים שונים בגוף
- כמו עור, ריריות הקיבה, דרכי הנשימה, מערכת הדם ועוד





- חלבון המופרש ע"י תאי מאסט וע"י באזופילים (תאי דם לבנים)
- פועל על חיישנים ספציפיים וגורם לשרשרת של תגובות פיזיולוגיות
- מעלה את חדירות כלי הדם ובכך גורם לנפיחויות ולבצקות
- מרחיב כלי דם ובכך גורם לירידה בלחץ הדם, כאבי ראש והתעלפות
- מכווץ סמפונות ושרירים חלקים ובכך גורם לקוצר נשימה וכאבי בטן
- מגרה קצות עצבים פריפריים וגורם לתחושת גרד ועקצוץ
- גורם ל"גיוס" תאי דלקת והגברת האפקט הדלקתי





- עקיצת חרקים
- מאכלים
- ביצים
- פירות טרופיים
- חלב
- שומשום
- פרוות בעלי חיים
- תרופות
- לטקס
- בוטנים
- אגוזים
- גלוטן
- אבקנים
- אידיופטי (לא ידוע)


**ייתכנו גורמים נוספים, הרשימה מצומצמת ומבוססת על מקור אחד





תגובה אלרגית


- תגובת יתר של מערכת החיסון לחומר זר
- מוכרת גם בשם "רגישות יתר"
- התגובה החיסונית המהירה ביותר בטבע
- עלולה להיגרם מחשיפה לתרופות, מזון, עקיצת בעלי חיים ועוד
- מחולקת לארבע דרגות חומרה שונות- קלה ועד לסכנת חיים
- התגובה החמורה ביותר הינה תגובה אנאפילקטית (אנאפילקסיס)






אנאפילקסיס

- תגובת יתר של מערכת החיסון לחומר זר לאחר חשיפה קודמת
- תגובה אלרגית קשה המתפתחת במהירות ועלולה לגרום למוות
- הסימנים והסימפטומים מתפתחים בטווח של דקות
- מצב חירום רפואי הדורש התערבות מיידי
- ב- 80% מהמקרים לפחות מעורבת תגובה עורית
- כולל תגובה של מערכת הלב וכלי הדם, מערכת הנשימה והעור





מנגנון של אנאפילקסיס






• תגובה עורית/ עינית: הסמקה, פריחה ממושטת, בצקות עוריות,

גירוד בלחמיות העיניים, חום ונפיחות, גירוד עורי

• תגובה עורית מופיעה ברוב מקרי האלרגיה והאנאפילקסיס

• אנגיואדמה הינה בצקות עוריות ונפיחות של הריריות

• אורטיקריה הינה פריחה ממושטת ומגרדת



פריחה ממושטת- אורטיקריה



בצקות עוריות- אנגיואדמה





- **תגובה נשימתית:** נזלת וגודש באף, מועקה בגרון, נפיחות בלשון, צפצופים מלווים לקוצר נשימה (בדומה לאסטמה), שיעול וצרידות
- **תגובה של מערכת הלב וכלי הדם:** סחרחורת, חולשה, התעלפות, כאבים בחזה, דפיקות לב, דופק מהיר, "נפילת" לחץ דם
- **תגובה של מערכת העיכול:** בחילות, הקאות, שלשולים, נפיחות וכאבי בטן עוויתיים
- **תגובה נוירולוגית:** כאבי ראש, סחרחורת, ראייה מטושטשת





- **איום על דרכי האוויר בשל בצקות בדרכי הנשימה החוסמות את נתיב האוויר וכתוצאה מכך היפוקסמיה**
- **"קריסה" המודינאמית כתוצאה מההרחבה הקיצונית של כלי הדם**
- **לבסוף דום לב כתוצאה מהקריסה ההמודינאמית ו/או מהיפוקסמיה**

זכור, ככל שהתגובה מהירה יותר כך היא חמורה יותר!





- וודא את בטיחותך האישית ואת בטיחותו של המטופל
- הזעקת עזרה- חייג 101 וקבל הנחיות ממוקד מד"א
- השכב את המטופל והרם את רגליו
- בתגובה חמורה, סייע למטופל להשתמש במזרק אפיפן במידת הצורך
- שמור על נתיב האוויר ותמוך ב- ABC
- ספק חמצן המסכה למטופל אם יש ברשותך





- אפיפן הינו מזרק אוטומטי המכיל אדרנלין
- משמש להזרקה עצמית, תוך שרירית במצבי חירום אלרגיים
- לרוב המטופל יודע לזהות מצב הדורש שימוש במזרק
- אם המטופל אינו יכול להזריק בעצמו, על המטפל לדעת כיצד להזריק
- הזרקת אפיפן מאפשרת למטופל מרווח זמן עד לקבלת טיפול רפואי מתקדם בנט"ן ובבית החולים





התוויות למתן אפיפן

- אם המטופל אינו יכול להזריק בעצמו על המטפל להזריק למטופל
 - כאשר ידועה היסטוריה של אלרגיה ומופיעים אחד מהסימנים הבאים, יש להתקשר למוקד מד"א ובהנחיתו להזריק:
1. תגובה עורית ממושטת
 2. נפיחות בריריות והלשון
 3. תסמינים נשימתיים (קוצר נשימה, שיעול, צפצופים)
 4. סימנים לירידה בפרפוזיה (חיוורון, הזעה, ירידה במצב הכרה)


**** אין התוויות נגד כאשר מדובר במצב מסכן חיים**
**** אין סיבוכים משמעותיים מהזרקת שווא**





סוגי מזרקים


1. מזרק לילדים (מינון של 0.15 מ"ג אדרנלין) - **צבע ירוק**
2. מזרק למבוגרים (מינון של 0.3 מ"ג אדרנלין) - **צבע צהוב**






שלבי ההזרקה

1




פתח את אריזת הפלסטיק
והוצא את המזרק

2




הוצא את המזרק מהאריזה
ע"י הטיה קלה הצידה

3




משוך במכסה הכחול מבלי לגעת בקצה
המזרק ממנו יוצאת המחט (החלק הכתום)

4




כוון את קצה המזרק לצד החיצוני
של הירך (עם או בלי בגדים)

5



נעץ את המזרק בירך בזווית של 90 מעלות
עד להשמעת "קליק" למשך 10 שניות
יש להזריק לשריר הירך בלבד

6



הוצא את המזרק בזהירות מבלי
לגעת במחט ועסה את מקום
ההזרקה למשך 10 שניות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

תופעות לוואי

- דפיקות לב מהירות
- בחילות והקאות
- כאבי ראש
- סחרחורות
- זיעה
- חולשה
- תחושת מועקה או קושי נשימתי

**** תופעות הלוואי שלעיל הם כפי שרשומות בעלון לצרכן**
**** רוב תופעות הלוואי חולפות לאחר מספר דקות של מנוחה**



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות?

