




פגיעות ראש





- את הראש עוטפים מספר רב של קרומים שעיקר תפקידם הוא להגן על המוח מפני פגיעות חיצוניות:

- שיער

- הקרקפת – רקמה רכה- רקמת עור עשירה בכלי דם


- הגולגולת – רקמה קשה – עצם שטוחה

- Dura matter – קרום חיצוני חזק מאוד

- Arachnoid Matter – הקרום העכבישי


- CSF – 150cc נוזל פלזמתי - 150 cc

- Pia matter – קרום דק העוטף את המוח.






- פתופיזיולוגיה : בעקבות חבלה קשה מוטח המוח אל עצם הגולגולת וכתוצאה מכך עלולה להיגרם קריעה של כלי דם.





זעזוע מוח – סימנים




- אובדן הכרה רגעי
- טשטוש
- בלבול
- שכחה
- בעיות בראיה
- בחילות
- הקאות וכאבי ראש
- לעיתים עלולים הסימנים להופיע לאחר מספר שעות



כל הזכויות שמורות



זעזוע מוח – סכנות



- עליה בלחץ התוך גולגולתי עקב דימום פנימי







סוגי שברים בגולגולת

שברים בגג
הגולגולת

- **שבר דחוס** – כאשר חלק מהגולגולת נדחס כלפי פנים, סכנת דימום פנימי וחיצוני.
- **שבר דחוס מורכב** – כאשר חלקים מעצמות הגולגולת נדחסים ופוגעים ברקמת המוח.





סוגי שברים בגולגולת

שבר בבסיס
הגולגולת

- **שבר בזאלי – בד"כ שבר קווי .מתאפיין בדליפת נוזל CSF מהאוזניים או מהפה והאף (תלוי במיקום השבר), בהופעת דימום מסביב לעיניים (Raccoon's Eyes) ובשטפי דם פנימיים מאחורי האוזניים (Battle's Sign).**

- **שבר קווי- אין תזוזה של עצמות שבר קל יחסית**






סוגי שברים בגולגולת

- **שברים בגג הגולגולת – שבר מהאוזניים ומעלה כתוצאה מפגיעה ישירה בחלק העליון.**
- **שבר בבסיס הגולגולת – שבר מהאוזניים ומטה-נגרם כתוצאה מפגיעה עקיפה בלבד!**
- **פגיעה בלסת עליונה(מקסילה) – שינוי צורה, סכנה לחנק וחרדה עקב אסתטיקה**
- **פגיעה בלסת תחתונה (מנדיבולה) –הלשון מחוברת ללסת התחתונה וכשהיא שבורה יש סכנה לצניחת בסיס הלשון-יהיה שינוי צורה וסכנה לשבר דו צידי.**
- **שבר דו צידי – שבר בשני הצדדים, לסת שמוטה ושינוי צורה**




EICP – לחץ תוך גולגלתי מוגבר

- ICP- האיברים נמצאים בתוך הגולגולת ונמצאים בלחץ קבוע תקין
- EICP – לחץ תוך גולגלתי מוגבר
- בין הקרומים ישנם חללים- "חללים פוטנציאליים"
ברגע שהחללים מתמלאים יש "תהליך תופס מקום" בתוך קופסת
הגולגולת הסגורה. מצב זה נקרא ICP מוגבר- לחץ תוך גולגולתי
מוגבר



© כל הזכויות שמורות



- דופק איטי – לחץ על גזע המוח

- לחץ דם גבוה

- שינויים בדפוסי נשימה

- ירידה ברמת ההכרה-לחץ על גזע המוח

- אישונים לא שווים

- בחילות

- הקאות

- המטומת משקפיים – צבע סגול


מסביב לעיניים

- יציאת CSF מהאוזניים





- **דימום אפידורלי – דימום מעל קרום הדורה עקב קרע של העורקים המספקים דם למוח. הדם מצטבר בין הגולגולת לקרום הדורה-חלל פוטנציאלי.**



- דימום מסיבי – אובדן הכרה מהיר
- אובדן הכרה וחזרה להכרה לסירוגין
- אין פגיעה ישירה במוח משום שאין פגיעה בקרום הדורה עצמו



- **דימום סאב דורלי – דימום בווריד המנקז את הדם מהמוח**

הדם מצטבר בין הדורה לארכנואיד- חלל פוטנציאלי

- דימום איטי בד"כ


- הסימנים יכולים להופיע לפעמים רק לאחר מספר ימים

- בפגיעה זו יש נזק לרקמות המוח

© כל הזכויות שמורות




סימנים – פגיעות ראש



- סיפור מקרה
- הכרה מידרדרת
- דופק איטי
- לחץ דם גבוה
- שינויים בדפוסי נשימה
- בחילות
- אישונים לא שווים
- אי שקט-היפוקסיה



סכנות לכל סוגי פגיעות הראש





- מוות כתוצאה מפגיעה במוח

- פגיעות עמ"ש

- שיתוק

- זיהומים







טיפול לכל סוגי פגיעות הראש

• ABC ע"פ סכימת PHTLS

- חמצן
- צווארון, לוח גב
- חבישה
- שיקול הזמנת נט"ן/אט"ן
- פינוי לבית חולים





- יש לשים לב לרמת ההכרה – אם יש ירידה ברמת ההכרה יש להזמין נט"ן/אט"ן בהקדם
- גורם מספר 1 למוות בטרומה הינו פגיעת ראש
- המדד האמין ביותר לפגיעת ראש הוא הידרדרות במצב הכרה
- במצב של פגיעת ראש והלם, סימני הלם יגברו על סימני פגיעת ראש
- בכל איבוד הכרה זמני יש לחשוד לפגיעת ראש
- אי שקט מעיד על פגיעה בחמצון המוחי






למה יש עליה בלחץ דם בפגיעת ראש

- ה-CPP חייב להיות מעל 60, אם לא, המוח לא יקבל את כמות החמצן הדרושה

העשרה



תקין	65=80-15
לא תקין	50=80-30
לאחר תיקון	70=100-30

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

משולש קושינג

עלייה בלחץ
דם

העשרה

ירידה בדופק

שינויים
בנשימה

© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות?



© כל הזכויות שמורות