

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

טראומה – נשים בהריון





מבוא – טראומה בהריון

- טראומה היא הסיבה העיקרית למוות בנשים בגיל הפוריות
- 6-7% מכלל הנשים בהריון מעורבות בטרומה במהלך ההריון
- הטיפול הראשוני באישה ההרה זהה לטיפול באשה שאינה הרה
- יש להיות ערים לשינויים האנטומיים והפיזיולוגיים המתרחשים בגוף האישה ההרה



© כל הזכויות שמורות



טראומה בהריון – שינויים אנטומיים פיזיולוגיים

- מערכת הנשימה


- עליה בקצב הנשימה



- מערכת הדם

- עליה בקצב הלב

- עלייה בנפח הדם



© כל הזכויות שמורות



טראומה בהריון – מנגנוני פגיעה חודרת

- ככל שההריון מתקדם , הסיכוי לפגיעה באברי הבטן **קטן** יותר
והסיכוי לפגיעה ברחם **גדול** יותר

- בנשים בהריון הפרוגנוזה של פציעת ירי היא טובה יותר מאשר
באישה לא הרה. לעומת זאת הפרוגנוזה של העובר גרועה



© כל הזכויות שמורות



טראומה בהריון – מנגנוני פגיעה קהה

- מתרחשת ב 7% מכלל ההריונות
- גורמת ל 80% מהפגיעות
- הגורמים השכיחים:
 - תאונות דרכים
 - נפילה
 - תקיפה

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

טראומה בהריון – מנגנוני פגיעה קהה

- בתאונת דרכים:
 - חבלה ישירה לבטן
 - חבלה מחגורת בטיחות
 - חגורת "כתף" היא הבטוחה ביותר לנשים הרות



© כל הזכויות שמורות



טראומה בהריון

- פציעות עיקריות -
 - קרעים של הרחם
 - טראומה חודרת לרחם
 - היפרדות שלייה: דימום לדני, צירים ורגישות במישוש הרחם
 - פגיעות במעי שכיחות פחות בהריון
 - קרע של איברים מוצקים
 - בנשים מוכות בהריון – החבלות לעתים מכוונות לבטן

כל הזכויות שמורות



- סימני רעלת הריון (אקלמפסיה) זהים לעתים לסימני חבלת ראש

- ירידה בפריסטלטיקה – מזון "יתעכב" בקיבה – סכנת הקאה

ואספירציה

- מתיחת קרום הצפק ושרירי הבטן גורמים להפחתה או היעדר סימני

גירוי צפקי



© כל הזכויות שמורות



• המודינאמי –

– גם כאשר האם עדיין יציבה המודינמית, העובר עלול להיות בהלם

קשה !!!

– כאשר יש ירידה בלחץ הדם של האם, דופק העובר ירד גם הוא

– במצב של הלם תת נפחי יש ירידה באספקת הדם לרחם ולשלייה

– שים לב: סימני הלם יופיעו בשלב מאוחר יותר

• עד לאיבוד של 1.5 ליטר דם הסימנים יהיו תקינים

(בגלל עליה בנפח הדם)

– (סימני הלם יופיעו לאחר איבוד של 30-35% מנפח הדם)



טראומה בהריון – טיפול


• ABC ע"פ סכמת PHTLS

– הדרך הטובה ביותר לטפל בעובר היא לטפל באם!!!

– חמצן

– פינוי בהטייה על צד שמאל – מפחית מהלחץ על הוריד הנבוב

התחתון



© כל הזכויות שמורות



טראומה בהריון – דגשים

• לחץ על הוריד הנבוב התחתון

- פגיעה בחזרה ורידית מחמירה את מצב ההלם
- בהיעדר פגיעה עלול לחקות מצב הלם
- פגיעה בחזרה ורידית מעלה את הלחץ התוך רחמי העלול לגרום לפקיעת שק השפיר

• כללי

- אישה הרה לאחר שבוע 24 תפונה לחדר לידה
- בפציעות חמורות ובמאמצי החייאה ממושכים יש להכין מבעוד מועד צוות חדר ניתוח לצורך ביצוע ניתוח קיסרי דחוף



טראומה בהריון – סיכום

- טפל על פי סכימת הטיפול בטרומה
- כדי להציל את העובר – יש לטפל באם!
- בהחייאה – יש להמשיך פעולות החייאה תוך פינוי לבי"ח – ע"מ
לאפשר הצלת העובר
- אין לעכב פינוי – גם במצב שנראה קל
- פינוי בהטיה על צד שמאל ב- 15°

© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות?



© כל הזכויות שמורות